

ISSN 2181-3833



RESEARCH FOCUS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

**VOLUME 4
ISSUE 3**

2025

ABOUT US:

 www.refocus.uz

 t.me/research_focus

LLC Academy of Sciences and Innovations
International Scientific Journal Research Focus
Volume 4 Issue 3

Ilm-fan va innovatsiyalar akademiyasi

RESEARCH FOCUS
xalqaro ilmiy jurnali
2025 yil 3-son

ISSN: 2181-3833

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 16.08.2022 yilda olingan №1701 sonli guvohnomaga ega. Jurnalning ushbu soni [Index Copernicus](#), [ResearchGate](#), [Elibrary](#), [Academia.edu](#), [OpenAire](#), [Directory of Research Journals Indexing](#), [ZENODO](#), [Cyberleninka](#) va [Google Scholar](#) xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Barcha maqolalar jurnalning elektron ilmiy bazasi ([ReFocus.uz](https://refocus.uz/)) ga joylashtirildi.

ISSN: 2181-3833

“Research Focus” xalqaro ilmiy jurnali №3. 2025 yil

Ushbu to'plamda **“Research Focus”** xalqaro ilmiy jurnali 3-soniga qabul qilingan ilmiy maqolalar joy olgan.

Ushbu ilmiy jurnalda O'zbekiston Respublikasi va xalqaro oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, mustaqil ilmiy izlanuvchilari, doktorantlari, magistrantlari tomonidan olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari ilmiy maqola tarzida chop etildi. Shuningdek, jurnalga oliy ta'lim muassasalaridan tashqari viloyatimiz va respublikamizning boshqa ilmiy-tadqiqot institutlari, ishlab chiqarish tashkilotlari va korxonalarida faoliyat ko'rsatib, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borayotgan xodimlarning ham ilmiy maqolalari kiritildi.

Jurnal materiallaridan professor-o'qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o'qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

© **Ilm-fan va innovatsiyalar akademiyasi**

© **Mualliflar**

“Research Focus” xalqaro ilmiy jurnali tahririyati
Saloydinov Sardorjon Qodirjon o'g'li - Bosh muharrir
Abdurahmonov Javohir Sobir o'g'li - Texnik muharrir
Tahrir hay'ati a'zolari

01.00.00 – Fizika-matematika fanlari

Sharibaev Nosir Yusupjonovich – Namangan muhandislik-texnologiya institute fizika-matematika fanlari doktori, professor
Tukfatullin Oskar Faritovich – O'zMU Huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti Muqobil energiya manbalari laboratoriyasi mudiri
Ergashev To'xtasin Gulamjanovich – TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti oliy matematika kafedrasida professori v.b. fizika-matematika fanlari nomzodi

Nuriddinova Mashxura Anvarbekovna – Namangan muhandislik-texnologiya institute fizika kafedrasida o'qituvchisi PhD

Fayzullaev Qahramon Maxmudjonovich – Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi, fizika-matematika fanlari bo'yicha PhD

Anifa Paluanova – Nukus davlat-pedagogika instituti dotsenti, Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD

Raxmanov Dilmurod Abdug'abbor o'g'li – O'zMU xuzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy tadqiqot instituti, Yarimo'tkazgichlar fizikasi laboratoriyasi kichik ilmiy xodimi

Xorilov Maxmud Abdumalikovich – Namangan davlat universiteti Matematik analiz kafedrasida o'qituvchisi fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD

Mamadaliyev O'ktamjon Xasanboyevich - Namangan davlat universiteti Matematika kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD

02.00.00 – Kimyo fanlari

Abdullayev Shavkat Vaxidovich – Namangan davlat universitetining “Organik kimyo” kafedrasida professori, Kimyo fanlari doktori, tabobat fanlari akademigi

Xolmurodova Dilafruz Quvatovna – Samarqand Davlat tibbiyot universiteti tibbiy kimyo kafedrasida mudiri texnika fanlari doktori (DSc)

Xujaboev Safarboy Tuxtaboevich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti umumiy xirurgiya kafedra dotsenti Tibbiyot fanlari doktori.

Eshmatova Nodira Baxromovna – Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Fizikaviy kimyo kafedrasida dotsenti Kimyo fanlari doktori

Raxmatullayev Izatulla – Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti dotsenti. kimyo fanlari nomzodi dotsenti

Baykulov Azim Kenjaevich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti Farmatsevtika va toksikologik kimyo kafedrasida mudiri

Xalikov Kaxor Mirzaevich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti biologik kimyo kafedrasida mudiri Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Todjiev Jamoliddin Nasiriddinovich – Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti kimyo fakulteti analitik kimyo kafedrasida dotsenti

Xaydarova Dilrabo Raximjanovna – Namangan davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Organik kimyo kafedrasida o'qituvchisi PhD

Eshkobilova Mayjuda Ergashboyevna - SamDAQU “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish” kafedrasida dotsenti (v.b)

03.00.00 – Biologiya fanlari

Abdullayev Shavkat Vaxidovich – Kimyo fanlari doktori, Namangan davlat universitetining “Organik kimyo” kafedrasida professori, tabobat fanlari akademigi

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna – Samarkand davlat tibbiyot universiteti 3-son Ichki kasalliklar va endokrinologiya kafedrasida dotsenti, kafedra mudiri tibbiyot fanlari doktori dotsent
Asqarov Kamoliddin Abdug'aniyevich – Farg'ona davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti dekani, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Rasulova Moxidil Tursunaliyevna – Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti “Davolash ishi” fakulteti dekani

Shavazi Nargiz Nuralievna – Samarqand davlat tibbiyot universiteti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri

Baykulov Azim Kenjaevich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti Farmatsevtika va toksikologik kimyo kafedrasida mudiri Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Mirzayev Saidmaxmud - Namangan davlat universiteti sport faoliyati kafedrasida dotsenti biologiya fanlari nomzodi dotsent

Yuldoshev Xojiakbar Toshpo'latovich – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

05.00.00 – Texnika fanlari

Murzaqulov Nurqul Abdilazizovich – Qirg'iziston Respublikasi O'sh Texnika Universiteti professor texnika fanlari doktori. “Elektr energetika” mudiri.

Muradov Rustam – Namangan muhandislik-texnologiya institutining “Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi” kafedrasida professori (texnika fanlari doktori, professor)

Mamaxonov A'zam Abdumajitovich – Namangan muhandislik-texnologiya instituti Avtomatika va energetika fakulteti dekani texnika fanlari doktori, professor

Shamshidinov Israiljon Turgunovich – Namangan muhandislik-qurilish instituti kimyoviy texnologiya kafedrasida professori texnika fanlari doktori professor

Sitdiqov Rashid Abduraxmanovich – Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti energetika fakulteti professori texnika fanlari doktori

Ergashev Sirojiddin Fayazovich – Farg'ona politexnika instituti ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlarni tayyorlash bo'limi boshlig'i. Texnika fanlari doktori, dotsent

Soliyev Rustamjon Hakimjanovich – Namangan muxandislik-qurilish instituti Energetika va mehnat muhofazasi fakulteti dekani. Texnika fanlari doktori, dotsent

Xankeldiyeva Guzal Sherovna – Farg‘ona politexnika instituti menejment kafedrasida professori iqtisod fanlari doktori professor

Yunusov Baxtiyar Xodjakbarovich – Toshkent davlat texnika universiteti: “Energetika” fakultetlari “Issiqlik energetikasi” kafedrasida Mudiri, dotsent

Rayimdjanova Odinaxon Sadikovna – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali Telekommunikatsiya injineri kafedra mudiri. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Quchqorov Akmaljon – Farg‘ona politexnika instituti “Elektronika va asbobsozlik” kafedrasida mudiri. Texnika fanlari nomzodi (PhD)

Muxtarov Farrux Muxammadovich – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali telekommunikatsiya texnologiyalari va kasb ta'limi fakulteti dekani Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Radionova Olga Vinsetovna – Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti «Elektr stansiyalari, tarmoqlari va tizimlari» kafedra dotsenti texnika fanlari nomzodi

Davlatova Mavlyuda Baxtiyorovna – Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Katta o'qituvchi, Texnika fanlari falsafa doktori (PhD)

Vaxobova Sojida Komiljonovna – Namangan muhandislik qurilish instituti Energetika kafedrasida dotsenti, PhD

Agzamov Shovkat Kozimovich – Toshkent davlat texnika universiteti: “Energetika” fakultetlari “Issiqlik energetikasi” kafedrasida dotsenti

Xolbayev Doniyor Juraboyevich – Namangan muhandislik-texnologiya instituti Energetika kafedrasida o'qituvchisi PhD

Sa'dullayev Tuymurod Mardullo o'g'li – Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti dotsenti PhD

06.00.00 – Qishloq xo'jaligi fanlari

Suvanov Boymurod Uralovich – Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti direktorining ishlab chiqarish va marketing ishlari bo'yicha o'rinbosari qishloq xo'jaligi fanlari doktori (DSc) katta ilmiy xodim

07.00.00 – Tarix fanlari

Mirzayev Gulom Rizoqulovich – O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida dotsenti tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yo'ldoshev Salimjon Valiyevich – Farg‘ona davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrasida o'qituvchisi Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsenti

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlari

Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi – Farg‘ona davlat universiteti ijtimoiy ish kafedrasida o'qituvchisi Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

Xasanov Ilyos Maxmudovich – Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Davolash ishi fakulteti dekan o'rinbosari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Umarov Abduxamid Sattarovich – Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining informatika va menejment kafedrasida dotsenti iqtisod fanlari nomzodi dotsent

Abdullayev Baxodir Abdug'afrovich – Andijon mashinasozlik instituti «Sanoat ishlab chiqarishini tashkil yetish» kafedrasida dotsenti Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Egamberdiyev Raxmonjon Ilxomovich – Namangan viloyati hokimligi xuzuridagi “Fukarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari hodimlarining malakasini oshirish bo'yicha o'quv markazi direktori, iqtisod fanlari nomzodi dotsenti

09.00.00 – Falsafa fanlari

Xolmirzayev Nodirjon Nizomjonovich – TDTU Qo'qon filiali Ijtimoiy va aniq fanlar kafedrasida mudiri Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)

Normatova Dildor Esonaliyevna – Farg‘ona davlat universiteti Falsafa kafedrasida dotsenti. Falsafa fanlari nomzodi dotsent

10.00.00 – Filologiya fanlari

Gunal Hummetova Saleh – Azarbayjon pedagogika universiteti Filologiya fanlari doktori professor

Abdupattoyev Muhammadtohir Tojimatovich – Farg‘ona davlat universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida mudiri filologiya fanlari doktori (DSc) dotsent

Murodov G'ayrat – Buxoro davlat universitetining o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida professori. filologiya fanlari doktori professor

Sobirov Abdulxay SHukirovich – Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat universiteti mahnaviyat va mahrifat bo'yicha prorektor, filologiya fanlari doktori, professor.

Mirzayev Murodil Abdulla ugli – Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali kengash kotibi filologiya fanlari nomzodi

Axmedova Anorxon Nasivali qizi – O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Tarjimonlik fakulteti “Ingliz tili tarjima nazariyasi” kafedrasida o'qituvchisi Filologiya fanlari bo'yicha PhD

Sobirova Dilafuz Abdulhay qizi – Andijon davlat pedagogika instituti “Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrasida katta o'qituvchisi Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ergashev Abduhalim Abdujalilovich – Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari filologiya fanlari nomzodi

Zakirova Hafiza Razaqovna – Andijon davlat universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Alimjon Tojiev Mo'ydinovich – Andijon davlat universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Qodirov Ziyoidin Mamadalievich – Andijon davlat universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrasida katta o'qituvchisi filologiya fanlari nomzodi

SHaxobov Kamoldin Biloldinovich – Andijon davlat universiteti filologiya fakulteti o'quv ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Eshqobilov Abdivali Kazakovich – Samarqand davlat chet tillari institute Axborot resurs markazi direktori

13.00.00 – Pedagogika fanlari

Raxmatova Dilnoza Nigbayevna – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati professor v.v.b

Ergashev Bobirjon Boxodirovich – Pedagogik innovatsiyalar, professional ta'limi boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti Malaka oshirish va qayta tayyorlash fakulteti dekani DSc

Ismoilov Temurbek Islomovich - Namangan davlat universiteti Fuqarolik jamiyati va huquq ta'limi kafedrasida professor vazifasini bajaruvchi Pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Obidova Gulmira Kuzibayevna – Farg'ona politexnika instituti Magistratura bo'limi boshlig'i PhD, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Azizov Nosirjon Nematillayevich – Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida mudiri, pedagogika fanlari nomzodi, Dostent

Qurbonova Maftuna Faxriddinovna – Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mirzayeva Nodira Abduxamidovna – Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti "Genetika va evolyusion biologiya" kafedrasida dotsenti. Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Valiyeva Feruza Rashidovna - Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti "Maktabgacha ta'lim menejmenti" kafedrasida mudiri. (PhD)

Yuldashov Ikromjon Abdulazizovich - Farg'ona davlat universiteti jismoniy madaniyat fakulteti dekani. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). Stol tennisi bo'yicha Oliy toifali hakam.

Hamidjonov Abdulaziz Usubjon o'g'li – Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Xalqaro sport ustasi

Qosimova Ozoda Xudoynazarovna – Samarkand davlat tibbiyot instituti pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD

Raximov Atanazar Karimovich – Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti dekani. Pedagogika fanlari doktori professor vazifasini bajaruvchi

Yunusova Nilufar Xamrayevna – Toshkent Moliya instituti, O'zbek va rus tili kafedrasida mudiri, pedagogika fanlari nomzodi dotsenti

Umarov Mars Narziyevich – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti gimnastika sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasida professor, PhD professor

Umarov Xurshidjon Xasanovich – O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti "Gimnastika nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida p.f.b.f.d. (PhD), dotsenti

Sobirova Laylo Baxromovna – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining "Adaptiv jismoniy tarbiya va parasport" kafedrasida dotsent v.b.

Tojiyev Muzafarjon Akbarovich – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining jismoniy tarbiya sport nazariyasi va uslubiyati kafedrasida v.b. professor

Matnazarov Xayrulla Yuldashovich – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti "Suv sporti, eshkak eshish turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida mudiri

To'ychiev Tohirjon Saxodullaevich - Namangan Davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi PhD.

Sirojiddinova Nodira Rivojiddinovna - Professional ta'limni rivojlantirish instituti "Innovatsion ta'lim texnologiyalari" kafedrasida mudiri

14.00.00 – Tibbiyot fanlari

Ziyadullaev Shuxrat Xudayberdievich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

Ruziboyev Sanjar Abdusalomovich – Samarqand davlat tibbiyot instituti 2-xirurgik kasalliklar va urologiya kafedrasida dotsenti. Tibbiyot fanlar doktori

Kurbonov Nizom Azizovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti diplomdan keyingi tahlil fakulteti Xirurgiya, endoskopiya va anesteziologiya-reanimatologiya kafedrasida mudiri.

Islamov Shavkat Erjigitovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti Professore, tibbiyot fanlari doktori.

Daminov Feruz Asadullayevich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy pedagogika fakulteti dekani 2-xirurgik kasalliklar va urologiya kafedrasida dotsenti, Tibbiyot fanlar doktori

Djabbarov Sherzod Raximberdiyevich – Sog'liqni saqlash boshqarmasi Lisenziyalash va Akkreditatsiyalash sektori bosh mutaxassisi Tibbiyot fanlari nomzodi

Mustafakulov Ishnazar Boynazarovich – Samarqand davlat tibbiyot institutining davolash fakulteti dekani o'rinbosari tibbiyot fanlari nomzodi

Shonazarov Iskandar Shonazarovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti diplomdan keyingi ta'lim fakulteti, Xirurgiya, endoskopiya va anesteziologiya-reanimatologiya kafedrasida o'qituvchisi Tibbiyot fanlari nomzodi

Achilov Mirzakarim Temirovich – Samarkand davlat tibbiyot instituti diplomdan keyingi ta'lim fakulteti xirurgiya, endoskopiya, anesteziologiya va reanimatologiya kafedrasida dotsenti tibbiyot fanlari nomzodi

Najmiddinov Otabek Baxriddin o'g'li – Andijon davlat tibbiyot instituti klinikasi Rengenalogiya bo'limi vrachi PhD

Saydullayev Zayniddin Yaxshiboyevich – Samarqand davlat tibbiyot instituti "Umumiy xirurgiya kafedrasida assistenti

Ibragimova Marina Fyodorovna – Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son Pediatriya kafedrasida o'qituvchisi PhD

Kardjavova Gulnoza Abilkasimovna – Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son Pediatriya kafedrasida o'qituvchisi PhD

Murtazaev Zafar Isrofilovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti Umumiy xirurgiya, nurlil diagnostika va terapiya kafedrasida dotsenti

Pulatov Ulugbek Sunatovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti Klinik (o'quv) bazalari bilan ishlash bo'limi boshlig'i

Boymanov Farxod Xolboyevich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Sud tibbiyot" Kafedrasida dotsenti

Mustafoyev Zafarjon Mustaf o'g'li – Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, Odam anatomiyasi kafedrasida o'qituvchisi

Ergashova Madina Muxtorovna – Samarqand davlat tibbiyot universiteti 3-son ichki kasalliklar kafedrasida assistenti PhD

Rustamov Inoyatulla Muradulla o'g'li – Samarqand Davlat tibbiyot universiteti umumiy xirurgiya kafedrasida o'qituvchisi, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD

Axmedov G'ayrat Keldibayevich – SamDTU Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tairova Zarangis Kamoliddinovna – Samarqand Davlat tibbiyot universiteti tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizamov Furkat Ochilovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti Diplomdan keyingi ta'lim fakulteti Xirurgiya, endoskopiya va anesteziologiya-reanimatologiya kafedrasida o'qituvchisi PhD

Umedov Xushvaqt Alisherovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son Davolash fakulteti 2-son Xirurgik kasalliklar kafedrasida

Samatov Dilshod Karimovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti 3-son ichki kasalliklar kafedrasida assistenti

Mirzayev Ozod Voxidovich – Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti “3-Ichki kasalliklar” kafedrasida o'qituvchisi, PhD

Nurmurazayev Zafar Narbay o'g'li – Samarqand davlat tibbiyot universiteti diplomdan keyingi ta'lim fakulteti tibbiy kardiologiya kafedrasida o'qituvchisi, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Umarkulov Zabur Zafarjonovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti diplomdan keyingi ta'lim fakulteti tibbiy kardiologiya kafedrasida o'qituvchisi, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

15.00.00 – Farmatsevtika fanlari

Shavazi Nurali Muxammad o'g'li – Samarqand davlat tibbiyot universiteti farmatsiya fakulteti dekani tibbiyot fanlari doktori professor

Xolmurodova Dilafruz Quvatovna – Samarqand Davlat tibbiyot universiteti tibbiy kimyo kafedrasida mudiri texnika fan doktori (DSc)

SHodikulova Gulandom Zikriyevna – Samarqand davlat tibbiyot universiteti 3-son Ichki kasalliklar va endokrinologiya kafedrasida dotsenti, kafedra mudiri tibbiyot fanlari doktori dotsent

Bozorova Nigina Sobirjonovna – Samarqand davlat tibbiyot universiteti Farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasida mudiri

Yuldashev Soatboy Jiyanaevich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti farmakologiya kafedrasida mudiri

Zokirov Farxod Istamovich – Samarqand shahar 2-son tug'ruqxonasi shifokor akusher-ginekolog PhD

Kodirov Nizomiddin Daminovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti farmakognosiya va farmatsevtik texnologiya kafedrasida kafedra mudiri

Babamuradova Zarrina Baxtiyarovna – Samarqand davlat tibbiyot Universitetining Pediatriya fakulteti Ichki kasalliklar kafedrasida mudiri

Kamalov Anvarjon Ibragimovich – Samarqand davlat tibbiyot universiteti ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i

Kudratova Zebo Erkinovna – Samarqand davlat tibbiyot instituti Klinik laboratoriya diagnostikasi kafedrasida o'qituvchi PhD

16.00.00 – Veterinariya fanlari

Daminov Asadullo Suvonovich – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Veterinariya fanlari doktori professor

Mamatova Muborak Nurpo'latovna – Samarqand davlat tibbiyot instituti klinik laborator diagnostika kafedrasida professori v.b. Veterinariya fanlari doktori professor v.b.

Yuldoshev Xojiakbar Toshpo'latovich – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Elmuradov Bozorboy Aktamovich – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, veterinariya fanlari doktori, professor.

Ruzimuradov Muxiddin Axrorovich – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, veterinariya fanlari nomzodi, professor

Butayev Maxmud Qarshiyevich – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, veterinariya fanlari nomzodi

Ulug'muradov Azamat Daminovich – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, veterinariya fanlari falsafa doktori (PhD).

Isayev Jasur Muzaffarovich – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, veterinariya fanlari falsafa doktori (PhD).

Navruzov Nurali Itolmasovich – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, veterinariya fanlari falsafa doktori (PhD).

Akramov Komiljon Shuhrat o'g'li – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, veterinariya fanlari falsafa doktori (PhD).

Safarov Xurshid Abdurajabovich – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, veterinariya fanlari falsafa doktori (PhD).

Meyliyev Salohiddin Salim o'g'li – Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti, veterinariya fanlari falsafa doktori (PhD).

Uroqov Kamoliddin Khudoyberdievich – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, veterinariya fanlari falsafa doktori (PhD).

17.00.00 – San'atshunoslik fanlari

Mirzayev Murodil Abdulla ugli – Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali kengash kotibi filologiya fanlari nomzodi

Xolmirzayev Nodirjon Nizomjonovich – TDTU Qo'qon filiali Ijtimoiy va aniq fanlar kafedrasida mudiri Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)

Normatova Dildor Esonaliyevna – Farg'ona davlat universiteti Falsafa kafedrasida dotsenti. Falsafa fanlari nomzodi dotsent

19.00.00 – Psixologiya fanlari

Ruzmetova Sayyoraxon Temurxanovna – Toshkent davlat texnika universiteti pedagogika va psixologiya kafedrasida P.f.f.d. (PhD) v.b. dotsent

22.00.00 – Sotsiologiya fanlari

Zaitov Elyor Xolmamatovich – Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining “Ijtimoiy ish” kafedrasida dotsenti sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent

Jurabayeva Zamira Axmedovna – Andijon davlat universiteti Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim kafedrasida dotsenti, PhD

03.00.00 – Biologiya fanlari

03.00.00 – Biological sciences

03.00.00 – Биологические науки

SPECIES OF *PHLOMOIDES* MOENCH (LAMIACEAE) DISTRIBUTED IN THE FLORA OF YANGIKURGAN

Rustam Gulomov

Namangan State University, PhD.

Murodullayev Mirzaolim

Kashkadarya Turan University, 1-master

Avazbek Batoshov

Namangan State University, DSc, professor.

E-mail: gulomovr92@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15163093>

Abstract: This article presents a list of *Phlomoides* Moench species distributed in Yangikurgan. The aim of this study is to compile a validated checklist of species distribution in the Yangikurgan flora according to the latest data. The checklist includes the following information about each species: each taxon, a complete list of synonyms, species, life form, habitat, ecology, phenology, nomenclature, geographical distribution, and a selection of studied specimens. As a result of the study, 5 species of the genus *Phlomoides* distributed in the region were identified.

Keywords: *Phlomoides*, Checklist, Type, Fergana valley, TASH.

ВИДЫ ФЛОМОИДОВ МОЕНЧЕ (LAMIACEAE), РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВО ФЛОРЕ ЯНГИКУРГАНА

Аннотация: В этой статье представлен список видов Moench *Phlomoides*, распределенных в Янгикургане. Целью данного исследования является составление подтвержденного контрольного списка распределения видов во флоре Янгикурган в соответствии с последними данными. Контрольный список включает в себя следующую информацию о каждом виде: каждый таксон, полный список синонимов, видов, формы жизни, среды обитания, экологии, фенологии, номенклатуры, географического распределения и выбора исследуемых образцов. В результате исследования были идентифицированы 5 видов рода *Phlomoides*, распределенных в области.

Ключевые слова: *Phlomoides*, Checklist, Type, Valley Fergana, TASH.

INTRODUCTION

Yangikurgan region, bordered by Kosansoy to the west, Namangan and Uychi districts to the south, Chartok district to the northwest, north and east by the Republic of Kyrgyzstan. The area is 0.54 thousand km². The territory is located on the southern slopes of the Chatkal ridge. The surface consists of plains and hills. The altitude ranges from 300 m from south to north, up to 1500 m in the central part, and 1500 - 2000 m in the north. Annual precipitation is 300 - 400 mm. The vegetation period is 175 days. The largest streams: Chartoksoy, Namangansoy (Pochchaotasoy in the upper part), Kuruksoy (Changach). The soil is mainly typical gray soil, partly dark gray soil in the northernmost part. There are sandy loams in the northeastern part.

Today, research for 2025-2026 studies are being implemented in the topic of flora (bioecology and practical significance of the Yangikurgan hills).



Figure 1. Geographical location of the Yangikurgan region

MATERIAL AND METHODS

The nomenclatural part of the checklist includes the accepted names of species according to “Conspectus Florae Asiae Mediae”. Our taxonomic review is based on the use of living and herbarium materials from various systematic collections as well as field research. The species was identified using a variety of flora and herbarium samples using large herbariums, namely TASH, Moscow State University MW, Komarov Institute of Botany, LE Institute of Biology of the National Academy of Sciences of Kyrgyzstan and the Institute of Botany.

RESULTS AND DISCUSSION

1. *Phlomoides alaica* (Knorring) Adylov, Kamelin & Machmedov.

Type. KYRGYZSTAN: “Turkestan, prov. Fergana, distr. Osch, prope Gulcza [Gulcho]”, 27.05.1900 *W. Tranzschel* (LE, holotype; isotypes LE).

= *Phlomoides knorringiana* (Popov ex Knorring) Adylov, Kamelin & Machmedov in *Opred. Rast. Sred. Azii* 9: 107 (1987).

Type. KYRGYZSTAN: “Turkestan, prov. Fergana, distr. Osch, slopes of hills near Uzgen village [Ozgon town]”, 26.05.1916 *N. Androssov* (LE, holotype; isotypes LE).

Life form. Hemicryptophyte (Protohemicryptophytes), polycarpic.

Phenology. Flowering April – May, fruiting May – June.

Habitat. On chernozem-like soils among forbs in the lower and middle belt of mountains, high foothills in the forest belt, in grass-forb groups, hemisavannahs, 1.600-2.200 m a.s.l. [1,2,3,4]

General distribution. Middle Asia: Uzbekistan and Kyrgyzstan.

Distribution in the Fergana Valley. I-3 Fergana district. I-3-b Sari-Chelak region: CHATKAL RIDGE (Kyrgyz SSR. Karavan district Jida-say. The upper reaches of the Kizil-Alma-Say, 14.06.1951, *Nabiev* 304, 309 [TASH!]; Bozbu-Too, 10.07.1995, *Lazkov* [FRU]; Jalalabad region. Chatkal Range mountains Bosbutau, Uspenka, 13.06.1996, *Lazkov* 166 [FRU]). I-3-c Arslonbob region: FERGANA RIDGE (Mountain slopes near Taran-Bazar, 12.06.1911, *Knorring et al.*, [LE]; Eastern Fergana. Jelal-Abad region. River basin Kug-art-su. Summit of Achi-say, 17.06.1927, *Korovin* 63 [TASH!]; Fergana Range. Tar river basin, vicinity of Terek village, Boztektir, 12.07.1974, *Aydarova et al.*, [FRU]). I-4 Fergana-Alay district. I-4-a Western-Alay

region: ALAY RIDGE (Between Soh and Ohna, 30.06.1871, *Fedtschenko* [LE]; Alay Range. Sokh, 06.07.1968, *Khudaiberdiev* [TASH!]; The northern slope of the Alai ridge to the east of the village. Aydarken, 15.07.1981, *Pimenov et al.*, 337 [MW!]). I-4-b Eastern-Alay region: ALAY RIDGE (Fergana, distr. Osch, pr. Gulcha, 27.05.1900, *Tranzschel* [LE]; Between Ak-Jar and Kochkor-Ata, Kyrk-Jal, 21.05.1913, *Knorring*, [LE]; Between Osh and Gulcha, 05.07.1929, *Juzepczuk*, [LE]; Osh and sat down. Gulcha. Kaplan-kul, 05.07.1929, *Linchevsky* [TASH!]; Alay Range. River basin Kara-kazyk. Upper r. Shuvali small. In the vicinity of the Shuvali pass, 07.08.1935, *Sovetkin* 155 [TASH!]; Alay Range: Shibeli, 18.07.1963, *Aydarova, Ubukeeva* [FRU]; Kirghiz SSR. The northern slope of the Alai ridge Sufikurgan, Chonkul, 05.09.1989, *Pinenov et al.*, 111 [MW!]; Taktalyk village, 01.07.2006, *Lazkov* [FRU]).

2. *Phlomoides speciosa* (Rupr.) Adylov, Kamelin & Machmedov.

Type. KAZAKHSTAN: “Tian-Schan, Schamsi pass, sudlicher Abhang”, 10.07.1867 *Fr. Osten-Sacken* (LE, lectotype).

— *Phlomoides cephalariifolia* (Popov) Adylov, Kamelin & Machmedov in *Opred. Rast. Sred. Azii* 9: 96 (1987).

Type. KYRGYZSTAN: “Arslambob” [Arstanbop], 21.05.1916 *V. Lipsky* (LE, lectotype).

Life form. Hemicryptophyte (Partial rosette plants), polycarpic.

Phenology. Flowering April – July, fruiting June – August.

Habitat. On stony, gravelly and fine-grained slopes from foothills to the upper belt of mountains. Among thickets of bushes or in walnut forests, in fescue-wormwood steppes, on river terraces, 6.00-3.200 m a.s.l. [5, 6, 7, 8]

General distribution and ecology. Middle Asia: Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan (Chitral), Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and West Himalaya, China (Xinjiang).

Distribution in the Fergana Valley. I-1 Western Tian-Shan district. I-1-a Arashan region: KURAMA RIDGE (Chatkal ridge of Lake Arashan, slopes above the lake to the west h = 100 m, 11.07.1959, *Petrov* [TASH!]). I-1-b Chorkesar region: KURAMA RIDGE (Papsky district on the road from the Maidan pass to the pass. Chapana-Kuyndy, 04.06.1950, *Bondarenko, Maylun* 388, 389 [TASH!]; Chatkal ridge. Uroch. Charkesar (Pap-Chust), 12.05.1950, *Arifkhanova* 142 [TASH!]). I-3 Fergana district. I-3-a South-Chatkal region: CHATKAL RIDGE (Kurama Range: Kasan-Say forestry, middle course of Kochkor-Ata river, 26.06.1962, *Sudnitsyna, N. Gorbunova* [FRU]; Uz.SSR. North slope of the Karakorum mountain. 5 km south-west from the village. Zarkent, 15.05.1969, *Rakhimova* [TASH!]; Namangan. Yangikurgan region. 9 km south-east from the village. Hazratshah. Along the ditch near the roads, 20.04.1970, *Rakhimova* [TASH!]). I-3-b Sari-Chelak region: CHATKAL RIDGE (Chatkal Range: top of the pass NE of Sary-Chelek lake, 24.06.1912, *Knorring* 275 [LE]; Kyrgyz SSR. Dzhangijol Arkit nature reserve on the slope, 27.06.1959, *Galkina* [TASH!]; At-Oynok Mts., Kok-bel pass, 07.05.1977, *Sudnitsyna et al.*, [FRU]). I-3-c Arslanbob region: FERGANA RIDGE (in valle Taldik surpa st. Langar versus fl. Czigirczik, 7000', 27.06.1901, *Alexeenko* 479 [LE]; Terme-Tash Mts., watershed of Urumbash and Kyzyl-Suu rivers, 13.06.1911, *Minkwitz* 1059 [LE]; Fergana ridge, walnut forestry Gava, uroch, Kirgoo, on the slope of the southern exposure. Pistachio plots, 14.04.1947, *Lebedinova* 7 [TASH!]; Fergana ridge. Kaindi. Left bank of the Yassy river, north slope. h=2375 m, 06.07.1950, *Li* 135 [TASH!]; Kyrgyzstan. Fergana Ridge. Yassi, 05.06.1965, *Pryakhin* [TASH!]; Fergana range: Babash-Ata, near Mayly-Say river, 16.04.1977, *Sudnitsyna et al.*, [FRU]). I-4 Fergana-Alay district. I-4-a Western-Alay region: ALAY RIDGE (Osh region. Bel pass on the way from Vuadil to Sokh via Haidarken, 13.06.1949, *Sakhobiddinov, Lee* 891, 911 [TASH!]; Alay ridge. Sokh river

basin. Horsemen of Chortosh-say, above Siman. South-eastern, rubble slope, 08.07.1962, *Tsukervanik* 617 [TASH!]. I-4-b Eastern-Alay region: ALAY RIDGE (Fergana dist. Andijan county Kava, 22.05.1899, *Litvinov* [TASH!]; between Sufi-Kurgan and Ak-Bosogo, 29.06.1901, *O.Fedtschenko, B. Fedtschenko* [LE]; Fergana region The road to the Kugart pass, 10 vertices before the ascent of Katyn-ak-chek, 02.06.1911, *Knorring, Minkwitz* 266 [TASH!]; Shahimardan river basin, Arpa ravine, 32 km of Skobelev, 12.04.1916, *Babenko* 8 [LE]; Fergana region the right banks of the Ak-Bura river, 1926, *Gomolitsky* 58 [TASH!]; along Gulcha river, between Shart river mouth and Kyzyl-Beles pass, 16.07.1930, *Juzepczuk* [LE]; Fergana ridge. Nut. forestry them. Kirov tract Yaradar, 06.07.1949, *Golikov* 2003, 1120 [TASH!]; Alay Range: Kyrgyz-Ata river, Karagay, juniper forest, 16.05.1956, *Janaeva* [FRU]; near Aravan village, 13.04.1990, *Sheremetova, Lazkov* [FRU]. I-5 Kuhistan district. I-5-a North-Turkestan region: NORTH-TURKESTAN RIDGE (right side of Layli-Mazar river, above junction with Ashat river, 23.07.1954, *Vasileva* [FRU]; Turkestan Range: Laylak river, 11.05.1962, *Aydarova, Ubukeeva* [FRU]; Isfana river basin, 11.06.1968, *Ubukeeva* [FRU]; Turkestan ridge of the Isfara River Basin, the headwaters of the Kshambesh River, below the farm, on the stone-gravel southern slope of the mountain h-2800, 12.07.1991, *Gazybaev, Gaffarov* 407 [TASH!]).

3. *Phlomoides kirghisorum* Adylov, Kamelin & Machmedov.

Type. KYRGYZSTAN: Karavan distr., Jede-Say, headstream of Parcho-Say, at the top of the slope, 21.05.1952, *Popova, Kirsanova & Schpota* (FRU, holotype).

Life form. Hemicryptophyte (Partial rosette plants), polycarpic.

Phenology. Flowering April – May, fruiting May – June.

Habitat. The front of the mountain, in the lower mountain region, is the slopes of dry, fine-grained and red soils, 1.000-1.200 m a.s.l. [9, 10, 11, 12]

General distribution. Middle Asia (endemic to the Fergana Valley): Kyrgyzstan and Uzbekistan.

Distribution in the Fergana Valley. I-3 Fergana district. I-3-b Sari-Chelak region: CHATKAL RIDGE (Fergana Valley. Andijan district Uch-Kurgan steppe. 2.5 km from Kumkupyruk on the V-C-V wormwood steppe, 29.05.1929, *Joffe* 243, 244, 456, 455, 377, 79 [TASH!]; Karavan distr., Jede-Say, headstream of Parcho-Say, at the top of the slope, 21.05.1952, *Popova, Kirsanova & Schpota* [FRU]; Kirg. SSR. Caravan region, Jida-say tract. On the slopes of fine earth, 07.05.1952, *Nabiev* 81 [TASH!]; Fergana Valley, surroundings. Jede-Say with tausagiz, 24.05.1952, *Arifkhanova* 977 [TASH!]; Bozbu-Too Mts.: N of Uch-Kurgan, Jite-Say, 27.05.1978, *Takhtajan et al.*, [LE]). I-3-c Arslonbob region: FERGANA RIDGE (Southern Kyrgyzstan, state farm Suzak, 760 m Red flowers, 24.04.1945, *Viter* 19 [TASH!]). I-4 Fergana-Alay district. I-4-b Eastern-Alay region: ALAY RIDGE (Fergana region Osh district 12 versts south of the city ... roads to Naukat, 05.05.1913, *Knorring* 8 [TASH!]).

4. *Phlomoides nuda* (Regel) Adylov, Kamelin & Machmedov.

Type. KYRGYZSTAN: “Mittellauf des Yassy bei Usgent, 4000”, 28.05.1880 *A. Regel*” (LE, lectotype).

Life form. Hemicryptophyte (Partial rosette plants), polycarpic.

Phenology. Flowering April – June, fruiting June – July.

Habitat. On rocky, gravel and clay slopes in the foothills and in the lower mountain belt, 8.00-1.800 m a.s.l. [13, 14, 15]

General distribution. Middle Asia: Tadzhikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.

Distribution in the Fergana Valley. I-3 Fergana district. I-3-a South-Chatkal region: CHATKAL RIDGE (near Ala-Buka village, 29.06.1960, *Ubukeyeva* [FRU]; Kirg. SSR. Karavan region, Ala-Buka, 24.06.1963, *Arifkhanova 210* [TASH!]; 20 km E of Shekoftar village, 17.05.1972, *Sultonova et al.*, [FRU]; Orto-Tokoy water reservoir, 09.07.1980, *Aydarova, Chypaev* [FRU]; Fergana Valley. Namangan region Yangikurgan region, the foot of the Ungortepa mountains, 24.05.2015, *Tojibaev et al.*, 2405201513 [TASH!]). I-3-b Sari-Chelak region: CHATKAL RIDGE (Bozbu-Too: Jede-Say, 03.05.1952, *Popova et al.*, [FRU]; Kirg. SSR Karavan region. Jida-say. To the top of the hillock, rubble, 05.06.1952, *Nabiev 204, 266* [TASH!]; Chatkal Range: confluence of Kara-Suu and It-Agar river, 30.05.1958, *Gubanov, Cherkasov* [FRU]; right side of Aflatun river, near Kara-Jygach village, 30.04.1962, *Aydarova, Ubukeyeva* [FRU]; Kyzyl-Alma, 09.04.1977, *Sudnitsyna, Batalov* [FRU]; Fergana Valley. Chatkal district. The outskirts of the village of Arbagich, high front mountains, 23.05.2015, *Tojibaev et al.*, 230520157 [TASH!]). I-3-c Arslonbob region: FERGANA RIDGE (Kogart valley, 15.08.1911, *Knorring, Minkwitz* [LE]; Fergana region, Andijan district Mineral springs Khazret-Agob, 22.05.1911, *Knorring, Minkwitz 74* [TASH!]; Fergana. River valley Arslanbob, 13.07.1926, *Korovin 385, 185* [TASH!]; Miley-Sai district. Say prone, 26.05.1930, *Joffe 307, 482* [TASH!]; Fergana range: Kara-Alma collective farm, Besh-Tangak, 09.06.1945, *Ponyatovskaya* [LE]; Gava forestry, Tamchy-Bulak, 07.05.1956, *Kozlova* [FRU]; Tar river (tributary of Kara-Daryya river), Chon -Archa (near Terek-suu village), 17.06.1964, *Aydarova, Gorbunova* [FRU]). I-4 Fergana-Alay district. I-4-b Eastern-Alay region: ALAY RANGE (Fergana. Osh, Guloza, 20.05.1900, *Eranzchel* [TASH!]; between Gulcha and Chigirchik pass, 20.05.1900, *Litwinow, Tranzschel* [LE]; Alay Range: from Gulim to Sufi-Kurgan, 28.06.1901, *Fedchenko* [TASH!]; Fergana region Osh district Kyrk-dusal, 10.05.1913, *Knorring 205, 342* [TASH!]; Kyrgyzstan. Kyzyl-Kiyya, 1930, *Fedoseev 198, 236* [TASH!]; between Osh and Naukat, 06.06.1958, *Tzvelev* [LE]; Alay Range: Ak-Tash, 06.05.1963, *Ubukeyeva, Gorbunova* [FRU]; near Kyzyl-Kiyya town, 26.05.1964, *Aydarova, Gorbunova* [FRU]; Osh. Karakuldzha, 25.06.1999, *Lazkov* [FRU]). I-5 Kuhistan district. I-5-a North-Turkestan region: NORTH-TURKESTAN RIDGE (Turkestansiy ridge Lyaila district Bulak-Boshi, 01.05.1987, *Pimenova, Vasilieva 85* [FRU]).

5. *Phlomoidea isochila* (Pazij & Vved.) Salmaki.

Type. UZBEKISTAN: "Tian-Schan occidentalis, ad declivia argillosa secus canalem Bos-su prope pag. Niazbek, haud procul ab urbe Taschkent, 02.05.1926, *Granitov*" 1281 (TASH002891!).

Life form. Hemicytopyte (Partial rosette plants), polycarpic.

Phenology. Flowering April – June, fruiting May – July.

Habitat. On stony and stony-fine-earth soils on the plain, in the belts of wormwood and saltwort deserts, semi-savannas and shiblyak: in wormwood-saltwort groupings, juniper forests; on pebbles, sandy soils, foothills and lower, less often middle belt of mountains, 6.00-1.600 m a.s.l. [1, 2, 3, 4, 5]

General distribution. Middle Asia: Kyrgyzstan, Tadzhikistan and Uzbekistan.

Distribution in the Fergana Valley. I-1 Western Tian-Shan district. I-1-b Chorkesar region: KURAMA RIDGE (Chatkal Ridge. The southwest slope of the Chatkal foothills. Stony talus of Chadak kishlak, 30.06.1936, *Skorokhodov, Azatyan 87* [TASH!]). I-2 Mogoltau-Kurama district. I-2-a Mogoltau region: MOGOLTAU (Western Tien Shan. Mogoltau. Kishlok John-Bulak, Slopes, 01.05.1929, *Lepeshkin* [TASH!]; Western Tien Shan. Mogoltau. Foothills against Khujand (sloping to the Syr-Darya plain), 28.04.1927, *Granitov 203* [TASH!]). I-3 Fergana

district. I-3-b Sari-Chelak region: CHATKAL RIDGE (Fergana Valley. Yangi-Aryk irrigation region. To the north-west from the villages. Chartak. On the pebbles, 09.06.1928, *Joffe 203* [TASH!]; Fergana Valley. Andijan district Uch-Kurgan steppe. Northern section. The second terrace of the Naryn river. On the pebble, 11.05.1929, *Joffe 177* [TASH!]). I-4 Fergana-Alay district. I-4-a Western-Alay region: ALAY RIDGE (Fergana region Sokh neighborhood on the southern slope, 12.06.1949, *Sakhobiddinov, Lee 764* [TASH!]; Osh region. Western part of the road to Haidarken, 12.06.1949, *Sakhobiddinov, Lee 940* [TASH!]). I-5 Kuhistan district. I-5-a North-Turkestan region: NORTH-TURKESTAN RIDGE (The northern slope of Fergana Valley. Digmay Uplands, 26.05.1952, *Arifkhanova 1135, 1146* [TASH!]; the Turkestan ridge. Batkent region. slopes pos., Karabulak, 04.05.1987, *Pimenova, Vasilieva 176* [FRU]).




Figure 2. Growth areas of identified species

CONCLUSION

A compiled for species identification and the geographical distribution of all *Phlomoides* species in Yankurgan flora has been mapped on a GIS basis. Use of the geographic locations of the collection sites in combination with the GIS software allowed prediction of the distribution and estimation of species richness for genus *Phlomoides* in Yangikurgan area.

REFERENCES

1. Rustam Gulomov, Ibrohim Tagayev, Abdurahmon Sheraliev. Synopsis of some species of the genus *Phlomoides* Moench (Lamiaceae) (2025). Research Focus International Scientific Journal. 2025, Volume 4, Issue 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14789363>
2. Lazkov GA. 2016. Labiatae (Family *Labiatae* Juss.) in Flora of Kyrgyzstan (Monography). – Korea. P. 384.
3. Gulomov R.K. Distribution of the genus *Phlomoides* Moench in the Fergana Valley (taxonomy, geography, ecology and conservation): avtoref. Diss. PhD. –Tashkent: 2022. – p. 43.
4. Gulomov R.K., Batoshov A.R. Morphological Phylogeny of the Species *Phlomoides* Moench (Lamiaceae) Distributed in the Fergana Valley // International Journal of Virology and

- Molecular Biology. – USA, 2022. – № 11 (1). – P. 9-15.
<https://doi.org/10.5923/j.ijvmb.20221101.03>
5. Gulomov, R.K. (2022). Fluorosenotypes of *Phlomoidea* Moench species distributed in the Fergana valley. International Journal of Life Sciences & Earth Sciences, 5(1).
<https://doi.org/10.21744/ijle.v5n1.1816>
 6. Tojibaev KS, Karimov FI, Hoshimov HR, Gulomov R, Lazkov GA, Jang C-G, Gil H-Y, Jang JE, Batoshov AR, Iskandarov A, Choi HJ (2023) Important plant areas (IPAs) in the Fergana Valley (Central Asia): The Bozbu-Too-Ungortepa massif. Nature Conservation 51: 13–70.
<https://doi.org/10.3897/natureconservation.51.94477>
 7. Min-Su Park, Nu-Ree Na, Chang-Gee Jang, Rustam Gulomov and Komiljon Tojibaev. The complete chloroplast genome sequence of *Phlomoidea kirghisorum* Adylov, Kamelin & Makhmedov 1987 (Lamiaceae), an endemic species of Fergana Valley. MITOCHONDRIAL DNA PART B: RESOURCES 2024, VOL. 9, NO. 1, 104–108.
<https://doi.org/10.1080/23802359.2023.2292159>
 8. Tursinbayeva, G, Saparov, A, Turekeeva, A, Atanazarov, K, Matrasulov, G, Sindarov, SE, Alikarieva, DM, Gulomov, R, Khudayorova, SI, Ziyovuddin, B, Mardanova, AT. Leaf structure of species of the Brassicaceae Burnett family in Southwestern Kyzylkum, Uzbekistan. 2024. Caspian Journal of Environmental Sciences, Iran, Guilan, 22: 459-475.
<https://doi.org/10.22124/CJES.2024.7739>
 9. A.N. Najmiddinov, R.K. Gulomov, A.R. Batoshov, F.I. Karimov, K. Sh. Tojibaev. *Euphorbia davidii* (Euphorbiaceae) – a new invasive species for the flora of Central Asia. Turczaninowia 27, 4: 5–10 (2024). <https://doi.org/10.14258/turczaninowia.27.4.1>
 10. G‘ulomov R.K., Mutalibxonova M.F, Namangan shahar urbanoflorasida tarqalgan bir urug‘pallalilar (2024). Research Focus International Scientific Journal. 2024, Volume 3, Issue 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13863663>
 11. Najmiddinov A.N., Xoshimov X.R., Batoshov A.R., G‘ulomov R.K. Farg‘ona vodiysida tarqalgan *Euphorbia* L. turkum turlarining balandlik va ekomintaqalarda tarqalishi. Research Focus International Scientific Journal. 2024, Volume 3, Issue 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14295814>
 12. Najmiddinov A., Gulomov, R., Batoshov, A., Hoshimov, H., Rakhmatov, A., & Mullajonova, S. (2023). The conservation status of *euphorbia* L. in the fergana valley of central Asia. International Journal of Life Sciences & Earth Sciences, 6(1), 19-29.
<https://doi.org/10.21744/ijle.v6n1.2091>
 13. Dilshod Nuridinov, Rustam Gulomov, Bakhrom Toxtasinov. Bioclimatic Modeling of *Phlomoidea Kirghisorum* (Lamiaceae) Species Distributed in Fergana Valley. International Journal of Current Science Research and Review. Volume 06, Issue 04, 2023.
<https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i4-39>
 14. Sh. Abdullaev, F. Akbarov, Sh. Abdupatteva, T. Asatulloev, D. Dekhkonov, K. Tojibaev, Kh. Khoshimov, R. Gulomov. Species Distribution Modelling of *Poa Bactriana* Roshev under Different Climate Change Scenarios. International Journal of Virology and Molecular Biology 2024, 13(1): 15-21 <http://doi:10.5923/j.ijvmb.20241301.03>.
 15. G‘ulomov R.K. Farg‘ona vodiysida tarqalgan *Phlomoidea pulchra* (Lamiaceae) ustida olib borilgan tadqiqot natijalari. “Tabiiy fanlarni dolzarb masalalari va yechimlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Qo‘qon – 2024. 60-66 bet.

05.00.00 – Texnika fanlari

05.00.00 – Technical sciences

05.00.00 – Технические науки

SARIMSOQPIYOZ PIYOZBOSHINI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMANING GEOMETRIK PARAMETRLARI

¹Norchayev Davron Rustamovich, ² Quralov Srojiddin Doniyorovich

¹t.f.d., professor "Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqod instituti" direktor maslahatchisi, ²Tayanch doktorant "Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqod instituti".

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15164071>

Annotatsiya: Respublikamiz hududida sarimsoqpiyoz yetishtirish va uni export qilish ko'lami kengayib bormoqda. Sarimsoqpiyozni yetishtirishda xususan uni ekish jarayonida sarimsoqpiyoz piyozboshini donalarga ajratish jarayoni qo'l mehnati orqali amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu qo'l mehnatiga barham berish maqsadida sarimsoqpiyoz piyozboshini donalarga ajratuvchi qurilma ishlab chiqish muhim masala bo'lib turibdi. Bunday qurilmani yasashda bir nechta talablar qo'yiladi. Yasalgan qurilmani bir manzildan ikkinchi manzilga ko'chirishda qulaylikga ega bo'lish. Qurilma ishlash jarayonida sarimsoqpiyoz donalariga shikast yetkazmaslik, donalarni po'stlog'idan ajralib ketmasligiga, unuvchanlik xususiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik talab etiladi.

Kalit so'zlar: Sarimsoqpiyoz, sarimsoqpiyoz piyozboshi, sarimsoqpiyoz donalari, kesik konus, baraban, piyozboshning bo'yi, radius, sarimsoqpiyoz to'plami, sarimsoqpiyoz unuvchanligi, sarimsoqpiyoz pallalari.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ЧЕСНОКА

Аннотация: На территории нашей республики расширяются масштабы выращивания и их экспорта чеснока. При выращивании чеснока, особенно в процессе его посадки, процесс деления луковицы чеснока на части проводят вручную. Чтобы исключить этот ручной труд, важным вопросом является разработка устройства, разделяющего головку лука на куски. Для изготовления такого устройства существует несколько требований. Наличие удобства перемещения устройства из одного места в другое. В процессе работы устройства необходимо не повредить зерна чеснока и лука, не отделить зерна от кожуры и не оказать отрицательного влияния на свойства всхожести.

Ключевые слова: Лук чеснок, головка лука чеснока, семена лука чеснока, усеченный конус, барабан, длина головки лука, радиус, севок лука чеснока, всходы лука чеснока, кольца лука чеснока.

GEOMETRIC PARAMETERS OF THE GARLIC SEPARATOR

Abstract: The scale of garlic cultivation and export is expanding in our republic. In the cultivation of garlic, especially during its planting, the process of separating the garlic bulb into grains is carried out manually. In order to eliminate this manual labor, it is important to develop a device for separating the garlic bulb into grains. Several requirements are imposed on the manufacture of such a device. The manufactured device should be convenient to move from one location to another. It is required that the device does not damage the garlic grains during operation, does not separate the grains from the husk, and does not negatively affect their germination properties.

Keywords: Garlic, garlic bulb, garlic grains, truncated cone, drum, bulb height, radius, garlic bunch, garlic germination, garlic cloves.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 15-oktabrdagi "Sarimsoqpiyoz hamda to'qsonbosti usulida sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va eksport qilishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4863-sonli qarorida [1] ham ushbu masalalarga etibor qaratilgan. Jumladan, xorijiy davlatlar fitosanitariya talablaridan kelib chiqib, avgust piyoz, sarimsoqpiyoz va to'qsonbosti usulida sabzavot ekinlarining eksportbop navlarini yetishtirish va eksport qilish borasidagi ishlarni tashkillashtirish masalalari qo'yilgan. Ushbu qarorning 1-ilovasida Respublikaning barcha toifa xo'jaliklarida 2021-2022 yillarda sarimsoqpiyoz mahsulotini yetishtirishning prognoz ko'rsatgichlari 2021-yil uchun 366 046 tonna, 2022-yil uchun 383 718 tonnani, 2-ilovasida Respublikaning fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi korxonalarida 2021-2022 yillarda sarimsoqpiyoz mahsulotini yetishtirishning prognoz ko'rsatgichlari 2021-yil uchun 100 683 tonna, 2022-yil uchun 107 728 tonnani, va 3-ilovasida Respublikaning dexqon xo'jaliklari va aholi tomorqa maydonlarida 2021-2022 yillarda sarimsoqpiyoz mahsulotini yetishtirishning prognoz ko'rsatgichlari 2021-yil uchun 265 363 tonna, 2022-yil uchun 275 989 tonnani tashkil etadi. Bularni umumlashtirsak Respublikamizda 2021-yil uchun jami 732 092 tonna, 2022-yil uchun jami 767 435 tonna sarimsoqpiyoz mahsulotini yetishtirish prognoz qilingan. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi web-saytida Respublika bo'yicha 2023- yil hosili uchun joriy yilda barcha toifa xo'jaliklari tomonidan 47,1 ming gektar, shundan, fermer va qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan 10,6 ming gektar yer maydonlarga avgust-sentyabr oylarida sarimsoqpiyoz ekinini ekish rejalashtirilgan. Ushbu maydonlardan 458,2 ming tonna mahsulot yetishtirish belgilanganligi aytiladi [2].

MUAMMONING O'RGANILGANLIK DARAJASI

Bu kunga qadar bir qancha dunyo olimlari sarimsoqpiyoz piyozboshini donalarga ajratuvchi qurilma ustida ishlab kelishmoqda. Xususan, Misr olimi Muhomed Ibrohimning "DEVELOPMENT OF A GARLIC BULB SEPARATOR SEPARATING UNIT" maqolasida rezina sirt bilan qoplangan aylanuvchi baraban va u bilan ma'lum masofada joylashgan rezina qoplangan sirt orasidan o'tish orqali sarimsoqpiyoz piyozboshlarini donalarga ajratuvchi qurilmani ilmiy asoslagan [3].

Dan Cujbescu, Catalin Persu, Iuliana Gageanu, Iulian Voisea, Gabriel Gheorghe, Nicoleta Ungureanularning "MECHANIZING THE GARLIC BULBS DETACHING INTO CLOVES" maqolasida gorizantal joylashga ikki aylanuvchi barabanlar orasidan o'tkazish orqali sarimsoqpiyoz piyozboshlarini donalarga ajratishni taklif etgan [4].

Taklif qilinayotgan sarimsoqpiyoz piyozboshini donalarga ajratuvchi qurilmada yuqoridagi kabi ilmiy ishlardan qisman foydalangan va xulosa qilgan holda yangicha optimallashtirilgan qurilma ishlab chiqish va taklif qilinayotgan qurilmaning geometrik parametrlarini yoritib berish maqsad qilingan.

ASOSIY QISM

Qurilmani loyihalashda sarimsoqpiyoz piyozboshlari va donalarining geometrik o'lchamlari o'rganilib chiqildi. Maqolani yoritish uchun tadqiqot davomida olingan natijalarni qisman keltirib o'tamiz. Uzunligi va tashqi diametri elektron chizg'ichdan foydalanildi [5]. Qurilmaning kesik konussimon tashqi qobig'i va barabanlari oralaridagi masofa eng katta qiymatdan kichik qiymatga

o'zgarib borishini hisobga olgan holda sarimsoqpiyoz piyozboshining eng katta hajmlilari tanlab olindi. Ularing o'lchamlari quyidagi (1-jadval) keltirilgan.

1-jadval. Sarimsoqpiyoz piyozboshlarining geometrik o'lchamlari

Sarimsoqpiyoz piyozboshining geometrik o'lchamlari	max	min	O'rtacha
Bo'yi (mm)	47,42	32,33	40,76
Diametri (mm)	69,70	51,51	58,95

Bu yerda piyozboshning bo'yi – piyozboshning bosh (sochli qismi) qismidan dumli qismigacha bo'lgan masofa. Diametri esa – piyozboshning ko'ngdalang kesim yuzasi diametri nazarda tutilgan. Sarimsoqpiyoz pallalarining o'lchamlari, uzunligi va sektorning eng chetki kengliklari (diametri) mos ravishda quyidagi o'lchamlarni tashkil etadi(2-jadval).

2-jadval. Sarimsoqpiyoz donalarining o'lchamlari

Kattaliklar	Uzunligi (mm)		Diametri (mm)	
O'lchamlar	Max (mm)	Min (mm)	Max (mm)	Min (mm)
Yirik dona	37.02	28.66	30.63	19.94
O'rtacha dona	37.16	28.74	21.29	15.86

Hozirgi paytda sarimsoqpiyoz boshini donalarga ajratuvchi qurilma va qurilmani ishchi qismiga sarimsoqpiyoz piyozboshlarini eltuvchi mexanizm mavjud emasligini va qurilmani yasashda uning geometrik o'lchamlari inson omili bilan amalga oshirishini inobatga olgan holda, ya'ni bir ishchi kuchi bir chelak sarimsoqpiyozni qurilmaning ishchi qismiga solib turish qobiliyatidan kelib chiqqan holda olindi. Inson ishchi kuchi yordamida 10 litr hajmga ega bo'lgan chelakdan foydalangan holda sarimsoqpiyoz to'plamini bunkerga solish qulay bo'ladigan darajada balandlik tanlab olish sharti kiritildi. Bu shartni bajarish uchun dastlab 10 litrli chelakga o'rtacha miqdorda qancha dona sarimsoqpiyoz piyozboshi sig'ishini hisoblab olamiz.

Bunda sarimsoqpiyoz piyozboshi shar shakliga yaqin geometrik shaklga ega deb tanlab olindi. Tadqiqot jarayonlarida aniqlangan sarimsoqpiyoz piyozboshining o'rtacha diametri ($D_{o'rt}=7$ sm), va o'rtacha radiusi ($R=3,5$ sm)dan foydalanib, bir dona piyozboshning o'rtacha hajmini topib olamiz.

$$V_{o'rt} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3} \times 3,14 \times 3,5^3 \text{ sm}^3 = 179,50(3) \text{ sm}^3$$

Bu yerda $V_{o'rt}$ – O'rtacha hajmdagi sarimsoqpiyoz piyozboshining hajmi.

Bu kattalikni kichik xatoliklar olinayotgan o'lcham va parametrlarga ta'siri kichik bo'lganligidan piyozboshning o'rtacha hajmini $V_{o'rt} = 180 \text{ sm}^3$ deb olamiz.

Bundan 10 litr, yani $10\,000 \text{ sm}^3$ hajmli chelakga o'rtacha necha dona sarimsoqpiyoz piyozboshi n sig'ishini topib olamiz.

$$n = \frac{V}{V_{o'rt}} = \frac{10000}{180} \approx 56$$

Demak, bizga sarimsoqpiyoz piyozboshlarini qurilmaning ishchi qismiga yo'naltirib beruvchi eng kamida 10000 sm^3 hajmga ega bunker kerak bo'ladi. Ushbu bunker qurilmaning kesik konus shaklidagi tashqi ishchi organi yuqori asosi diametriga teng diametrdagi ma'lum

balandlikga ega slindir tanlab olindi. Qurilma bunkeriga 56 bosh piyozboshni solganimizda piyozboshlarning uchdan ikki qismi ikki qavatdan ishchi qismga va uchdan bir qismi Bunkerda qoladi deb hisoblasak, aylana shakldagi tashqi va ichki qismlar orasiga bir qavatda 19 bosh piyozboshi joylashishi kerak bo'ladi. Ichki va tashqi ishchi organlari orasiga bitta sarimsoqpiyoz piyozboshini joylashishini va bu piyozboshlar orasida taqriban 1 santimetrli masofa saqlagan holda aylana shaklda joylashadi deb hisoblasak, bu uzunligi

$$l_1 = 19 * D_{o'rt};$$

$$l_1 = 19 * D_{o'rt} = 19 * 7\text{sm} = 133\text{ sm}$$

ga teng bo'lgan aylana hosil qiladi.

Bu yerda $D_{o'rt}$ – bitta sarimsoqpiyoz piyozboshining o'rtacha diametri.

Bundan aylanani radiusini aylana uzunligini topish formulasi $l=2\pi r$ orqali topsak $r_1 \approx 21$ sm ga teng bo'lishi kelib chiqadi. Bu r_1 aylanuvchi kesik konus shaklidagi baraban markazidan ikki ishchi sirtlar yani ichki baraban va tashqi kesik konus shaklidagi ishchi organlar yuqori nuqtalari orasida joylashgan sarimsoqpiyoz piyozboshi markazigacha bo'lgan masofa. Qurilmaning Kesik konus shaklidagi ichki aylanuvchi ishchi qismini - ichki baraban, Tashqi kesik konus shaklidagi qobiqni - tashqi qobiq deb ataymiz. Bundan kelib chiqib, tashqi kesik konus shaklidagi ishchi qismning yuqori asosi diametri D ni topishimiz mumkin bo'ladi.


$$D = 2(r_1 + \frac{D_1}{2}) = 2(21 + 3,5) \approx 50\text{ sm}.$$

Sarimsoqpiyoz piyozboshi donalarga ajralishi uchun unga tasir etuvchi kuchlar donalarga ajralishi uchun unga tasir etuvchi kuchlar aylanuvchi ichki kesik konus shaklidagi baraban tasiridan va piyozbosh og'irlik kuchidan kelib chiqadi. Og'irlik kuchini jarayonga ta'sirini kamligidan tadqiqotda va qurilma o'lchamlarini olishda uning ta'siri inobatga olmaymiz. Ichki barabanni o'lchamlarini tashqi ishchi organ o'lchamlaridan kelib chiqib olamiz. Sarimsoqpiyoz unuvchanligini yo'qotmaslik maqsadida ichki barabanning tashqi tomoni hamda tashqi kesik konusning ichki qismi 1 santimetr qalinlikdagi rezina bilan qoplanadi. Ushbu rezina qalinligi va sarimsoqpiyoz o'lchamlarini inobatga olib, ichki barabanning yuqori diametri o'lchamini olamiz.

$$D_1 \leq D - D_{o'rt} - 2 = 50\text{ sm} - 7\text{ sm} - 2\text{sm} \leq 41\text{sm}.$$

Biz D_1 ni 41 sm dan katta bo'lmasligi, ammo undan kichik bo'lishi ortiqcha noqulayliklarga sabab bo'lmasligi, aksincha bundan kichikroq qilib tanlasak, har xil noqulayliklarni chetlab o'tishimiz mumkinligidan uning qiymatini $D_1=40$ sm deb tanlab olamiz.

Demak, D_1 - ichki baraban va tashqi qobiqning yuqori asoslari orasidagi masofa.



1-rasm. Taklif etilayotgan qurilmaning 3D modeli

Loyihalashtirilayotgan sarimsoqpiyoz piyozboshini donalarga ajratuvchi qurilma modelini keltiradi. Ushbu modelda qurilmaning quyi qismi muhim bo'lmaganligi sababli chizmada ko'rsatilmagan.

Kesik konus shaklidagi ishchi organlarning yuqori asoslari diametrlari topildi. Topilgan o'lchamlar, sarimsoqpiyoz piyozboshi va donalarini o'lchamlarini inobatga olib, kesik konuslarning pastki asos diametrlari va balandliklari o'lchamlarini keltirib chiqariladi. 1- va 2-jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib, qurilmadagi ichki baraban va tashqi qobuqlarning quyi qismlari diametrlarini kerakli o'lchamlari keltirib chiqariladi. Sarimsoqpiyoz piyozboshi donalari to'liqligicha donalarga ajralmaslik ehtimoli mavjudligidan ichki baraban va tashqi qobiq orasidagi masofani ikki yoki uchta sarimsoqpiyoz donalari birlashmalari o'lchamlaridan katta qilib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sarimsoqpiyoz donalar birlashgan holda ham ularning uzunliklari o'zgarmaganligi tufayli ularning maksimal uzunligi $l = 4,8 \text{ sm}$. Eng yirik ikki dona birlashgan sarimsoqpiyoz donalari kengligi esa $d^1 = 3,702 * 2 = 7,404 \text{ sm}$. Bulardan bilish mumkinki, donalarga to'liq ajralmagan birlashgan sarimsoqpiyoz donalari qurilmaning ishchi qismidan keyingi bosqichga o'tib olishlari uchun ichki bunker va tashqi qobiq orasidagi masofa d^2 , d^1 masofadan katta bo'lishi kerak. $l < d^1$ ekanligidan biz d^2 masofani d^1 masofadan katta qilib olish kerak bo'ladi. Hisoblashlarga qulay bo'lishi uchun $d^2 = 8 \text{ sm}$ deb qabul qilinadi.

d^2 – Ichki baraban va tashqi qobiqning quyi asoslari orasidagi masofa.

Ishchi organ sirtlari yasovchisi vertikal emas vertikalga burchak ostida yo'nalganligi piyozboshlarni og'irlik kuchi ta'sirida yumalash sodir etishi va o'z holatini o'zgartirishi uchun tanlab olindi. Tashqi qobiq kesik konus shakliga ega. Kesik konus yasovchisini vertikaldan og'ish burchagi tadqiqot jarayonida, sarimsoqpiyoz po'stlog'i bilan tashqi qobiq va ichki barabanlar qoplanadigan rezina o'rtasidagi dumalanish-ishqalanish, sirpanish-ishqalanish ko'ffitsientidan, sarimsoqpiyozning fizik-mexanik xossalariidan, sarimsoqpiyoz piyozboshini o'lchamlaridan kelib chiqib olinadi. Hozirda biz bu balandlikni ixtiyoriy, yuqorida olingan o'lchamlardan keskin farq qilib ketmas darajada tanlanadi. Loyiha bo'yicha ichki barabanning balandligi h va tashqi qobiqning balandli H quyidagi holda qabul qilinadi.

$$H < h$$

Bundan maqsad shundaki, donalarga ajratilishi kerak bo'lgan sarimsoqpiyoz piyozboshlarining o'rtacha o'lchamlariga qarab ichki barabanning holatini yuqoriga ko'tarish yoki pastga tushirish orqali ichki baraban va tashqi qobiqlar orasidagi masofani mos ravishda orttirish yoki kamaytirish imkoniga ega bo'lishdir. Tashqi qobiq kesik konus shakliga ega. Kesik konus yasovchisini vertikaldan og'ish burchagini sarimsoqpiyoz po'stlog'i bilan tashqi qobiq va ichki barabanlar qoplanadigan rezina o'rtasidagi dumalanish-ishqalanish, sirpanish-ishqalanish ko'ffitsientidan, sarimsoqpiyoz piyozboshini o'lchamlaridan olinadi.

Kesik konuslarning pastki asoslari diametrlaridagi farq yuqori asoslari diametrlaridagi farqdan kichik bo'lishi talab etiladi. Buning sababi donalarga ajratilgan sarimsoqpiyoz donalari qurilmaning keyingi bosqich qismiga o'tishini ta'minlashi, donalarga ajralmagan piyozboshlar esa donalarga ajralgunga qadar ishchi qismlar oralig'ida qolishga sabab bo'lishidadir. Ichki baraban va tashqi qobiqlarning balandliklarini ularning diametrlariga yaqin o'lcham bilan olamiz.

$$H = 30 \text{ sm}$$

XULOSA

Sarimsoqpiyozni donalarga ajratuvchi qurilmani ishchi qismiga yo'naltiruvchi bunker balandligi 12 santimetr, diametri 50 santimetr bo'lgan aylana shakliga ega va uning pastki asosi balandligi qurilmaning tashqi ishchi qismining yuqori qismiga payvandlangan bo'lib, u 23 litr hajmga ega. Qurilmaning asosiy ishchi qismi ichki va tashqi joylashgan ikkita kesik konus shaklidagi qattiq metaldan yasalgan jismlardan iborat. Bunda tashqi kesik konusning katta asosi diametri 50 santimetr, kichik asosi diametri 32 santimetr, ichki kesik konusning katta asosi diametri 40 santimetr, kichik asosi diametri 22 santimetrga. Katta kesik konusning ichki, kichik kesik konusning tashqi tomoni 1 santimetr qalinlikga ega bo'lgan rezina bilan qoplangan. Kesik konuslarning balandliklari teng bo'lib 31 santimetrga teng etadi. Bunkerga solingan Sarimsoqpiyoz piyozboshlarini ishchi qismga yo'naltirilishi uchun kichik kesik konusning yuqori asosi asosining diametri 32 santimetr, balandligi 5 santimetr bo'lgan konusdan iborat jism bilan yopiladi.

ADABIYOTLAR

1. <https://Lex.Uz/Uz/Docs/-5407045?Ondate=27.04.2024%2000>.
2. Respublikamizda Sarimsoqpiyoz Mahsulotini Yetishtirishda Mexanizatsiyalashgan Qurilmagalarga Bo'lgan Ehtiyoj Va Uning Samarasi, Quralov Srojiddin Doniyorovich, Qishloq Xo'jaligini Mexanizatsiyalash Ilmiy Tadqiqot Instituti Tayanch Doktoranti, "Qishloq Va Suv Xo'jaligining Zamonaviy Muammolar" 2023-Yil, 12-13 May, 962-964-Betlar.
3. Development Of A Garlic Bulb Separator: 1. Separating Unit. Misr Journal Of Agricultural Engineering · January 2013.
4. Mechanizing The Garlic Bulbs Detaching Into Cloves Impozij Aktualni Zadaci Mehanizacije Poljoprivrede 47, 429-436 Betlar.
5. "O'zbekiston Hududida Sarimsoqpiyoz Yetishtirish Texnologiyasi Va Ekish Davridagi Muammolar" Norchayev D.R., Quralov S.D. (Qxmiti), Rustamova N., Norchayev J.R. (Tiqxmmi Mtu, Qiai) "Юкори Самарали Кишлоқ Хўжалик Машиналарини Яратиш Ва Техника Воситаларидан Фойдаланиш Даражасини Оширишнинг Инновацион Ечимлари" Халқаро Илмий-Техник Конференцияси 273-276-Betlar.

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QURITISH TEXNOLOGIYASIGA UMUMIY YONDASHUV

Samiyeva Zumrad Doniyor qizi

Namangan muhandislik qurilish instituti o'qituvchisi

E-mail: zumradsamiyeva1991@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15133289>

Annotatsiya: Dorivor o'simliklarni quritish ularning bioaktiv moddalarini saqlash va uzoq muddat sifatini saqlab qolish uchun muhim jarayondir. Quritish usulini to'g'ri tanlash o'simliklarning kimyoviy tarkibi va dorivor xususiyatlariga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu maqolada turli quritish texnologiyalari, ularning samaradorligi, shuningdek, na'matakni quritish jarayoni batafsil yoritilgan. Quritish jarayonining asosiy bosqichlari, optimal sharoitlari va sifat baholash mezonlari keltirilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, infraqizil va mikroto'lqinli quritish texnologiyalari bioaktiv moddalarni saqlashda eng samarali hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Dorivor o'simliklar, quritish texnologiyasi, bioaktiv moddalar, infraqizil quritish, mikroto'lqinli quritish, na'matak, o'simliklarni saqlash, namlik darajasi, sifat nazorati, efir moylari.

ОБЩИЙ ПОДХОД К ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Аннотация: Сушка лекарственных растений является важным процессом сохранения их биологически активных веществ и поддержания их долгосрочного качества. Выбор правильного метода сушки напрямую влияет на химический состав и лечебные свойства растений. В этой статье подробно рассматриваются различные технологии сушки, их эффективность, а также процесс сушки ткани. Представлены основные этапы процесса сушки, оптимальные условия и критерии оценки качества. Результаты исследования показывают, что наиболее эффективными для сохранения биологически активных веществ являются инфракрасная и микроволновая технологии сушки.

Ключевые слова: Лекарственные растения, технология сушки, биологически активные вещества, инфракрасная сушка, микроволновая сушка, манная крупа, сохранение растений, уровень влажности, контроль качества, эфирные масла.

A GENERAL APPROACH TO THE TECHNOLOGY OF DRYING MEDICINAL PLANTS

Abstract: Drying medicinal plants is an important process for preserving their bioactive substances and maintaining their long-term quality. The correct choice of drying method directly affects the chemical composition and medicinal properties of plants. This article describes in detail various drying technologies, their effectiveness, as well as the drying process of na'matak. The main stages of the drying process, optimal conditions and quality assessment criteria are presented. The results of the study show that infrared and microwave drying technologies are the most effective in preserving bioactive substances.

Keywords: Medicinal plants, drying technology, bioactive substances, infrared drying, microwave drying, na'matak, plant preservation, humidity level, quality control, essential oils.

KIRISH

Dorivor o'simliklarni quritish ularning bioaktiv moddalarini saqlab qolish va uzoq muddat saqlash uchun muhim texnologik jarayondir. Quritish usulining to'g'ri tanlanishi o'simliklarning kimyoviy tarkibini, xushbo'yliligini va dorivor xususiyatlarini maksimal darajada saqlash imkonini beradi. Ushbu bo'limda dorivor o'simliklarni quritish texnologiyasiga umumiy yondashuv, asosiy bosqichlar va samarali quritish sharoitlari tahlil qilinadi.

O'zbekiston O'rta Osiyo quruq meva, sabzavotlar bilan birgalikda dorivor o'simliklar xom ashyosini ishlab chiqarishda xam yetakchi o'rinlardan birida turadi [1]. Dorivor o'simliklarning quritish jarayoni ularning kimyoviy tarkibi, bioaktiv moddalari va dorivor xususiyatlarini saqlash uchun muhim bosqich hisoblanadi. Quritish, odatda, namlik materialga issiqlikni qo'llash va uchuvchan ho'l tarkibiy qismlarni (ko'p hollarda suv) yo'q qilish jarayonini anglatadi[2]. Quritish usuli va rejimi mahsulot sifatiga sezilarli ta'sir qiladi. An'anaviy konvektiv quritish va zamonaviy infraqizil (IQ) quritish texnologiyalarining samaradorligini o'rganish ushbu jarayonni optimallashtirish uchun zarurdir. Na'mataklarni quritish jarayoni mahsulot sifatini saqlab qolish va energiya samaradorligini ta'minlash uchun muhim jarayondir.

TADQIQOT MATERIALLARI VA USULI

Keling, o'simlik materiallarini quritish texnologiyasiga umumiy yondashuvlarni ko'rib chiqaylik. Bunday materiallarni tabiiy va sun'iy quritish tamoyillari bir xil bo'lib, materialda ham, atrof-muhitda ham sodir bo'ladigan o'zgarishlar bilan belgilanadi[3,6]. Umuman olganda, quritishni jarayon sifatida ko'rib chiqish kerak:

- material ichidagi namlikning harakatlanishi;
- namlikning bug' shakliga o'tishi;
- uning material yuzasidan bug'lanishi;
- quritish kamerasidan tashqarida namlikni olib tashlash.

Dorivor o'simliklarni quritishning asosiy maqsadi:

Bioaktiv moddalarni saqlash (efir moylari, flavonoidlar, alkaloidlar, vitaminlar).

Namlik miqdorini kamaytirish (saqlash davomiyligini oshirish va chirishga qarshi kurash).

Mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlash (zamburug' va bakteriyalarning oldini olish).

O'simliklarning tabiiy rangini, hidini va ta'mini saqlash.

Quritish jarayonining umumiy bosqichlari

1. Xomashyoni tanlash va tayyorlash

To'g'ri yig'im vaqti: O'simliklar bioaktiv moddalarga eng boy bo'lgan vaqtda yig'ilishi kerak (masalan, Na'matak mevalari to'liq pishib etilmasdan qizil rangga o'a boshlagandan to sovuq tushguncha yig'iladi. Hosil to'liq pishganda (sentyabr oylarida) yig'ish tavsiya etilmaydi. Chunki pishib yetilgan mevalarni quritish qiyin va o'simlik o'sadigan maydonlarda sovuq tushishi natijasida undagi askorbin kislotaning keskin kamayib ketishi ham kuzatilgan).

Tozalash: Chang, tuproq va boshqa aralashmalardan tozalash.

Kesish: Quritish jarayonini tezlashtirish uchun katta barg va poyalarni mayda bo'laklarga bo'lish[5].

2. Quritish usulini tanlash

1-jadval. Dorivor o'simliklar uchun quyidagi quritish texnologiyalari qo'llaniladi:

Quritish usuli	Harorat (°C)	Afzalliklari	Kamchiliklari
Tabiiy quritish (soyali joyda)	20-30°C	10-15 kun	Arzon, tabiiy usul

Konvektiv quritish	50-70°C	8-12 soat	Tez, samarali, sanoat uchun mos
Infraqizil quritish	40-60°C	6-10 soat	Tez va sifatli, foydali moddalarni saqlaydi
Vakuum quritish	40-50°C	5-8 soat	Eng yaxshi sifat, vitaminlar saqlanadi
Mikroto'qinli quritish	60-80°C	2-4 soat	Juda tez, sifatli natija

Quritish sharoitlari va samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillar

2-jadval. Dorivor o'simliklarni quritish jarayonining samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq:

Omil	Ta'siri
Harorat	Haddan tashqari yuqori harorat bioaktiv moddalarni parchalaydi. Optimal diapazon 30-60°C.
Havo aylanishi	Doimiy shamollatish namlikning tezroq chiqishini ta'minlaydi.
Namlik darajasi	Past namlikda quritish tezroq sodir bo'ladi.
Quritish vaqti	Haddan tashqari uzoq quritish natijasida o'simliklarning sifati pasayishi mumkin.
Quritish usuli	Har bir o'simlik turi uchun optimal quritish usulini tanlash muhim.

Quritilgan mahsulotning sifatini baholash

3-jadval. Quritish tugagandan so'ng, dorivor o'simliklarning sifatini quyidagi mezonlar bo'yicha tekshirish kerak:

Mezon	Talablar
Namlik miqdori	5-12% oralig'ida bo'lishi kerak.
Rang	Tabiiy rang saqlanishi lozim, kuyish belgilari bo'lmasligi kerak.
Hid	Xushbo'y efir moylari saqlangan bo'lishi lozim.
Strukturaviy yaxlitlik	Barg va gullar butunligi saqlanishi kerak, maydalangan bo'lmasligi lozim.

NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI.

Agar IQ nurlanish spektri qizdirilgan tananing optik xususiyatlariga mos keladigan bo'lsa, bunday ta'sirning samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Bu shuni anglatadiki, maksimal isitish effektiga erishish uchun quritilgan materialning eng katta assimilyatsiya qobiliyatiga ega bo'lgan to'liq uzunligiga teng bo'lgan IQ nurlanishining to'liq uzunligini tanlash kerak. Nihoyat, agar quritilayotgan material ichidagi harorat gradienti qandaydir tarzda oshishi uchun rag'batlantirilsa, namlikning material yuzasiga ko'chishi kuchayadi[4].

4-jadval. Dorivor o'simliklarning ayrim mevalarining tarkibidagi vitaminlar mazmuni

No	O'simlik turining nomi	Asosiy vitaminlar guruhleri	Qarama-qarshi baholash
1	Na'matak	C	5...20 %
		Karotin	12...18 mg %
2	Smorodina	C	0,4 %
		Karotin	3 mg %

3	Do'lana	C	30 mg
		Karotin	0,5 mg

Na'matakni quritish bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

1. Dastlabki tayyorgarlik: Na'matak yuviladi va saralanadi - yaroqsiz yoki shikastlangan mevalar ajratiladi; Mayda va yirik mevalar ajratib olinadi, chunki bir tekis quritish muhim hisoblanadi; Mevalar quritish oldidan namlik miqdori o'lchanadi.

2. Issiqlik bilan ishlov berish (quritish): Quritish jarayoni harorat, havo harakati va vaqt kabi omillarga bog'liq; Optimal harorat: 50-60°C, chunki yuqori harorat bioaktiv moddalarni buzishi mumkin; Namlikni tezroq chiqarish uchun bosqichma-bosqich quritish amalga oshiriladi.

Optimal quritish sharoiti: Harorat: **50-60°C**; Nisbiy namlik: **10-20%**; Havo tezligi: **1.5-2.5 m/s**; Quritish muddati: **4-6 soat**

3. So'nggi qayta ishlash va saqlash: Quritilgan na'matak sovutiladi va namlik darajasi o'lchanadi; Namlik 5-10% gacha kamaytirilsa, uzoq muddat saqlash mumkin; Tayyor mahsulot namlik singdiruvchi materiallarda yoki yopiq idishlarda saqlanadi.

XULOSA

Dorivor o'simliklarni quritish texnologiyasining samaradorligi **quritish usuli, harorat va vaqtning to'g'ri tanlanishiga** bog'liq. **Infraqizil va mikroto'liqlik quritish texnologiyalari** bioaktiv moddalarni saqlashda eng samarali hisoblanadi. Quritilgan mahsulot sifatining yuqori bo'lishi uchun **optimal quritish sharoitlarini** ta'minlash va nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Na'matakni quritish jarayonini to'g'ri olib borish uning dorivor xususiyatlarini saqlab qolish uchun muhim. Optimal quritish usulini tanlash mahsulot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Eng samarali usullar: konvektiv quritish, infraqizil quritish. Tabiiy quritish ham mumkin, lekin chang va mikroorganizmlar ta'siridan saqlanish lozim. Quritilgan na'matakni quruq va salqin joyda saqlash uning yaroqlilik muddatini uzaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdiyev A.A., Hakimova Z.X. Ko'kat Sabzavotlarni Quritishda Kimyoviy Tarkibning O'zgarishi. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. 2021 Y.
2. Eshpo'Latov N., Samiyeva Z. O'Simliklarni Quritish Jarayonini Tadqiq Qilish. O'zbekiston Qishloq Va Suv Xo'jaligi.Maxsus Son 2, 2024 Yil. 115-117 B.
3. Алтухов И.В. Снижение Энергозатратв Процессах Сушки Плодов Лекарственных Растений Путем Управления Прерывным ИК Облучением. Автореферат Дсертации На Соискание Ученой Степени Кандидата Техническиеих Наук. Барнаул – 2000 Г.
4. Eshpo'Latov N., Samiyeva Z. Dorivor O'Simlik Mahsulotlarini Infraqizil Nurlanish Bilan Quritish. Agro Ilm. Maxsus Son 2[1051], 2024 Yil. 91-92 B.
5. Ahmedov A., Ergashev A., Abzalov A., Yulchiyeva M., Mustafakulov D. Dorivor O'Simliklarni Yetishtirish Texnologiyasi Va Ekologiya/ Darslik. [O' . ~ Toshkenf: «Tafakkur Bo'Stoni», 2018. - 167 B
6. Лягинал.А. Повышение Эффективности Сушки Продуктов Растительного Происхождения За Счет Инфракрасно-Конвективного Воздействия. Диссертации На Соискание Ученой Степени Кандидата Техническиеих Наук. Саратов -2010 Г.

УДК 631.1.004.

ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОГАЗА, ПОЛУЧЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКОЙ БИОМАССЫ

Б.Э. Хайриддинов¹, С.А. Утаев¹, С.Ю. Ганиев², У.Дж. Турдиев¹

¹Каршинский государственный университет, г. Карши. ул. Кучабег-17, 180103

²Каршинский государственный технический университет г. Карши, ул.
Мустакиллик 225 180100

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15132944>

Аннотация: В статье приведены результаты теплофизических характеристик продуктов сгорания биогаза получаемого от биогазовой установки построенной в подсобном хозяйстве при ООО «Муборакнефтегаз»

Ключевые слова: продукты сгорания, технологические процессы, степень загрязнения воздуха, теплота сгорания, трёх атомные газы, коэффициент избытка воздуха, динамическая вязкость, коэффициент теплопроводности.

FUNDAMENTALS OF THERMAL PERFORMANCE OF BIOGAS OBTAINED FROM THE PROCESSING OF ORGANIC BIOMASS

Abstract: In article are brought results heat physical features of the products of combustion biogas got from biogas of the installation built in subsidiary facilities under ООО “Muborakneftegaz”.

Keywords: products of combustion, technological processes, degree of the soiling the air, heat of combustion, three atomic gases, factor of the excess of the air, dynamic viscosity, factor heat-conducting.

ВВЕДЕНИЕ

Стратегические направления развития энергетики Республики Узбекистан предусматривают широкое использование нетрадиционных источников энергии, в том числе энергии органической биомассы животных. Расчеты показывают, что при переработке органической биомассы в биологический газ ежегодно можно производить в 4,2 раза больше энергии, чем производится на электростанциях Республики Узбекистан.

Тесно с проблемой обращения с отходами связана еще одна, все более обостряющаяся, проблема охраны окружающей среды, которая также требует интенсивной и рациональной переработки органической биомассы.

Использование возобновляемых источников энергии в мире становится все более актуальным в связи с тем, что традиционные источники энергии (уголь, нефть, природный газ) ограничены, а их использование для производства тепла и электроэнергии наносит огромный вред окружающей среде. В связи с этим все большее значение приобретает солнечная энергетика, которую можно использовать для производства экологически чистой тепловой и электрической энергии [1,2,3,4].

Солнце – гигантский источник «чистой» энергии, не загрязняющей окружающую среду. Эффективное использование солнечной энергии позволяет значительно сократить потребление природных ресурсов. Климатические и погодные условия юга Узбекистана создают широкие возможности для эффективного использования солнечной энергии в Кашкадарьинской области [2,3,4,5].

Для достижения максимальной эффективности образования биогаза анаэробная переработка требует определенных температурных условий и технологических процессов, желательно близких к оптимальному процессу [6,7].

Постановка задачи

В республике основным энергетическим топливом является природный газ, в частности биогаз, получаемый в результате анаэробного разложения органических веществ.

В республике наиболее перспективным является использование анаэробного разложения органических веществ с получением биогаза.

Переработка биомассы в анаэробных условиях осуществляется в специальных автоклавах под давлением (рис. 1). Под воздействием метанобразующих бактерий в бескислородной среде при температуре 30...55°C в реакторе происходит ферментация биомассы с образованием горючего газа - биогаза, который используется для технологических и бытовых нужд.

Из 1 т навоза влажностью 70°C можно получить около 220 м³ биогаза с теплотой сгорания 28...35 МДж/м³. Остатки бродильной массы в варочных котлах представляют собой легкоусвояемую растениями, лишенную возбудителей болезней и семян сорняков, легкоусвояемую жидкость высококонцентрированного органического удобрения (гумуса) [8,9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными элементами биогазовых установок являются варочный котел (реактор ферментации) (2) и газгольдер (резервуар для хранения биогаза) (3). Производительность и экономическая эффективность всей установки зависит от конструкции варочного котла.

Биогазовые установки не требуют специального дорогостоящего оборудования. Срок окупаемости этих установок составляет 2...4 года.




Рис. 1. Принципиальная схема биогазовой установки индивидуального солнечного отопления ООО «Муборакнефтегаз»: 1 – органические отходы; 2-варочный котел; 3-газгольдер; 4-твердые отходы; 5-котел; 6-двигательный электрогенератор; 7-газовая плита; 8-отопительные батареи; 9 и 10 – освещение и электроприборы; 11-обогреваемый варочный котел.

Основными факторами, определяющими широкое внедрение в республике технологии анаэробного разложения органических веществ с получением биогаза, являются:

1) высокая технологическая готовность и экономическая рентабельность; технологическая и эксплуатационная простота биогазовой технологии;

2) для биогазовых технологий сырье доступно практически повсеместно (органические промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы, навоз и т.п.);

3) климатические условия обеспечивают максимальный выход коммерческого биогаза; зимний температурный режим позволяет обеспечить мезофильное брожение (при 30...40 °С) при минимальных затратах биогаза на подогрев в варочных котлах, а в летнее время - затраты на отопление исчезают;

4) широкие возможности комплексного использования биогазовых установок совместно с солнечными установками. Биогаз обычно содержит 75...81% метана. Другие компоненты включают этан, пропан, бутан (1,8...6,2%) [8,9].

Более тяжелые углеводороды представляют большую ценность как химическое сырье. Состав газообразного топлива задается в объемных долях и записывается в следующем виде [6,10].

$$\sum_{i=1}^{i=m} C_n H_{2n+2} + \sum_{i=1}^{i=m} C_n H_{2n} + H_2 + CO + H_2S + O_2 + N_2 + CO_2 = 100\% \quad (1)$$

Теплотехнические расчеты обычно проводятся для сухого состава газообразных топлив. Теплотворная способность сухого газа определяется объемным составом в процентах (%) и известной теплотой сгорания компонентов.

Теплотворная способность газообразного топлива, кДж/м³.

низший

$$Q_{\text{низ}} = 358CH_4 + 638C_2H_6 + 913C_3H_8 + 1187C_4H_{10} + 1461C_5H_{12} + 126,5CO + 107,5H_2 + 234H_2S; \quad (2)$$

высшей

$$Q_{\text{выс}} = 398CH_4 + 698C_2H_6 + 993C_3H_8 + 1282C_4H_{10} + 1572C_5H_{12} + 126,5CO + 127,5H_2 + 254H_2S; \quad (2a)$$

При известном физико-химическом составе природного газа определяют высшую Q⁺ и низшую Q теплоты сгорания - тепловой эквивалент природного газа E = Q_{вх}/29300.

Для полученного биогаза: Q_{низ}=37600...39100 кДж/м³ Q_{выс} = 41800...44700 кДж/м³; E = 1,28.. 1,34.

Как видно из приведенных выше значений, биогаз имеет высокую теплотворную способность.



Рис. 2. Общий вид биогазовой установки индивидуального солнечного отопления ООО «Муборакнефтегаз»:

Это связано с тем, что биогаз имеет повышенное содержание тяжелых углеводородов. При добыче этих углеводородов (в качестве химического сырья) теплотворная способность биогаза снижается на 4...8%.

Для теплотехнических расчетов принимают значение низшей теплоты сгорания топлива. Теоретическое количество воздуха ($\text{м}^3/\text{м}^3$), необходимое для полного сгорания газа, определяется по формуле [1,2,7].

$$V_{air} = 0,0476 \left[0,5CO + 0,5H_2 + 2CH_4 + 1,5H_2S + \sum_{i=1}^{i=m} (m+n/4) C_m H_n - O_2 \right]. \quad (3)$$

Для биогаза справедливо 0,4...11,15 $\text{м}^3/\text{м}^3$.

В реальных условиях воздух для горения топлива подается в большем количестве по сравнению с его теоретическим количеством $V_{изб}$. Отношение фактического количества воздуха, подаваемого в устройство сгорания, к теоретически необходимому $V_{изб}$ называется коэффициентом избытка воздуха:

$$\alpha = V_{aair} / V_{air} \quad (12)$$

Коэффициент избытка воздуха α зависит от конструктивных особенностей топочного устройства, типа и способа сжигания топлива. Значения α изменяются в пределах $\alpha = 1,02...1,5$. Результаты теоретических и экспериментальных исследований представлены на рис. 2.




Рис. 3. Зависимость объема получаемого биогаза от продолжительности ферментации навоза мелкого рогатого скота.

Продукты полного сгорания топлива при $\alpha = 1$ содержат: сухие (неконденсирующиеся в топочном устройстве) трехатомные газы R_2O (CO_2 и SO_2); H_2O – водяной пар, полученный при сжигании водорода; N_2 – топливный азот и азот в теоретически необходимом количестве воздуха.

Кроме того, в состав продуктов сгорания топлива входят водяные пары, образующиеся в результате испарения влаги топлива, пар, вносимый в топку вместе с влажным воздухом. Ведь при $\alpha > 1$ в продуктах сгорания будет присутствовать избыток воздуха (дополнительный кислород и азот).

Продукты сгорания биогаза ООО «Муборакнефтегаз» не содержат сернистого газа SO_2 , поэтому принято $R_2O = CO_2$.

Содержание продуктов сгорания представлено: в процентах и долях.

$$RO_2 + N_2 + H_2O = 100\%; \quad X_1 + X_2 + X_3 = 1; \quad (5)$$
$$X_1 = N_2 / 100; \quad X_2 = RO_2 / 100; \quad X_3 = H_2O / 100.$$

по объёмному содержанию

$$V_{cp} = V_{RO} + V_N + V_{HO} \quad (6)$$

$$V_N = 0,79V_{air} + 0,8N_2 / 100; \quad V_N = 8,5...8,86 m^3 / m^3. \quad (7)$$

Объем сухих трехатомных газов

$$V_{RO} = 0,01 \left[CO_2 + CO + H_2S + \sum_{i=1}^{i=m} m C_m H_n \right]; \quad V_{RO} = 1,09...1,137 m^3 / m^3. \quad (8)$$

Теоретический объем водяного пара, образующегося при сгорании водорода и содержащегося в

$$V_{HO} = 0,01 \left[H_2S + H_2 + 2CH_4 + \sum_{i=1}^{i=m} \frac{n}{2} C_m H_n + 0,124x_c \right] + 0,0161V_{air}; \quad (9)$$

$$V_{HO} = 2,255...2,349 m^3 / m^3$$

(9a)

Объемное содержание продуктов сгорания топлива по формуле (6)

$$V_{cp} = 11,862 \dots 12,357 m^3 / m^3 \quad (10)$$

Процентное содержание компонентов продуктов сгорания топлива

$$N_2 = 100 \times X_1 = 68,92...71,79\%; \quad RO_2 = 100 \times X_2 = 8,83...9,2\%; \quad (11)$$

$$H_2O = 100 \times X_3 = 19,01 \%$$

Теоретическая температура топлива определяется на основе уравнений энергетического баланса процесса сгорания 1 м³ топлива [3,4]

$$Q_{in} \frac{100 - q_3 - q_4 - q_6}{100 - q_4} + Q_n = \sum_{i=1}^{i=3} (V_i C_i) (T_m - T_0); \quad (12)$$

$$\sum_{i=1}^{i=3} (V_i C_i) = V_{RO} C_{RO} + V_N C_N + V_{HO} C_{HO}; \quad (12a)$$

где q_3 – потери тепла от химического недогрева, %; q_4 — потери тепла от механической неполноты сгорания, %; q_6 - теплопотери с физической теплотой шлака, %; Q_h - теплота, вносимая с горячим воздухом, нагретым внутри топочного устройства, кДж/м³;

C_{RO} , C_N , C_{HO} - удельная объемная теплоемкость компонентов продуктов сгорания топлива, кЖ/(м³).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Для газообразного топлива составляющие теплового баланса q_3 , q_4 и q_6 принимаются

$$q_3 = q_4 = q_6 = 0$$

Таким образом, температура сгорания газообразного топлива в соответствии с формулой (12) будет определяться выражением:

$$T_m = (Q_{in} + Q_h) / \left[\sum_{i=1}^{i=3} (V_i C_i) \right] + T_0 \quad (13)$$

Молекулярная масса

$$M_{cp} = M_{RO} X_2 + M_N X_1 + M_{HO} X_3. \quad (14)$$

Значения M_{RO} , M_N , M_{HO} приведены в таблице 1.

$$M_{cp} = 27,571 \text{ кг/Кмоль} \quad (14 \text{ а})$$

Массовая теплоемкость продуктов сгорания

$$C_{cp} = M_{RO2} C_{RO} / M_{cp} + M_N X_1 / C_N / M_{cp} + M_{HO} X_3 C_{HO} / M_{cp} \quad (15)$$

Значения C_{RO} , C_N , C_{HO} приведены в таблице 1.

Плотность сухих продуктов сгорания, кг/м^3

$$\rho_{cp}^d = 0,01[1,96CO_2 + 1,52H_2S + 1,25N_2 + 1,43O_2 + 1,25CO + 0,0899H_2 + \sum(0,536m + 0,045n)C_m H_n]; \quad \rho_{cp}^d = 0,84...0,875 \text{ кг/м}^3. \quad (16)$$

Плотность влажных продуктов сгорания $Q_{увл}$

$$\rho_{cp}^w = \frac{\rho_{cp}^w + \frac{x_c}{1000}}{1 + \frac{x_c}{804}}; \quad \rho_{cp}^w = 0,835...87 \text{ кг/м}^3. \quad (17)$$

Плотность продуктов сгорания в зависимости от температуры

$$\rho_{dcp} = \frac{P_0 M_{cp}}{R_0 T_i} \quad (18)$$

Теплопроводность продуктов сгорания - газовой смеси определяется по формуле (11)

$$\lambda_{cp} = \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3; \quad \lambda_{cp} = 0,0218 \text{ W/(mK)}. \quad (19)$$

Динамическая вязкость продуктов сгорания определяется (11)

$$\mu_{cp} = \frac{\mu_1}{1 + \frac{x_2}{x_1} \Phi_{1,2} + \frac{x_3}{x_1} \Phi_{1,4}} + \frac{\mu_2}{1 + \frac{x_1}{x_2} \Phi_{2,1} + \frac{x_3}{x_2} \Phi_{2,3}} + \frac{\mu_3}{1 + \frac{x_1}{x_3} \Phi_{3,1} + \frac{x_2}{x_3} \Phi_{3,2}}; \quad (20)$$

где $\Phi_{12}... \Phi_{32}$ – функции вязкости:

$$\begin{aligned} \Phi_{1,2} &= \frac{[1 + (\mu_1 / \mu_2)^{1/2} (M_2 / M_1)^{1/4}]^2}{2\sqrt{2}(1 + M_1 / M_2)^{1/2}}; & \Phi_{1,3} &= \frac{[1 + (\mu_1 / \mu_2)^{1/2} (M_3 / M_1)^{1/4}]^2}{2\sqrt{2}(1 + M_1 / M_3)^{1/2}}; \\ \Phi_{2,1} &= \frac{[1 + (\mu_2 / \mu_1)^{1/2} (M_1 / M_2)^{1/4}]^2}{2\sqrt{2}(1 + M_2 / M_1)^{1/2}}; & \Phi_{2,3} &= \frac{[1 + (\mu_2 / \mu_3)^{1/2} (M_3 / M_2)^{1/4}]^2}{2\sqrt{2}(1 + M_2 / M_3)^{1/2}}; \\ \Phi_{3,1} &= \frac{[1 + (\mu_3 / \mu_1)^{1/2} (M_1 / M_2)^{1/4}]^2}{2\sqrt{2}(1 + M_3 / M_1)^{1/2}}; & \Phi_{3,2} &= \frac{[1 + (\mu_3 / \mu_1)^{1/2} (M_2 / M_3)^{1/4}]^2}{2\sqrt{2}(1 + M_3 / M_2)^{1/2}}. \end{aligned}$$

$$\nu_{cp} = \mu_{cp} / \rho_{cp}; \quad a_{cp} = \lambda_{cp} / (\rho_{cp} C_{cp}); \quad Pr_{cp} = \mu_{cp} C_{cp} / \lambda_{cp}. \quad (20a)$$

По формулам (20), (20a):

$$\mu_{cp} = 1,466 \times 10^{-5} \text{ Па с};$$

При известных значениях C_{cp} , λ_{cp} и μ_{cp} определяют коэффициенты кинематической вязкости ($\text{м}^2/\text{с}$) и термодиффузионного аср ($\text{м}^2/\text{с}$), число Прандтля Pr_{cp}

$$\nu_{cp} = \mu_{cp} / \rho_{cp}; \quad a_{cp} = \lambda_{cp} / (\rho_{cp} C_{cp}); \quad Pr_{cp} = \mu_{cp} C_{cp} / \lambda_{cp}. \quad (21)$$

Зависимость теплопроводности λ_{cp} и динамической вязкости μ_{cp} продуктов сгорания от температуры определяют по формуле Сазерленда [11.12]

$$\lambda_{cp} = \lambda_{cp0} A_i; \quad \mu_{cp} = \mu_{cp0} A_i \quad (22)$$

$$\text{где} \quad A_i = \frac{273,15 + B_i}{T_{oi} + B_i} \left(\frac{T_{oi}}{273,15} \right)^{3/2}; \quad T_{oi} = t_{oi} + 273,15 \quad (22a)$$

Значение B_i приведены в таблице 1.

Таким образом, при известных значениях термофизических параметров продуктов сгорания топлива теплота сгорания в соответствии с формулой (13) равна:

$$T_t = 1915 \dots 1995 \text{ К}; \quad \text{or} \quad t_t = 1642 \dots 1722 \text{ }^\circ\text{C} \quad (23)$$

Таблица 1. Физические параметры воздуха и продуктов сгорания при $t = 0^\circ \text{C}$

параметры	воздух	Азот N_2	Углекислый газ CO_2	Водяной пар CO_2
M_i , кг/кмоль	28,95	28	44	18
$100 \times X_i$, %		71,79	9,2	19,01
C_{pi} , КДЖ/(кг К)	$0,9956 + 0,00009299t$	$1,024 + 0,00008855t$	$0,8654 + 0,0002443t$	$1,833 + 0,0003111t$
λ_{oi} В(м К)	0,02438	0,0243	0,0137	0,0162
$\mu_{oi} \times 10^5$, Па с	1,7198	1,66	1,37	0,88
B_i	122	113	239,7	961

При температурах горения $t_t > 1650^\circ \text{C}$ образуются оксиды азота (NO , NO_2 ; NO_4 ; NO_5), которые при соединении с влагой и воздухом образуют азотную кислоту [5-8]. Образование NO и NO_2 ускоряется при повышении температуры, давления и избытка воздуха. Снижение образования NO , NO_2 и их выбросов в атмосферу можно обеспечить, соблюдая условие $\alpha = 1$ и снижая температуру сгорания топлива до $< 1650^\circ \text{C}$. Лучшим способом снижения температуры горения является разбавление топлива дымовыми газами, т.е. рециркуляционное использование продуктов сгорания топлива. Рециркуляция дымовых газов при сжигании природного газа позволяет снизить выбросы NO и NO_2 на 60 % [3-6].

ВЫВОДЫ

Результаты теплофизических характеристик продуктов сгорания биогаза, полученные от биогазовой установки, построенной в подсобном хозяйстве ООО «Муборакнефтегаз», используются для исследования тепловых балансов печных устройств

и котельных установок, моделирования тепломассообмена тепловых процессов с использованием теплоты продуктов сгорания топлива.

Условные обозначения: a_i – коэффициент температуропроводности, $\text{м}^2/\text{с}$; C_i – теплоемкость, $\text{Дж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$; M_i – молекулярная масса, $\text{кг}/\text{кмоль}$; P_0 – барометрическое давление, Па ; R_0 – универсальная газовая постоянная, $\text{Дж}/(\text{К}\cdot\text{кмоль})$; t – температура, $^\circ\text{C}$; T_i – абсолютная температура, К ; x_m – влажность, $\text{кг}/\text{кг}$; X_i – объемные доли компонентов охлаждающей смеси; λ_i – коэффициент теплопроводности, $\text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$; μ_i – коэффициент динамической вязкости, Пас ; ν_i – коэффициент кинематической вязкости, $\text{м}^2/\text{с}$; ρ_i – плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$; Pr_i – критерии подобия Прандтля.

Литература

1. Хайриддинов Б.Э., Н.С.Холмирзаев, Ш.Х.Эргашев. «Сочетание солнечной теплицы-животноводческой фермы с подпочвенным аккумулятором тепла». «Символ науки». Международный научный журнал. Международный центр Omega science инновация 16 (2017)
2. Б.Э.Хайриддинов, Н.С.Холмирзаев, Г.Г.Халимов, А.С.Рысбаев, а Ш.Х.Эргашев, 2018. Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш. *Монография* Т. ADAD PLYUS, 417
3. Б.Э.Хайриддинов, Н.С.Холмирзаев, Ш.Х.Эргашев, А.Б.Хайриддинов, Д.Ж.Нурматова Комбинирование гелиотеплицы-животноводческих ферм с подпочвенным аккумулятором теплица Символ науки. 2017.
4. Ergashev Sh.H. et al “Results of mathematical modeling of nstatic temperature temperature heating of” livestock heat complex”through the use of solar and bio energy” International Conference onremote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022). Vol.12296. SPIE, 2022.
5. Uzakov G.N. Technical and economic calculation of combined heating and cooling systems vegetable store-solar greenhouse. Applied Solar Energy.- Allerton Press, USA,2012-vol. 48 №1-PP. 60-61
6. Khusenov A.A. et al 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1070 012032
7. Ergashev Sh.H. et al 2022 IOP Conf.Ser.: Earth Environ. Sci. 1070 012031
8. Fayziyev T.A., Ergashev Sh.H., Ro'ziqulov G'.Yu., “Chorvachilik komplekslarini loyihalash va ularning issiqlik hamda namlik rejimlari hisobi” Innovatsion texnologiyalar, po 2(42), 2021, pp 60-67.
9. Toshmamatov B.M., G.N.Uzakov., I.N.Kodirov., I.A.Khatamov Calculation of the heat balance of the solar installation for the thermal processing of municipal solid waste.// International Journal of Applied Engineering research and Development (IJAERD) ISSN (P) 2250-1584; ISSN (E): 2278-9383 Vol 10 Issue1, Jun 2020, India. PP. 21-30
10. Uzakov G.N. “Calculation of the heat engineering characteristics of a combined system of a vegetable storage facility and solar greenhouse”.Applied Solar energy 47.3 (2011): 248-251.

07.00.00 – Tarix fanlari

07.00.00 - History

07.00.00 - История

THE NATURE OF THE POSTGRADUATE EDUCATION SYSTEM IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE UZBEK SSR UNDER THE SOVIET GOVERNMENT

Nasilloev Sunnat Shavkat ogli

Second-year PhD student, Bukhara State University

E-mail: s.sh.nasillayev@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208871>

Abstract: This article highlights the challenges and solutions in the training of scientific personnel through postgraduate education in the Uzbek SSR. The Soviet government aimed to utilize scientific achievements as a solution to existing and potential socio-economic problems. In the Soviet Union, favorable conditions were created for research in higher education, and decisions were made to improve the research system, with the goal of enhancing the scientific status of the republics and securing greater economic benefit.

Keywords: Council of Ministers, Uzbek SSR, personnel, Doctor of Science, postgraduate education, dissertation, production.

ХАРАКТЕР СИСТЕМЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УЗБЕКСКОЙ ССР В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Аннотация: В данной статье освещаются проблемы и пути их решения в подготовке научных кадров через аспирантуру в Узбекской ССР. Советское правительство стремилось использовать достижения науки для решения существующих и потенциальных социально-экономических проблем. В Советском Союзе были созданы благоприятные условия для научных исследований в системе высшего образования, а также приняты меры по совершенствованию научной деятельности с целью повышения научного статуса союзных республик и получения большей экономической выгоды.

Ключевые слова: Совет Министров, Узбекская ССР, кадры, доктор наук, аспирантура, диссертация, производство.

INTRODUCTION

During the peak of World War II, all sectors of the national economy were redirected to meet the needs of the front. In order to improve the scope and quality of research, measures were taken to enhance the postgraduate system that allowed for research activities independent of production. However, in the years 1941–1942, the planned admissions to postgraduate programs were not satisfactorily fulfilled. Scientific and educational work with postgraduate students was not well organized. An inspection carried out by the All-Union Committee for Higher Education under the Council of People's Commissars of the USSR revealed that many heads of state educational institutions and directors of higher education institutions did not pay sufficient attention to working with postgraduate students. As a result, many postgraduate students, including those in their final year, were found to have severed ties with their institutions.

Another important point is that on November 16, 1967, the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR issued Resolution No. 1064, and on February 13, 1968, the Central Committee of the Communist Party of Uzbekistan and the Council of Ministers of the Uzbek SSR issued Resolution No. 52, approving the directive "On the Improvement of the Training of Scientific and Scientific-Pedagogical Personnel."

According to the decision of the Central Committee of the Communist Party of Uzbekistan and the Council of Ministers of the Uzbek SSR, between 1960 and 1967, scientific personnel capable of addressing the major issues put forward by the practice of "communist construction" had been developed in the republic. There were also improvements in the training of scientific and scientific-pedagogical personnel. By 1968, nearly 5,000 scientific workers in the republic held academic degrees, including over 350 Doctors of Science. More than 3,000 postgraduate students were actively engaged in research. Taking into account that many specialists were working on dissertations independently, outside of the formal postgraduate system, this number is likely even higher.

Object and Methods of Research: Valuable archival documents were examined using comparative-historical, critical, and objective analysis methods.

RESULTS

To address existing issues, the All-Union Committee for Higher Education under the Council of People's Commissars of the USSR issued directive No. D-09-45¹ on December 18, 1942, "On the Registration of Postgraduate Students," instructing universities to establish proper registration procedures, reconnect with students who had left during wartime, return successful students, and provide favorable conditions for research and dissertation work. Directors, department heads, and academic supervisors were required to monitor students' progress and report research plans to the Committee.

On July 14, 1943, the Committee issued order No. 189², approving the admission plan for postgraduate studies in higher education institutions across the USSR for 1,352 candidates, with a separate list of 250 students to receive military deferments. Enterprises and institutions were instructed to grant applicants 15 days of unpaid leave for entrance exams.

The order signed by Deputy Chairman V. Molotov and Secretary M. Smirnyukov stipulated that admitted postgraduates must be released from work within a month to focus exclusively on research.

DISCUSSION

The order also covered new admission plans by field and institution, approving 832 external study positions and encouraging university directors to include assistants and instructors without degrees but with research potential. It required the return of postgraduates who had temporarily severed ties and called for the introduction of distance learning for those unable to return due to work conditions.

However, the 1960s saw significant shortcomings in scientific training. Young specialists capable of conducting research were not adequately recruited, and many failed to complete dissertations on time. Of 748 students who graduated in 1966, only 64 defended their dissertations promptly. In the Ministry of Agriculture's institutes, only 3 out of 76 students defended on time in 1966, and only 3 out of 64 in 1967. This was due to poor candidate selection, lack of proper research and living conditions, and insufficient involvement of senior scientists and professors.

Postgraduate training plans in vital agricultural sectors were consistently unmet. Institutions often substituted specialties and failed to enroll new students for two years. For instance, in three consecutive years, no students at the Central Asian Sericulture Research Institute

¹ BVDA 532-C-fond, 1-ro'yxat, 78-yig'majild, 34-varaq.

² BVDA 532-C-fond, 1-ro'yxat, 78-yig'majild, 106-varaq.

defended dissertations. Similarly, in 1967, there were no dissertation defenses at the Rainfed Agriculture Institute.

The shortcomings in training scientific and pedagogical personnel were mainly attributed to the Ministry's Scientific Directorate, which paid little attention to this task, poorly supervised research institutions, and provided inadequate support.

CONCLUSION

These findings indicate that scientific training through postgraduate education in agricultural sciences in the Uzbek SSR was poorly organized. Due to the historical importance of legal documents on the Soviet government's science policy, researchers must thoroughly examine archival sources when studying the history of science in Uzbekistan. Literature from 1941–1945 largely reflected Soviet ideology rather than critical perspectives. Despite numerous decrees and orders issued on scientific training in the Uzbek SSR, existing problems were not effectively resolved. On October 25, 1971, a meeting of the Ministry of Agriculture of the Uzbek SSR, chaired by E. Shaykhov, approved decree No. 85 “On the Training of Scientific Personnel through Postgraduate Studies.” It proposed an annual increase of 10–12 spots in economics-related postgraduate programs to support the republic's economic development.

REFERENCES

1. S.Sh. “Nasilloev Sovet hokimiyatining O‘zbekiston SSRdagi ilm-fan siyosati” Iqtidorli talabalar, magistrantlar, tayanch doktorantlar va doktorantlarning “TAFAKKUR VA TALQIN” mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plami II qism. Buxoro – 2023. 7-12 b.
2. S.Sh. Nasilloev, “Sovet hukumatining O‘zbekiston SSR oliy yurtlarida aspirantura bosqichini tartibga solish sohasidagi huquqiy hujjatlari va ularning mohiyati. (ikkinchi jahon urushi davrida)” Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, № 17(54). 49-55 b.
3. S.Sh.Nasilloev “O‘zbekiston fanlar akademiyasining tashkil etilishi” RESEARCH FOCUS xalqaro ilmiy jurnali 2023 yil 5-son 92-98 b.
4. Materials of the National Archives of Uzbekistan.

10.00.00 – Filologiya fanlari

10.00.00 – Philology

10.00.00 – Филология

O'ZBEK VA TURK TILLARIDA NON LEKSEMASI BILAN BOG'LIQ LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLAR

Qabuljonova Gulbahor Komiljonovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali Tillarni o'qitish kafedrası dotsenti

Po'latova Sayyoraxon Obidjon qizi

Andijon davlat universiteti 2-kurs magistranti

E-mail: inomovasayyora619@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208623>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va turk tilshunosligida non leksemasining lingvomadaniy xususiyatlari o'rganildi. Non komponentli frazeologik, premaologik birliklar va o'xshatishlar tahlilga tortildi. Ikki qardosh til qiyosida umumiy va farqli jihatlari o'rganildi.

Kalit so'zlar: Lingvokulturologiya, frazeologik birliklar, premaologik birliklar, o'xshatishlar, non, konsept, urf-odat, ekmek, deyim, benzetme, atasözü.

LINGUO-CULTURAL FEATURES RELATED TO THE LEXEME NON IN UZBEK AND TURKISH LANGUAGES

Abstract: This article examines the linguocultural characteristics of the lexeme non in Uzbek and Turkish linguistics. Phraseological and paremiological units, as well as similes containing the non component, are analyzed. The lexeme non is studied in comparison between the two sister languages, highlighting both common and distinctive aspects

Keywords: Linguoculturology, phraseological units, paremiological units, similes, non, concept, custom, bread, idiom, proverb.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСЕМЫ NON В УЗБЕКСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: В данной статье исследуются лингвокультурологические особенности лексемы non в узбекской и турецкой языкознании. Анализируются фразеологические и паремиологические единицы, содержащие компонент non, а также сравнения. Лексема non изучается посредством сопоставления двух родственных языков с акцентом на их общие и различающиеся стороны.

Ключевые слова: Лингвокультурология, фразеологические единицы, паремиологические единицы, сравнения, non, концепт, обычай, екмек, идиома, benzetme, пословица.

KIRISH

Bugungirivojlanibborayotgantilshunoslikdalingvokulturologik tadqiqotlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Tilshunoslikning yangi sohasi bo'lmish ushbu fan til va madaniyatning kesishgan nuqtasida yuzaga keldi. Butun borliq tilda namoyon bo'lar ekan, xalqlarning necha asrlik urf-odatları, milliy qadriyatları, mentaliteti, turmush tarzi ham tilda o'z aksini topadi. Frazeologik birliklar, premaologik birliklar streotiplar, o'xshatish va ramzlar xalqlarning urf-odatları, kundalik turmushini o'zida aks ettiradi va lingvokulturologiya fanining o'rganish obyekti hisoblanadi.

Insonning ijtimoiy va fiziologik faoliyatida namoyon bo'ladigan eng asosiy ehtiyojlaridan yana biri, birlamchi ehtiyoj, bu — uning taomga bo'lgan ehtiyojidir. [1.B.29] Taom insoniyatning hamisha birlamchi ehtiyojini qondirish vazifasini bajaradi va bu borada ko'plab xalqlarda, xususan,

o'zbek va turk xalqida non asosiy o'rinda turadi. Non — dunyoning ko'plab mamlakatlarida iste'mol qilinadigan asosiy yegulik bo'lib, non tayyorlashning ilk ko'rinishi eramizdan avvalgi davrlarga borib taqaladi. Aniqlanishicha, birinchi xamirturishli non Misrda tayyorlangan. Non dunyo xalqlarida eng mashhur va ko'p iste'mol qilinganligi bois uning o'z bayram kuni bo'lib, har yili 16-oktyabrda Butunjahon non kuni (World Bread Day) nishonlanadi. Ushbu bayram 2006-yilda ta'sis etilib, bugungi kunga qadar nishonlab kelinmoqda.

Non insoniyatning ozuqaviy ehtiyojini qondirishi vositasi bo'libgina qolmay, unga bo'lgan munosabat orqali turli lingvomadaniy xususiyatlarni ifodalashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbek va turk tilshunosligida non leksemasi bir qancha tilshunoslar tomonidan tahlilga tortilgan va lingvistik jihatdan o'rganilgan. Xususan, o'zbek tilshunosligida R.Abdullayeva "O'zbek tilida xarakter ifodalovchi birliklar semantikasi" nomli monografiyasida o'zbek, ingliz va rus xalqlari dunyoqarashida nonning o'rni, o'zbek xalqida "nonko'r" leksemasi xarakter bildiruvchi so'z sifatida qo'llanilishi ta'kidlab o'tiladi. [1.B.17-19] K.Buzurxanovanning "Non/bread konseptini lingvokognitiv va lingvokulturologik nuqati nazardan o'rganishning ahamiyati" nomli maqolasida lingvokulturologiyada non konsepti bilan bog'liq masalalar yoritilgan. [2.B.78-79] O.O'razboyevning "Milliy-mental frazeologizmlar va paremiyalar lingvomadaniy boylik misolida" nomli maqolasida esa "non", "osh", "tuz" tushunchalarining lingvomadaniy xususiyatlari tahlil etilgan.[3.B.82-85]

Turk tilshunosligida prof Hamza Zulfikar "Anlamlari, deyimlari va çeşitleriyle ekmek"- (Ma'nolari, iborolari va turlari bilan non) nomli maqolasida non semantik va lingvokulturologik jihatdan o'rganiladi.[2.B.12-17]Yana bir tilshunos Go'ktash O'merning "Türk kültüründe ekmekle ilgili inanışlar" – (Turk madaniyatida non bilan bog'liq ishonchlar) magistrlik dissertatsiyasida turk xalqining non bilan bog'liq urf-odatları o'rganilgan[1.B.48-56].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Non leksemasi fors tilidan o'zlashgan bo'lib, oziq-ovqat ma'nosini bildiradi. Qo'llanilishi jihatidan ikki xil: 1.Xamirdan tayyorlanib tandir o'choq, tova va shu kabilarda pishiriladigan yegulik; 2. Umuman yegulik-ichgulik, yashash tirikchilik uchun zaruriy narsa [4.O'TIL.III.B.57]. XV asrgacha yozma yodgorliklarda non leksemasi uchramagan.A.Navoiy asarlari tilida non bilan birga "ekmak", "utmak" singari so'zlar qo'llangan. Bu nomlar bizning tilimizda iste'moldan tushib qolgan bo'lsa ham turk tilida "ekmek" tarzida saqlanib qolgan[5.B.27-28] Bugungi kunda shu nomda qo'llaniladi.

Turk tilshunosi Hamza Zulfikar "Anlamlari deyimlari va çeşitleriyle ekmek" – Ma'nolari, iborolari va turlari bilan non maqolasida quyidagilarni bayon etadi: "Türkler ekmek yerine farsça asıllı olan *nan* kelimesini uzun yıllar kullanmışlardır. Osmanlılar ekmek anlamında arapça kökenli *hubz* kelimesini de kullanmıştır. Ekmek kelimesi türkçedir. Dıvan-ı Luğatı- Türkte *etmek* biçiminde geçer. Ekmek biçimi eski metinlerde tespit edilmiştir. Günümüzde halk ağızlarında da *ekmek*, *etmek*, *itmek* biçimlerinde geçen bu kelime, Bitlis'te *etmeyh* deyilir" [2.B.12-13] Ya'ni:Turklar ekmek o'rnida forsha *nan* so'zini uzoq yillar qo'llashgan. Usmonlilar ekmek ma'nosida arapcha *hubz* so'zini ham qo'llashgan. Ekmek so'zi turkchadir. "Devoni lug'ati turkda" *etmek* shaklida yozilgan.Etmek shakli eski matnlarda aniqlangan. Bugungi kunda *ekmek*, *etmek*, *etmeh*, *itmek* shakllarida aytiladigan bu so'z Bitlisda *etmeyh* deyiladi,— deya izohlaydi. Bundan ko'rinadiki, dastlab, "non" har ikki xalqda birdek "ekmek" shaklida qo'llanilgan, biroq keyinchalik o'zbek tilida bu so'z o'rnida forsha "nan" – "non" so'zini qo'llanila boshlangan.

Non xalqning kundalik turmushidan unib chiquvchi iboralarning komponenti sifatida turli lingvomadaniy xususiyatlarni o'zida namoyon etadi. Xususan, o'zbek xalqida ham non komponenti bilan bog'liq turli ifodalarni uchratishimiz mumkin. Masalan,

Noni butun : Ma'lum bir kasbga yoki hunarga ega bo'lgan o'zining moddiy ehtiyojlarini o'zi qondira oladigan insonga nisbatan qo'llaniladi

- *"Sartarosh u dunyo bu dunyo xor bo'lmaydi. Hamma vaqt noni butun",— dedi kampir Shodiyaga. (E.Raimov. Ajab qishloq)*

Noniyarimtabo'lmoq: Biror inson sabab bo'lib, topayotgan pulining kamayishi

- *Nima—Qobilov kelib, nonimiz yarimta bo'lib qoldimi, aksincha, qo'lni-qo'lga berib ishlasangiz, bitta noningiz ikkita bo'ladi. (S.Mahkamov Shogird)*

Noninituyaqilmoq: Kimningdir bo'sh-bayovligi sabab uning haqini ma'lum qismini o'zlashtirish

- *"Bo'shangilik qilsam nonimni tuya qilib berishlari aniq",— o'yladi Yo'lchi. (Oybek. Qutlug'qon)*

Nonyemoq : Kunkechirmoq, tirikchiligini o'tkazmoq

- *Doim hovli, yer janjalidan non yeb yuradigan bir ellikboshi, afandining yo'lini to'sib, ko'rgan tushini aytib berdi. (Latifalar)*

Nonini yemoq : Kimdandir yordam olish

- *Eee sendan birov pul so'rayaptimi? Ol buni biz O'zbekistonni nonini yedik pul olsak uyat bo'ladi.*

Biz qiyoslayotgan turk tilshunosligida ham non komponentli quyidagi iboralar uchraydi:

Ekmek parası (Non puli) : Yaşamakiçinkazanılanpara (yashash uchun topiladigan pul)

- *Ellerinde nasır, sırtlarında ter, toprağa baş eğip ekmek parasını çıkarmaktan başka dertleri yoktu (Orhan Kemal. Bereketli topraklar üzerinde) (Qo'llarida ketmon, sirtlarida ter, tuproqqa bosh egib non pulini topishdan boshqa dardlari yo'q edi)*

Ekmek kapısı (Non eshigi) : Geçimsağlanan iş veya yer (Yashashni taminlaydigan ish yoki joy)

- *Bu dükkân onun ekmek kapısıdır. (Bu do'kon unga non olib keladigan eshikdir)*

Ekmek kavgası (Non topish uchun kurash, harakat) : Geçimderdi, yaşam mücadelesi (Tirikchilik dardi, kun kechirish uchun kurashish)

- *Kasabanın kenar mahallelerinde yaşayan insanlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekmek kavgasına koyulurlar, kimi tarlada çalışır, kimi odun taşır, kimi de zaanat öğrenmeye çıkar gider. (Sabahattin Ali. Kuyucaklı Yusuf) (Shaharchaning Kenar mahallasida yashaydigan insonlar tongninh ilk nurlari bilan birgalikda non uchun kurashni boshlaydilar, kimdir dalada ishlaydi, kimdir o'tin tashiydi, yana kimdir hunarmandchilik ishiga ketadi)*

Ekmeğini taştan çıkarmak (Nonini tosh ostidan chiqarmoq) : Zor şartlar altında bile çalışıp kazanç sağlamak (Sharait qiyin bo'lishiga qaramasdan ishlab tirikchilik qilish)

- *Babam yıllarca ekmeğini taştan çıkardı, şimdi emekliliğin keyfini sürüyor (Dadam yıllar davomida nonini toshdan chiqardi, endi nafaqaxo'rlik davrini suryapti)*

Bir lokma ekmeğe muhtac olmak (Bir burda nonga muhtoj bo'lmoq) : Fakirlik içinde yaşamak (Qashshoqlikda yashash)

- *Öyle bir noktaya gelmişti ki, artık bir lokma ekmeğe muhtac olmuş, her geçen gün biraz daha yoksullaşmıştı O gün akşam yemeği yerine sokaktan geçen bir dilenciden aldığı birkaç kuru ekmek parçasıyla yetinmek zorunda kaldı (Shunday bir holatga kelgandiki, endi bir luqma*

nonga muhtoj bo'ldi, har o'tgan kun yanada yo'qsul holatga tushayotgan edi. O'sha kuni kechgi ovqatga bir tilanchidan olgan qattiq non parchasinigina yeyishga majbur bo'ldi)

Ekmeğini paylaşmak (Nonini bo'lishmoq) : Sahip olduğu az bir şeyla başkalaına yardım etmek (O'zining ozgına narsasi bilan boshqalarga yordam bermoq)

- *Kadınlar sabah erkenden tarlada çalışırken heç bir karşılıksız birbirlerinin ekmeğini paylaşıyor, zor zamanlarda birbirlerine destek oluyorlardı (Ayollar erta tongdan dalada ishlarkan, hech bir qarshiliksiz nonlarini bo'lishishardi, qiyin vaqtlarda bir birlariga dastak bo'lishardi)*

Ekmeğini yemek (Nonini yemoq) : Birkishiningturli imkoniyat, yordamolgan kishiga joyga nisbatan

- Bu vatanın ekmeğini yedik, ona nasıl hor bakalım (Bu vatanning nonini yedik uni qanday qilib xor qilamiz)

Ekmek yiyen, ekmek verdiği kapıyı bilmez mi ? (Non yegan, non bergan eshikni bilmaydimi ?) : İyilik gördüğü kişiye nankörlük edenlere söylenir (Yaxshilik qilgan kishiga nonko'rlik qilgan odamga aytiladi)

- *Ahmet yıllarca köyde ekmek parasını kazanmasına yardımcı olan amcasının hakkını inkar edince, köy halkı arasında Ekmek yiyen, ekmek verdiği kapıyı bilmez mi ? dedikleri duyulmaya başlandı (Ahmad yıllar davomida qishloqda non topib yeyishiga yordamchi bo'lgan amakisining haqqini inkor qilishi bilan, qishloqda Non yegan, non bergan eshikni bilmaydimi? degan gaplar eshitila boshladi)*

İki ekmek arasında kalmak (İkkita non orasida qolmoq) : Çok zor bir durumda çaresizlik içinde olmak (Juda ham qiyin vaziyatda chorasizlikda qolish)

- *Feride iki ekmek arasında kalmış gibiydi, her ne seçse birinden vazgeçmek zorundaydı (Farida ikkita non orasida qolgandek edi, har qanday tanlov qilganda ham bittasidan voz kechishi kerak edi)*

O'zbek va turktilaridagi non komponentli iboralar ma'nosi va qo'llanishi qiyoslaganda ikki xalqda ham non majoziy ma'noda umumiy tirikchilik, kun kechirish uchun hayotiy zarurat kabi ma'nolarni anglatayotganligini ko'ramiz. Har ikki xalq ham non ramziy ma'noda jamiyatda yashayotgan insonlarning ijtimoiy ahvoli va yashash tarzi bilan bog'liq lingvomadaniy jihatlarni aks ettirishga xizmat qiladi. Bundan anglashiladiki, har ikki xalq madaniyatida nonning ahamiyati yuksak darajada.

Insonlarning kundalik turmush tarzini maqollar yorqin ko'rsatib bera oladi. Maqollar qisqa, ixcham va lo'nda bo'lishiga qaramay, zamirida chuqur ma'nolarni ifodalaydi. O'zbek xalqida non bilan bog'liq ko'plab maqollarni uchratish mumkin: *Non bo'lsa bas, o'zgasi havas;*

Non ham non, ushog'i ham non;

Mehnatli non — shakar, mehnatsiz non — zahar;

Non yemoqchi bo'lsang, o'tin tashishdan erinma;

Sen ishni quvsang, non seni quvar;

Belog'rimaganning non yeyishini ko'r singlarimaqollar qo'llanilsa, turk tilida: Ekmek aslanın ağzında (Non sherning og'zida);

Ekmek bulursan aşını, bulamazsan başını ye (Non topsang osh yeysan topolmasang boshingni yeysan);

Ekmeğini ye, şükürünü et (Noningni ye shukurini ayt);

Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur (Nonning kattasi katta xamirdan bo'ladi) singari maqollar qo'llaniladi.

Non bilan bog'liq har ikki xalq maqollari bir-biridan leksik komponentlari jihatidan farq qilsa-da, mazmun jihatidan o'xshash deya olamiz. Maqollarda umumiy shukronalik, mehnat qilishlik, erishilgan natija qilingan sayi-harakatga bog'liqligi singari ma'nolar ifodalamoqda. Ushbu maqollarning etimologiyasiga e'tiborimizni qaratsak o'zbek xalqida odatga ko'ra dasturxonga birinchi bo'lib non qo'yiladi va nonsiz taom tanovul qilinmaydi. Turk tilshunosi Hamza Zulfiqor non haqida shunday yozadi: "Ekmek yediğimiz besinlerin başında gelir. Bizde ekmezsiz sofrta kurulmaz,sofradaki her yemek ekmekle yenir. Ekmeğe katık gerekir. Katıksız ekmeğe yavan ekmek denir. Yavan ekmek Anadolu'nun çeşitli köşelerinde bir zamanlar insanların tek besin maddesiydi. Gene Anadolu'de ekmeğe katık olarak soğan yenir. Kolay ve ucuz olan bu besin üzerine Bitlis'te şu olay anlatırıldı: Ölmuş arkadaşının başında ağlayan biri durmadan Ekmek çok soğan çok bu niye oluyor dermiş? [2.B.12-17]"Non yemaklarning boshida keladi, dasturxondagi hamma taom non bilan yeyiladi. Bizda yemak stoli nonsiz bo'lmaydi. Non uchun qatiq kerak. Qatiqsiz nonga yavan ekmek deyiladi Yavan ekmek Anado'lining bir zamonlardagi yagona yemagi edi. Anado'lida nonga piyoz qo'shib yeyiladi.Oson va arzon bu yemak haqida Bitlisda shunday voqea aytiladi: Bir kishi o'lgan do'stining boshida yig'lab to'xtovsiz, non bor, piyoz bor bu nimaga o'ladi demish? Anglashiladiki, ikki xalq oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini umumiy non bilan ifodalaydi.

Har ikki xalq madaniyatiga ko'ra non muqaddas narsa va eng katta ozuqaviy ehtiyoj sifatida qaraladi va bunday odatlar, qarashlar zamirida har ikki xalqda maqollar va shu bilan bir qatorda o'xshatishlar ham yuzaga kelgan bo'lib nutqimizni yanada bo'yoqdor, ta'sirchan ifodalashga xizmat qiladi. Xususan, o'zbek tilida non komponentli o'xshatishlarga quyidagi misosollarni keltirish mumkin:

Nondekaziz: Juda ham qadrlilikni ifodalash uchun qo'llaniladi

- *Bu kitob menga yaqin insonimdan hadiya, shuning uchun ham bu kitob men uchun nondek aziz*

Nongadoyi: Nochorlik, qashshoqlik

- *U yo o'z-o'zini o'ldirardi, yo xizmatkor yigit bilan bir yurtga qochib, kambag'allikda, non gadoyi bo'lib yashardi. (Oybek. Tanlangan asarlar)*

Singarilarni misol qilib keltirsak, turk tilida:

Ekmek gibi temiz (Non kabi toza) :Safkatkli ve dürüst olan kişiler için kullanılır (Sodda va halol bo'lgan insonlarga nisbatan qo'llaniladi)

- *O çocuğun yüzü ekmek gibi temizdi, içinde kötülük yoktu (U bolaning yuzi non kabi toza edi, unda yomonlik yo'q edi)*

Ekmek gibi muhtaç (Non kabi muhtoj) : Bir şeye büyük ihtiyaç duymayı ifade eder (Bir narsaga bo'lgan ehtiyojning yuqoriligi, zarurligi)

- *İnsan dostluğa ekmek gibi muhtaçtır (Inson do'stga non kabi muhtojdir)*

- *O sevgiye ekmek gibi muhtaçtı (U sevgiga non kabi muhtoj edi)*

Yuqorida aytilganidek odamlar ozuqadan eng katta ehtiyoji non bo'lganligi sababli, biror narsaning juda ham zarurligini ifodalashda, o'zbek xalqi ham, turk xalqi ham non so'zidan foydalanishadi. Bunday o'xshatishlar zamirida tabiiyki, nonga bo'lgan munosabat yotadi. Qolaversa, turk xalqi insonlarga xos halollik, poklik xususiyatni ham nonga qiyoslaydi. Bilamizki, odatga ko'ra non eng aziz narsa sifatida qaraladi va non behurmat qilinganda, albatta, buning uchun jazolanadi deb ishoniladi. Xalqimizda onalar qadimdan bolalariga "Nonning ushog'ini tepkilama, ko'r bo'lasan",— deb uqtiradi, bolalar esa ko'r bo'lishdan qo'rqib non ushog'ini ezmazlikka, ushoqni yerga tushirmaslikka urinishadi. Shunday qilib, bolalikdan nonni e'zozlashga

va nonga behurmatlik qilishning yaxshi emasligi o'rgatilganli tufayli tilda ma'lum bir so'zni rost ekanligini isbotlashda yoki kimdandir norozi bo'lganda qarg'ish ma'nosida non komponentli ayrim so'zlardan foydalaniladi. Masalan o'zbek xalqida:

Nonursin : Kimdandir norozi bo'lganda qarg'ish yoki so'zini isbotlamoqchi bo'lganda — *O'zimhamhayronman. Ashulasini eshitsam bo'ldi, deymen o'z ko'nglimda. Ashullasiga, ovozigah ishqim bor, unaqa itlik yo'q ... — Obbo! Itlik yo'q sizda-ya? E to'vba... — Non ursin agar... — Bo'pti bo'lmasa ! — dedi u. — Itlikni shu yerda qoldirib, uni yoniga odam bo'lib qaytasiz. (Cho'lpon. Kecha va kunduz)*so'zni isbotlash ma'nosida,

Nonning uvoli tutsin : Norozilik, birovning qilganyaxshiligini qadrlamagan, noshukrlik qilgan odamni qoralash, la'natlash ma'nosida ishlatiladi.

- *Aka, nega doim shu yigitni oqlaysiz? Shuncha yordam berdingiz, bir rahmatini aytmadi. Nonning uvoli tutsin, aka, bunday noshukrlarga rahmingiz kelmasin!*

Turk xalqida ham ayni shu ma'nolarda:

Ekmek hakki için (Non haqqi) : Kişisöylediklerinin doğru olduğunu kanıtlamak için kullanılır (Kishi aytganlarini rost ekanligini isbotlash uchun qo'llaniladi)

- *Ekmek hakki için söylüyorum, o gece orada değildim! (Non haqqi gapiryapman, o'sha kechadau yerda emasdim!)*

Ekmek çarpsın (Nonursin): Söylediğinin doğru olduğunu uyalansöylemediğini iddia ettiğii için (Aytganlarini rost ekanligini yolg'on gapirmayotganini isbotlash uchun qo'llaniladi)

- *Ekmek çarpsın, ben görmedim o mesajı! (Non ursin men ko'rmadim u xabarni!)*

Ekmegin üzerine yemin ederim (Non ustida qasam ichaman) : Bir kesin olarak doğru olduğunu belirtmek için (Bir narsaning shubhasiz to'g'ri ekanligini ko'rsatish uchun)

- *Ekmegin üzerine yemin ederim, o parayı ben almadım (Non haqqi qasam ichaman, u pulni men olmadim)*

Yuqorida keltirilgan misollardan ko'ramizki, non bilan bog'liq pragmatik mazmun kki xalqda ham bir xil ma'noda qo'llanilishi jihatidan mushtaraklik hosil qiladi.

Non har ikki qardosh xalqda **“baraka, rizq-ro'z”** ramzi hisoblanadi. Bu bilan bog'liq **nontishlash** odati bo'lib, unga ko'ra uzoq, xatarli safarga ketayotgan erkaklarga rizqi tursin deb, butun nonni bir chetidan tishlab berishini aytishgan va tishlangan nonni yuqoriroq joyga osib qo'yishgan. Bu odat dinimiz bilan ham bog'liq bo'lib, islom dinida insonning rizqi tugamaguncha umri tugamaydi deyiladi. Shu bois uzoq xatarli safarga ketayotgan erkaklarga non tishlatishadi va tishlangan nonning qolgan qismi uning rizqi hisoblanib rizqi qolgan joyga qaytib keladi degan maqsadda nonni ehtiyotlab olib qo'yishgan. Shunday odatlar turk xalqida ham mavjud bo'lib, turk tilshunosi Go'ktash O'merning “Turk madaniyatida non bilan bog'liq ishonchlar” (Göktaş Ömer. Türk kültüründe ekmekle ilgili inanışlar) tadqiqot ishida [1.B.56] “Uzak bir yolculuğa çıkacak kişiye bir parça ekmek verilerek yemesi istenir. Bu hem doyurucu bir besin sağlaması hem de koruyucu bir anlam taşıması açısından önemlidir” (Uzoq yo'lga chiqayotgan insonga bir parcha non berilib yeyishi aytiladi, bu holat ham safarda rizqli bo'lishi, ham himoya qilishi uchun ahamiyatlidir) deyiladi. Shu bilan bir qatorda turk xalqida non bilan bog'liq bir qancha odatlar mavjud bo'lib ular quyidagilardir:

Dügünde gelinin erkek evine uğurlanırken bereket getirsin diye heybesine ekmek konulması (Nikoh to'yida kelinning kuyovning uyiga ketishida barokat keltirsin deb olib ketayotgan narsalari orasiga non qo'yilishi)

Sofrasında birkaç defa ekmek bölünün çocuğün çok olacağıya inanması yanı çok çocuğün olmasını isteyen insanlar sofrasına çok ekmek koyarlar. (Dasturxoniga nonni ko'p qo'yganning

bolasi ko‘p bo‘lishiga ishonishi ya’ni farzandi ko‘p bo‘lishini xohlaydigan insonlar dasturxoniga nonni ko‘p qo‘yadilar

Xalqimiz urf-odatiga ko‘ra non muqaddas, aziz narsa hisoblanadi, uning ushog‘ini ham avaylab yerga tushgudek bo‘lsa, olib ko‘zga suriladi. Yotadigan o‘ringa non ushog‘i tushgan bo‘lsa, uxlaydigan odam yaxshi uxlayolmaydi, yomon tushlar ko‘radi deb yotishdan oldin yotoq non uvoqlaridan tozalanadi. Non turk xalqida ham o‘zbek xalqidagidek muqaddas hisoblanib, yuqorida keltirilgan holatlar turk xalqida ham ayni ko‘rinishda tus oladi. Go‘ktash O‘merning Turk madaniyatida non bilan bog‘liq ishonchlar (Göktaş Ömer. Türk kültüründe ekmekle ilgili inanışlar) tadqiqot ishida quyidagilarni keltiradi[1]:“Türk toplumunda ekmek her yönüyle kutsaldır. Yere düşürüldüğünde öpülen tek nemet ekmektir. Bu uygulama toplumumuza has bir uygulamadır. Ekmeğe asla ayakla basılmaz, basıldığı takdirde günaha giriliceğine inanılır. Eğer yatakta ekmek kırıntısı olursa ve onun üzerine yatılırsa kişinin gece kötü kabuslar göreceğine ve rahatsız edileceğine inanılır... “ (Turk xalqida non har jihatdan muqaddasdir. Yerga tushganda o‘piladigan yagona ne‘mat nondir. Bu odat xalqimizga xos bir odatdir. Nonni aslo oyoqda bosilmaydi, bosilgan taqdirda gunoh bo‘lishiga ishoniladi. Agar yotoqda non uvog‘i bo‘lsa va uning ustida yotilsa, kishining tunda yomon tushlar ko‘rishi va rohatsiz bo‘lishiga ishoniladi)

XULOSA

O‘zbek va turk tillarida non leksemasi bog‘liq lingvokulturologik xususiyatlari qiyoslab o‘rganilganda, anglashildiki, tarixan san’ati, madaniyati, qadriyatlari bir bo‘lgan qardosh xalqlar tilida non komponentli iboralar, maqollar, o‘xshatishlar anglatayotgan mazmuni jihatidan o‘xshashdir. So‘zni qo‘llanilishi ham tarixan bir xil, biroq keyinchalik o‘zgarishga uchragan.

Bugungi kunga qadar ushbu mavzuda ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lsa-da, ammo lingvokulturologik jihatdan to‘liq o‘rganilmagan va bu boradagi tadqiqotlar tilshunoslikdagi dolzarb masalalar sirasiga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ермакова Л.Р. Лютонические прагматонимы и национальный характер: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Белгород, 2011. – С.29.

O‘zbek tilidagi adabiyotlar

1. Abdullayeva R. “O‘zbek tilida xarakter ifodalovchi birliklar semantikasi” monografiya. Toshken-2022 17-19 b
2. Buzurxonova K. “Non/bread konseptini lingvokognitiv va lingvokulturologik nuqtai nazardan o‘rganishning ahamiyati” maqola “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” konfrensiya 78-79 b
3. O‘razboyev O. “Milliy-mental frazeologizmlar va paremiyalar lingvomadaniy boylik misolida” maqola <http://web-journal.ru/> 2024. 82-85 b
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati III jild. 2022. 57b
5. Xudoyorova M. O‘zbek tilidagi taom nomlarining lingvistik tahlili(Qoraqalpog‘iston hududi materiallari asosida) nom.diss.- Toshkent .2008 B.27-28

Turk tilidagi adabiyotlar

1. Göktaş Ömer. “Türk kültüründe ekmekle ilgili inanışlar” Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011 48-56 s
2. Hamza Zulfikar “Anlamları deyimleri ve çeşitleriyle ekmek” Türk dili.12-17 s

LOTIN TILINING ZAMONAVIY TIBBIYOT TA'LIMIDA O'RNI

TUTGAN

Ulmasova Ruxshona Farruxovna

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti 2-son Davolash ishi fakulteti

Normurodova Sohiba Mallayevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15132775>

Annotatsiya: Maqolada hozirgi davrda lotin tilining tibbiyotdagi o'rni tahlil qilinadi. Lotin tili katolikdinining asosiy tili bo'lib, tibbiyotda anatomik, klinikva farmatsevtik atamalarni shakllantirish uchun xizmatqiladi. G'arbiy Evropa tillarining shakllanishida, mashhur va professional iboralar bilan boyitishda lotintilining roli juda kattaligi va xilma-xilligini ifodalabberadi.

Kalit so'zlar: lotin tili, tibbiyot terminologiyasi, o'lik til, kasbiy iboralar, so'zlar.

РОЛЬ ЛАТЫНИ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В статье анализируется роль латыни в медицине в современную эпоху. Латынь является основным языком Католической церкви и используется в медицине для образования анатомических, клинических и фармацевтических терминов. Роль латыни в формировании западноевропейских языков, в обогащении их народными и профессиональными выражениями весьма велика и многообразна.

Ключевые слова: латынь, медицинская терминология, мертвый язык, профессиональные выражения, слова.

THE ROLE OF LATIN IN MODERN MEDICAL EDUCATION

Abstract: The article analyzes the role of Latin in medicine in the modern era. Latin is the main language of the Catholic Church and serves to form anatomical, clinical and pharmaceutical terms in medicine. The role of Latin in the formation of Western European languages, in enriching it with popular and professional expressions, is very large and diverse.

Keywords: Latin, medical terminology, dead language, professional expressions, words.

KIRISH

Lotin tili o'lik til ekanligi eramizdan avvalgi V-VI asrlardan ma'lum. O'lik til foydalanishda mavjud bo'lmagan tildir, deb ishonilsada, lotin tili atamalar iqolozmalarda ishlatilgan va ishlatilib kelmoqabu "o'lik til" siz inson faoliyatining ko'plab sohalarinitasavvur qilib bo'lmaydi. Lotin tilining doirasi juda keng va sezilarli xilma-xilligi bilan ajralib turadi. 19-asrda fan sohasida lotin tili o'rnini milliy tillargabo'shatib berdi.

ASOSIY QISM

Hozirgi vaqtda lotin tilining ahamiyati, tabiiyki, tibbiyotda juda katta, ammo u gumanitar ta'limtizimida ham juda muhim rol o'ynaydi. Shuninguchun, tibbiy terminologiya xalqaro tibbiy lug'atbo'lib, asosan lotin va yunon tillari va ularning shakllari asosida qurilgan. Ushbu lug'at butun dunyobo'ylab tibbiyot sohasi vakillari uchun bir xil darajadatushunarli bo'lishi kerak.

Lotin tili, yuqorida aytib o'tilganidek, zamonaviyroman tillarini o'rganishda zarurdir, chunki butillarning tarixi, ko'plab fonetik va grammatik atamalar va lug'atning xususiyatlarini faqat lotin tilini bilishasosida tushunish mumkin.

Ozroq bo'lsa-da, grammatik va leksik tizimigalotin tili ham katta ta'sir ko'rsatgan german tillarini(ingliz, nemis) o'rganuvchilarga ham tegishli. Lotintili, shubhasiz, har qanday sohaga yordam beradi.

Lotin - dunyodagi barcha shifokorlarning ilmiymuloqot tili. Ingliz shifokori tomonidan yozilganretsept Hindiston, Rossiya, Meksika yoki Angoladashifokor tomonidan o'qiladi. Roman guruhining barchatillari o'zlarining lug'atlarida qo'shimcha ravishda, ozgina bo'lsa-da, ularning morfologiyasida lotintilining xususiyatlarini o'z ichiga oladi.

Fransuz adabiy tilining shakllanishi davrida ungalotin tili sintaksisi sezilarli ta'sir ko'rsatdi, uning ta'siriostida fransuz tilidagi kelishik qoidalari, shuningdek, infinitiv shakllari shakllandi. Barcha zamonaviytillarning zamirida lotin tili yotadi. Lotin tili iboralarifaqatgina tibbiyot sohasida emas,balki, barchajabhalarda qo'llaniladi.Zamonaviy tillarning ildiziningko'p qismi lotin so'zlaridan tashkil topgan. Yevropatillari qo'lyozmalarining ko'p qismi lotin alifbosigaasoslangan. Biologiya, tibbiyot va yuridik sohalardalotin tili atamashunosligi mustahkam ildiz otdi. Ayniqsa, tibbiyot sohasida lotin-yunon atamalariqo'llanilib kelmoqda. Lotin tilida ifodalangan ko'pginahikmatli so'zlar antik yozuvchilar,faylasuflar vatibbiyot olimlarining nutqidan olingan hikmatli iboralardir. Yunon faylasufi Gippokratning: *Ars longa, vita brevis* (hayot qisqa, san'at abadiydir), *Invia est in medicina via sine lingua Latina* (Lotin tilisiz tibbiyotgayo'l yo'q) kabi hikmatli iboralari bizgacha yetibkelgan.

Gaudeamus- talabalar madhiyasi o'rta asrlarda lotintilida yozilgan bo'lib, dunyoning barcha qismiga yetibborgan. Lotin tilini tibbiyot va veterinariyainstitutlarida, universitetlarning biologiya va tabiiyfanlar fakultetlarida o'rganish zarurligiga shubha yo'q.

Lotin tili falsafiy suhbatlar uchun ham, kundalik suhbatlar uchun ham xizmat qildi. Bugungi kunda lotin alifbosi dunyo tillarining yarmiga xizmat qilmaydimi?

Rim raqamlariga kelsak, ehtimol ularni faqatAntarktida aholisi ishlatmaydi. Lekin, lotin tili alifbosiko'pchilik davlatlarga xizmat qilishi ma'lum. Lotintilining xalqaro ilmiy va badiiy madaniyat tili sifatidagiasosiy fikrlarni ko'rib chiqish, uning bizning davrimizehtiyojlariga muvofiq yashash va rivojlanish qobiliyatihaqida xulosa chiqarish imkonini beradi.Lotin tilidanashr etilgan jurnallar ko'p sonlidir: "Latinitas" (Vatikan), " Palaestra Latina" (Barselona), "VoxLatina" (Saarbrücken), "Vita Latina" (Avignon), "Orbis Latinus (Mendoza), Argentina). Lotin (yozmatil sifatida) tibbiyot, tabiatshunoslik va yuridikterminologiyaning xalqaro tili bo'lib qoladi.

Lotin tili zamonaviy katolik cherkovi tomonidanrasmiy til sifatida qo'llaniladi. Vatikan hujjatlari lotintilida saqlanadi va papalarning xabarleri jamlanadi. G'arb diniy an'alariga ko'ra, ilmiy dissertatsiyalarva qo'lyozmalar hali ham lotin tilida yoziladi. Lotintilini bilish katolik cherkovi ruhoniylari uchun ajralmashisoblanadi.

Lotin tili qariyb 20 asr davomida Yevropaxalqlariga aloqa vositasi sifatida xizmat qildi. Uningyordami bilan ular Rim va qisman yunon madaniyatibilan tanishdilar va idrok etdilar. Bundan tashqari, Evropa tillari lug'aviy boyitish manbai sifatida lotintilidan foydalangan. Olimlarning hisob-kitoblarigako'ra, ingliz tilidagi eng keng tarqalgan 20 mingso'zdan 10400 ga yaqini lotin, 2200 ga yaqini yunonva atigi 5400 ga yaqini anglo-sakson so'zlaridir. Bugungi kunda roman tillarida so'zlashuvchilarningumumiy soni 580 million kishini tashkil qiladi. 60 danortiq mamlakatlar milliy yoki rasmiy tillar sifatidaroman tillaridan foydalanadilar (jumladan: fransuz - 30, ispan - 20, portugal - 7, italyan - 3) va lotin yozuvitizimidan taxminan 30% foydalaniladi. Lotin tilida juda aniq so'z yasaliish tizimi

yaratilgan. Shuning uchun, lotin tili (va qisman yunon tili) ilmiy-texnik terminologiyani shakllantirish uchun xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, lotintili qadimgi yunon tili bilan bir qatorda hozir hamxalqaro ijtimoiy-siyosiy va ilmiy terminologiyaning shakllanishida manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ko'rinishidiki, lotin tilini o'rganish va bu boradagi bilimlarni yuqori darajada saqlash, zamonaviy ta'limning o'ta dolzarb vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. L.U.Xojayeva, X.A.Zohidova, Z.Z.Raxmatillayeva. Lotin Tili. 2005. B-7-9
2. V.M. Hakimova. «Роль Латинского Языка В Медицине И В Современном Мире». B.132-134.
3. A.B.Подосинов. Lingua Latina. Введение В Латинский Язык И Античную Культуру. 1998. -B.3-4.
4. М.Н. Чернявский. Латинский Язык И Основы Медицинский Терминологии. - 2002. B.9-16.
5. Normurodova, Sokhiba. "The Social And Cultural Importance Of The Latin Language And Its Present And Historical Landscape." Центральноазиатский Журнал Академических Исследований 2.5 (2024): 51-55.4.
6. Normurodova, S. M., & Yorova, S. K. (2023). Nemis Tili Frazologik Birikmalari Va Tilning Lug'at Boyligi. Science And Education, 4(2), 1672-1675.
7. Yorova, S., Aytmuratova, P., Esanova, M., & Normurodova, S. (2023). Phraseological Units In The Medical Field Of English And Uzbek Cultures. Development And Innovations In Science, 2(2), 10-13.
8. Sohiba, N., & Perkhan, A. (2023). The Role Of Latin Terms In Medicine. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 8.036, 12(10), 1-3.
9. Zafar, M., & Sohiba, N. (2023). Kundalik Turmushda Keng Qo'llanilishda Bo'lgan Suyuqliklarni Ifodalovchi Dori Shakllari Haqida Chet El Ilmiy Nashrlaridan Olingan Fikrlar.
10. Mallaevna, Normurodova Sokhiba, And Ayesha Khalid. "Topic Chemical Terminology Of Salts." International Conference On Multidisciplinary Science. Vol. 1. No. 5. 2023.
11. Mallaevna N. S., Khalid A. Topic Chemical Terminology Of Salts //International Conference On Multidisciplinary Science. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 226-229.
12. Mallaevna, N. S., & Chopra, A. (2024). Some Features Of Prescription Rules In Medicine. Technical Science Research In Uzbekistan, 2(1), 238-244.
13. Mallaevna, N. S., And M. Fatima. "Pathological Conditions And Processes, Different Physical Properties Qualities And Other Signs." Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi 1.7 (2023): 91-95.
14. Mallaevna, N. S. (2023). The Main Indicators Of The Communication Culture Of A Medical Worker. Journal Of Innovations In Scientific And Educational Research, 6(7), 85-88.
15. Mallaevna, N. S. (2024). The Social And Cultural Importance Of The Latin Language And Its Present And Historical Landscape. Central Asian Journal Of Academic Research, 2(5), 51-55.

13.00.00 – Pedagogika fanlari

13.00.00 – Pedagogical sciences

13.00.00 – Педагогические науки

UDK: 13.00.02

RADIONUKLIDLARNING TIBBIYOTDA QOLLANILISHINI PEDAGOGIK TAXLILI

¹ Tashanov Odilboy Safar o'g'li,

² Bozorov Erkin Xojievich,

³ Nasirova Gulparchin Maqsud qizi

¹ Samarkand davlat tibbiyot universiteti. Uzbekiston,

² O'zRFA Yadro fizikasi instituti Uzbekiston,

² O'zMU fizika fakulteti Yadro fizikasi kafedrası Uzbekiston,

³ Nukus davlat pedagogika instituti

E-mail: odilboy199626@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15191626>

Annotatsiya: Yadro tibbiyotining radionuklidli tashxis usullari tibbiyotning turli sohalarida, xususan, onkologiya, kardiologiya, nevrologiya va endokrinologiyada keng tarqalgan. Ushbu maqolada radionuklidli tashxisning qo'llanilishi, uning tashxistdagi ahamiyati va boshqa tibbiy sohalaridagi o'rni muhokama qilingan. Maqolada radionuklidli tashxis usullari orqali aniqlash va diagnostika qilishdagi texnikalar, metodologiyalar va zamonaviy taraqqiyotlar hamda ularning xavfsizligi va samaradorligiga oid ma'lumotlar olib boriladi. Radionuklidlar ishlatiladigan texnologiyalar natijasida tezkor va aniq tashxis qo'yish mumkin, bu esa davolash usullarini samarali tanlashda yordam beradi.

Kalit so'zlar: Yadro tibbiyoti, radionuklidli tashxis, diagnostika, onkologiya, kardiologiya, nevrologiya, endokrinologiya, samaradorlik, xavfsizlik, texnologiyalar.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В МЕДИЦИНЕ

Аннотация: Радионуклидные методы ядерной медицины широко используются в различных областях медицины, в частности, в онкологии, кардиологии, неврологии и эндокринологии. В данной статье рассматривается использование радионуклидной диагностики, ее значение в диагностике и роль в других областях медицины. В статье представлена информация о методиках, методиках и современных разработках в области обнаружения и диагностики радионуклидными методами диагностики, а также об их безопасности и эффективности. В результате технологий с использованием радионуклидов можно быстро и точно поставить диагноз, что помогает в эффективном выборе методов лечения.

Ключевые слова: Ядерная медицина, радионуклидная диагностика, диагностика, онкология, кардиология, неврология, эндокринология, эффективность, безопасность, технологии.

PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE USE OF RADIONUCLIDES IN MEDICINE

Abstract: Radionuclide diagnostic methods of nuclear medicine are widely used in various fields of medicine, in particular in oncology, cardiology, neurology and endocrinology. This article discusses the application of radionuclide diagnostics, its importance in diagnostics and its role in other medical fields. The article provides information on the techniques, methodologies and modern developments in the detection and diagnosis of diseases using radionuclide diagnostic

methods, as well as their safety and effectiveness. As a result of technologies using radionuclides, it is possible to make a quick and accurate diagnosis, which helps in the effective selection of treatment methods.

Keywords: Nuclear medicine, radionuclide diagnostics, diagnostics, oncology, cardiology, neurology, endocrinology, effectiveness, safety, technologies.

KIRISH

Yadro tibbiyoti zamonaviy tibbiyotda muhim o'rin tutadi va radionuklidli tashxis usullari turli kasalliklarni aniqlash hamda ularni davolashda murakkab va aniq tizimlarni taqdim etadi. Radiopharmatsevtikalar (ya'ni, radionuklidlar) organizmga kiritilib, Pozitron emissiya tomografiyasi (PET) va Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT) kabi tasvirlash texnologiyalari orqali ichki organlar va to'qimalarning holatini aniqlash imkonini beradi. Bu maqolada radionuklidli tashxis usullarini tibbiyotning turli sohalaridagi ahamiyati, ularning samaradorligi va xavfsizligi, hamda yangi texnologiyalar haqida ma'lumot beriladi.

Turli Tibbiy Sohalardagi asosiy qo'llanilishlar:

1. **Onkologiya (Raq kasxishini tashxislash)** Yadro tibbiyoti rak kasalliklarini aniqlashda keng qo'llaniladi. Radiopharmatsevtikalar, masalan, fluorodeoksiglukoza (FDG), o'tkir yoki metabolik faollikka ega bo'lgan bo'limlarni aniqlashga yordam beradi. PET va SPECT skanerlari rak hujayralarini barqaror qilish va uning tarqalishini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

2. **Kardiologiya (Yurak kasalliklarini tashxislash)** Kardiologiyada radionuklidli usullar yurakning qon bilan ta'minlanishini o'lchash va ishlashini baholash uchun ishlatiladi. Texnetiy-99m kabi radionuklidlar yurak to'qimalarining ishlashini ko'rsatadi, yordamchi tekshiruvlar orqali yurak kasalliklarini aniqlash va ularni davolashda samarali usullarni tanlashga yordam beradi.

3. **Nevrologiya (Miya kasalliklari tashxislash)** Nevrologiyada radionuklidli tashxislar miyaning faoliyatini baholash va nevrologik kasalliklarni aniqlash uchun foydalaniladi. PET skanerlari Altsgeymer kasalligini, epilepsiya va boshqa nevrologik muammolarni aniqlashda yordam beradi, miyadagi o'ziga xos o'zgarishlarni aniqlashda muhim bo'ladi.

4. **Endokrinologiya (Shtovidka va gormonal kasalliklar)** Radioaktiv iyod endokrin tizimi kasalliklarini aniqlashda, xususan, gipere- va gipotioreoz, shtovidka ragi va boshqa endokrin kasalliklarda qo'llaniladi. Radioaktiv iyod bilan davolash shifobahsh ta'sir ko'rsatib, gormonlarning yoki endokrin jinslarga nisbatan yangidan aniqlashga yordam beradi.

Talabalarni Baholash Metodikasi

Ushbu hujjat talabalarining bilim va ko'nikmalarini baholash metodikasini o'rganishga bag'ishlangan. Baholash jarayoni ta'lim sifatini oshirish, talabalar o'rtasida adolatli raqobatni ta'minlash va o'qituvchilarga o'z pedagogik faoliyatlarini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Ushbu metodika orqali talabalar o'z bilimlarini qanday baholashlari, o'z-o'zini baholash va o'zaro baholash jarayonlari haqida ma'lumotlar beriladi.

Baholashning asosiy maqsadi talabalar bilimini, ko'nikmalarini va kompetensiyalarini aniqlashdir. Bu jarayon orqali o'qituvchilar talabalar o'zlashtirgan materialni qanday tushunishlarini va amaliyotda qanday qo'llashlarini baholaydilar.


2. Baholash Turlari. Baholash jarayoni bir necha turga bo'linadi:

2.1. Formativ Baholash. Formativ baholash jarayoni ta'lim jarayonida davom etadi va o'qituvchilarga talabalar o'zlashtirish darajasini kuzatish imkonini beradi. Bu baholash usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Sinovlar va testlar, O'z-o'zini baholash, Guruh muhokamalari

2.2. Summativ Baholash. Summativ baholash esa ta'lim jarayonining oxirida amalga oshiriladi va talabalar o'zlashtirgan bilimlarini umumiy baholash uchun ishlatiladi. Ushbu baholash turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Yakuniy imtihonlar
- Loyihalar
- Taqdimotlar

Ta'lim jarayonidagi summativ baholash




3. Baholash Kriteriyalari. Baholash jarayonida aniq va shaffof kriteriyalarni belgilash muhimdir. Kriteriyalar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Bilim darajasi
- Amaliy ko'nikmalar
- Tanqidiy fikrlash qobiliyati
- Jamoaviy ishga qo'shgan hissasi

5. O'zaro Baholash. O'zaro baholash jarayoni talabalar o'rtasida fikr almashish va bir-birining ishlarini baholash

Ta'limda o'zaro baholashning roli



XULOSA

Talabalarni baholash metodikasi ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u o'qituvchilarga talabalar bilimini va ko'nikmalarini samarali baholash imkonini beradi. Ushbu metodika orqali ta'lim sifatini oshirish va talabalar o'rtasida adolatli raqobatni ta'minlash mumkin. Baholash jarayonida aniq kriteriyalar va turli baholash usullaridan foydalanish talabalar o'quv jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Zamonaviy Texnologiyalar:

Yangi texnologik taraqqiyotlar, ayniqsa PET/KT va SPECT/KT kabi gibrid skanerlar, tashxisda aniqlik va samaradorlikni oshirishga yordam berdi. Ushbu texnologiyalar anatomiya tasvirlari va funksional ma'lumotlarni birlashtirishga imkon beradi, bu esa aniq tashxis qo'yishni osonlashtiradi. Radioterapiya sohasida yangi maqsadga yo'naltirilgan radiopharmatsevtikalar davolash jarayonini muvaffaqiyatli va kam zararli qilishga yordam beradi.

Xavfsizlik va Samaradorlik:

Radionuklidli tashxis usullari odatda yuqori xavfsizlik mezonlariga rioya qilgan holda amalga oshiriladi. Tashxisda ishlatiladigan radiatsiya miqdori juda past bo'lib, o'quvchilar va tibbiy personalning radiatsiyaga bo'lgan ta'siri minimalizatsiya qilingan. Zamonaviy texnologiyalar, past dozali tasvirlash usullari va samarali radioaktiv izoizlar rivojlanishi xavfsizlikni ta'minlashga va tashxinning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa:

Radionuklidli tashxislar zamonaviy tibbiyotda muhim ahamiyatga ega bo'lib, turli kasalliklarni aniqlash va davolashda samarali yordam bermoqda. Ushbu texnologiyalar orqali kasalliklarni aniqlash, ularni davolash va profilaktik choralar ko'rishda samarali natijalarga erishish mumkin. Texnologik taraqqiyot va xavfsizlik choralar bilan, radionuklidli tashxislarning roli tibbiyotda yanada kengayib, yuqori samaradorlikka ega bo'ladi.

Ushbu maqola № AM-II3- 2019062031 "Yadro energetikasi", "Yadro tibbiyoti va texnologiyalari", "Radiatsion tibbiyoti va texnologiyalari" fanlari bo'yicha bakalavr va magistrlar uchun multimediyali darsliklarni yaratish" nomli innovatsion loyixa doirasida yozib tayyorlangan

materiallarning pedagogic taxlili asosida yozilgan bo'lib , darsliklar mualliflariga minnatdorchilik bildiramiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. **Cherry, S. R., & Sorenson, J. A. (2012).** *Physics in Nuclear Medicine*. Elsevier Health Sciences.
2. **Gambhir, S. S. (2002).** *Molecular Imaging: The Roots of the New Medicine*. *Molecular Imaging*, 1(1), 5-12.
3. **Bourguet, P., & Touboul, P. (2001).** *Nuclear Medicine in Oncology*. Springer.
4. **Wagner, H. N., & Townsend, D. W. (2004).** *Essentials of Nuclear Medicine Imaging*. Lippincott Williams & Wilkins.
5. **Hoffman, E. J., & Phelps, M. E. (1982).** *Positron Emission Tomography: Theory and Applications in Radiation Oncology*. *Radiation Research*, 91(3), 364-389.

JAMOA TUZISH METODOLOGIYASI. SHAKLLAR VA USULLAR JAMOADA INDIVIDUAL MASHG'ULOTLAR

Boynazov Zafarbek Urolovich

Termiz davlat pedagogika institute Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili
kafedrası o'qituvchisi

E-mail: zboynazov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15163143>

Annotatsiya: Jamoa tuzish va uni samarali boshqarish har qanday tashkilot yoki guruh uchun muhim ahamiyatga ega. Bunday jamoalar tashkilotlarning maqsadlariga erishishida, vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishda va umumiy ish samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Jamoa tuzishning metodologiyasi, shakllari va usullari jamoaning ichki dinamikasini va tashqi muhitga qanday moslashishini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Ta'lim va tarbiya, samaradorlik, kreativ yondashuv, innovatsion texnologiyalar, ijodiy usullar, ta'lim jarayoni, o'quvchilar, samarali va qiziqarli texnologiyalar, muhit.

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В КОМАНДЕ

Аннотация: Создание команды и эффективное управление ею имеет важное значение для любой организации или группы. Такие команды играют важную роль в достижении организационных целей, успешном выполнении задач и повышении общей эффективности работы. Методология, формы и методы формирования команды определяют внутреннюю динамику команды и ее адаптацию к внешней среде.

Ключевые слова: Образование и воспитание, эффективность, творческий подход, инновационные технологии, креативные методы, образовательный процесс, студенты, эффективные и интересные технологии, окружающая среда.

TEAM BUILDING METHODOLOGY. FORMS AND METHODS OF INDIVIDUAL TRAINING IN A TEAM

Abstract: Building and effectively managing teams is essential for any organization or group. Such teams play a major role in achieving organizational goals, successfully completing tasks, and increasing overall work efficiency. The methodology, forms, and methods of team building determine the internal dynamics of the team and how it adapts to the external environment.

Keywords: Education and upbringing, efficiency, creative approach, innovative technologies, creative methods, educational process, students, effective and interesting technologies, environment.

KIRISH

Jamoa so'zi lotincha — "kollektivus" so'zining tarjimasi bo'lib, yig'ilma, ommabirgalikdagi majlis, birlashma, guruh ma'nolarini anglatadi, aniqroq aytiladigan bo'lsak jamoa bu kishilardan iborat guruh demakdir. Zamonaviy talqinda — jamoa tushunchasi ikki xil ma'noda ishlatiladi.

Birinchidan, jamoa deganda kishilarning istalgan tashkiliy guruhi tushiniladi masalan ishlab chiqarish jamoasi, zavod jamoasi, xo'jalik jamoasi va h. k.

Ikkinchidan jamoa deganda yuqori darajada uyushtirilgan guruh tushuniladi. Chunonchi, o'quvchi tarbiyalanuvchilarning birlashmasi o'ziga xos muhim belgilarga egadir. Quydagi jamoa va uning xususiyatlari borasida so'z yuritamiz. Jamoa va jamoa orqali tarbiyalash tarbiya tizimida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tamoyillardan biridir. Shaxsni shakllantirishda jamoaning etakchi rol o'ynashi to'g'risidagi fikrlar pedagogika fanining ilk rivojlanishi davridayoq bildirilgan. Jamoada uning a'zolari o'rtasidagi munosabatining alohida shakli yuzasiga keladi.

ASOSIY QISM

Bu esa shaxsning jamoa bilan birgalikda rivojlanishini ta'minlaydi. Lekin har qanday guruhni ham jamoa deb hisoblab bo'lmaydi. Jamoa bir qator belgilarga egadirki, mazkur belgilar jamoani kishilarning etarli darajada uyushgan har qanday guruhlar ajratib turadi. Jamoa ijtimoiy jamiyatning bir qismi hisoblanadi, unda ijtimoiy hayot va kishilik munosabatlarining barcha me'yorlari o'z ifodasini topadi. Zero, jamoa jamiyatdagi mavjud munosabatlari tizimida namoyon bo'lar ekan, jamoa va ijtimoiy jamiyat mana shu bois jamoa hayotining bir yagona maqsadga qaratilganligi va ijtimoiy g'oyaviy yo'nalganligi uning etakchi belgisi hisoblanadi. Har bir jamoa boshqa bir jamoalar bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Uning har bir a'zosi jamiyat ijtimoiy faoliyatini tashkil etish jarayonida o'z jamoasi bilan birgalikda ishtirok etadi. qsdadi, intilishida o'zaro birlik uzviy maqsadga muvofiq tashkil etadi. Jamoani tushinish, uni xis etish hamda shaxsni shakllantirishdagi o'rni va rolini to'g'ri baholay olish umumiy va xususiy maqsadning qiziqishi, ehtiyoj va faoliyatining birligini namoyon etadi hamda bo'linishiga yo'l qo'ymaydi.

Jamoada individual mashg'ulotlar — bu jamoaviy faoliyatda har bir shaxsning o'ziga xos mashg'ulotlarini bajarishi. Bunday mashg'ulotlar jamoaning umumiy maqsadlariga xizmat qiladigan, lekin individual rivojlanishni ham qo'llab-quvvatlovchi faoliyatlar hisoblanadi. Ularning ba'zi misollarini ko'rib chiqaylik Jismoniy tayyorgarlik: Jamoa sportchilarining har biri o'ziga mos mashg'ulotlar bajarishi mumkin. Masalan, futbol jamoasida har bir futbolchi individual ravishda yugurish, texnika ustida ishlash, kuch ishlatish kabi mashg'ulotlarni amalga oshirishi mumkin. Ishlab chiqarishda individual o'rganish: Ishchi guruhlarida har bir xodim o'zining kasbiy malakasini oshirish uchun alohida mashg'ulotlar o'tkazishi mumkin. Kishilik jamiyati rivojlanishining boshida odamlar o'zlarining tajovuzkorligini va ijtimoiylashuvini yo'qotib, hamkorlik va o'zaro yordam imkoniyatiga ega bo'la boshladilar. Rivojlanayotgan guruh hududiylik qabilaning barcha a'zolarining birlashishiga yordam berdi. Bu ovda va uyda jamoaviy mehnat faoliyatini amalga oshirish imkonini berdi. Agar zamonaviy kontseptsiyani ko'rib chiqsak, quyidagilarni aytishimiz mumkin: bugungi kunda jamoa qurish deb ataydigan narsa qadimgi davrlarda paydo bo'lgan. Bu hodisa har doim yetakchi (rahbar, yetakchi) yoki yetakchilar guruhi bo'lgan ma'lum bir guruh odamlarning jamoaviy harakatlari samaradorligini oshirishga qaratilgan majburiy chora bo'ldi. Qadimda jamoaviy ruhni kerakli darajada ushlab turishning ahamiyati sardorlarning asosiy maqsadlaridan biriga aylangan. Armiyaning jipsligiga erishish uchun uning askarlari o'rtasida zukkolik, chidamlilik va kuch-quvvat uchun musobaqalar o'tkazildi.

Asrlar o'tdi, bir avlod ikkinchi avlod o'rmini egalladi. Ammo bu fikrdan voz kechmadi. U yirik kompaniyalar rahbarlari tomonidan amalga oshirila boshlandi. Aynan ular birinchi navbatda guruh ishining samaradorligini oshirish uchun mo'ljallangan metodologiyadan foydalanish haqida o'ylashgan. Bu muammo sanoat inqilobi yillarida ayniqsa dolzarb edi. Shunga qaramay, bu sohadagi ilmiy ishlanmalar o'sha paytda yaratilmagan. Misol uchun, kompyuter dasturlash bo'yicha kurslar, o'qish yoki o'qitish uchun individual rejalar. Psixologik o'qish: Jamoaviy faoliyatda har bir a'zo o'zining ruhiy holatini yaxshilash va jamoaviy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo'lish uchun individual psixologik mashg'ulotlar o'tkazishi mumkin. Ijtimoiy

rivojlanish: Jamoa a'zolari o'zlarining ijtimoiy ko'nikmalarini yaxshilash maqsadida, har biri individual ravishda treninglar yoki seminarlar o'tkazishi mumkin. Bunday mashg'ulotlar jamoaning umumiy muvaffaqiyatiga katta hissa qo'shishi mumkin, chunki har bir shaxsning o'z salohiyatini to'liq namoyon etishiga imkon yaratadi. Jamoada individual mashg'ulotlar — bu jamoaviy faoliyatning bir qismi sifatida, har bir a'zo o'zining shaxsiy rivojlanishi, maqsadlari va ehtiyojlariga mos ravishda individual mashg'ulotlarni bajarishi jarayonidir. Jamoa a'zolari uchun bu mashg'ulotlar jamoaning umumiy maqsadlariga erishishda qo'shimcha yordam beradi va har bir a'zo o'z imkoniyatlarini maksimal darajada ishga solishiga imkon yaratadi. Quyida bu turdagi mashg'ulotlarning ba'zi yo'nalishlarini ko'rib chiqamiz. Jismoniy tayyorgarlik va sportdagi individual mashg'ulotlar Jismoniy faoliyatda jamoa a'zolarining har biri uchun individual mashg'ulotlar juda muhim. Bu sport jamoalarida ayniqsa ahamiyatli bo'lib, ularning o'ziga xos ehtiyojlari va maqsadlariga mos keladi. Misollar: Futbol jamoasida: Har bir futbolchi o'zining texnik ko'nikmalarini (pas berish, to'pni bosh bilan zarba berish, dribling va h. k.) takomillashtirish uchun individual mashg'ulotlar o'tkazishi mumkin. Yugurish yoki atletikada: Sportchilar individual tezlikni oshirish uchun maxsus sprint mashg'ulotlari yoki chidamlilikni rivojlantirishga yo'naltirilgan treninglar o'tkazishi mumkin. Intellectual va kasbiy rivojlanish Har bir jamoa a'zosi o'z kasbiy va intellektual rivojlanishi uchun alohida mashg'ulotlarni amalga oshirishi mumkin.

Dasturlash va texnologiyalar: Agar jamoa dasturchilardan tashkil topgan bo'lsa, har bir dasturchi o'zining bilim doirasini kengaytirish uchun yangi texnologiyalarni o'rganish, yangi dasturlash tillarini o'rganish, yoki maxsus kurslar va treninglarda qatnashishi mumkin. Tadqiqot va ilmiy ishlar: Akademik jamoalarda a'zolar ilmiy maqolalar yozish, yangi tadqiqot usullarini o'rganish yoki maxsus o'qituvchilar bilan ishlash uchun individual mashg'ulotlar o'tkazishi mumkin. Psixologik mashg'ulotlar va ruhiy holat Jamoa a'zolari o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni yaxshilash, jamoaning ruhiy holatini mustahkamlash uchun individual psixologik mashg'ulotlar ham muhim. Bular quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. Stressni boshqarish: Jamoa a'zolari o'z stresslarini boshqarish uchun individual psixologik mashg'ulotlarga qatnashishlari mumkin. Masalan, meditatsiya yoki nafas olish mashqlari. Emotsional intellektni rivojlantirish: A'zolar o'zlarining emotsional intellektlarini oshirish uchun psixologik treninglar yoki individual konsultatsiyalar olishlari mumkin. Ijtimoiy munosabatlar: Jamoa a'zolarining o'zaro aloqalarini yaxshilash va konfliktlarni hal qilish uchun individual mashg'ulotlar o'tkazish mumkin. Motivatsiya va maqsadga erishish Jamoa a'zolarining har biri o'z shaxsiy maqsadlariga erishish uchun individual ravishda mashg'ulotlar o'tkazishi kerak. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi: Maqsad qo'yish: Har bir jamoa a'zosi o'zining qisqa va uzoq muddatli maqsadlarini belgilab, ularga erishish uchun individual reja tuzishi mumkin. Vaqtni boshqarish: Samarali vaqt boshqaruvi uchun individual mashg'ulotlar o'tkazish, bu esa jamoaning umumiy samaradorligini oshiradi. Ijobiy fikrlash: O'zining ichki resurslarini ochish va o'ziga ishonchni oshirish uchun mashg'ulotlar. San'at va ijodiy rivojlanish. Agar jamoa san'at, dizayn yoki ijodiy sohalarida faoliyat yuritssa, har bir a'zo o'z ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun individual mashg'ulotlar o'tkazishi mumkin. Misollar: Rasm chizish yoki dizayn: Jamoa dizaynerlari o'zlarining texnik va ijodiy ko'nikmalarini oshirish uchun individual mashg'ulotlarda qatnashishlari mumkin. Musika va san'at: Musiqachilar yoki san'atkorlar o'z ijodiy mashg'ulotlarini mustaqil ravishda bajarib, jamoaga yangi g'oyalar olib kelishlari mumkin.

XULOSA

Kreativ fikrlash va innovatsiya Jamoada yangi g'oyalar va innovatsiyalarni ishlab chiqish uchun har bir a'zo individual kreativ fikrlash mashg'ulotlarini o'tkazishi kerak. Bu turdagi mashg'ulotlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Brainstorming (miyani "qaynatish"): A'zolar o'z fikrlarini va g'oyalarini mustaqil ravishda ishlab chiqishlari mumkin. Innovatsion loyihalar: Har bir a'zo o'zining innovatsion loyihalarini yaratish va amalga oshirish uchun mashg'ulotlar o'tkazishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Yangi Tahrirdagi Ta'lim To'g'risidagi Qonun 2020 Yil
2. Sh. M. Mirziyoyev. Qonun Ustuvorligi Va Inson Manfatlarini Ta'minlash – Yurt Taraqqiyoti Va Xalq Farovonligining Garovi. – Toshkent: “O'zbekiston” Nashriyoti, 2017. – 24-Bet.
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Bosh Tahrir Hay'ati A'zolari: M. Aminov Va B. – T. : “O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” Davlat Ilmiy Nashriyoti, 2002. – 169 Bet.
4. N. A. Muslimov, Usmonboyeva M. H. , Sayfurov D. M. , To'rayev A. B. Innovatsion Ta'lim Texnologiyalari – Toshkent: 2015. – 208 Bet.
5. J. F. Yo'ldoshev, S. A. Usmonov. Pedagogik Texnologiya Asoslari. Toshkent «O'qituvchi» 2004y
6. Данилов О. Е. Применение Информационных Коммуникационных Технологий В Процессе Обучения
7. [Www/Ziynet/Uz](http://www.ziynet.uz).
8. Тишабаева И. Р. Ўзбекистонда Мактабгача Таълим Муассасаларининг шаклланиши (1960-1990 йиллар) //Взгляд В Прошлое. – 2020. – Т. 3. – №. 11.
9. Tishabayeva, I. R. (2023). 1945-1970 Yillarda Shahar Va Qishloq Maktabgacha Tarbiya Muassasalarining Mutaxassis Kadrlar Bilan Ta'minlanishi: Yutuq Va Muammolar. Educational Research In Universal Sciences, 2(5), 866–869. Retrieved From [Http: //Erus.Uz/Index. Php/Er/Article/View/2790](http://Erus.Uz/Index.Php/Er/Article/View/2790)
10. Husaynova , M. , Abduvaliyev, B. , & Turdimatova , Q. (2023). Raqamli Iqtisodiyot Va Uning Jamiyatni Rivojlantirishdagi Ahamiyati. Research And Implementation. Извлечено От [Https: //Fer-Teach. Uz/Index. Php/Rai/Article/View/800](https://Fer-Teach.Uz/Index.Php/Rai/Article/View/800)
11. M. Husaynova, D. Rustamova. (2023). Zulfiya Isroilova She'riyatida Uchraydigan Lisoniy Hodisalar. Iqro , 2(1), 161–162. Retrieved From [Http: //Wordlyknowledge. Uz/Index. Php/Iqro/Article/View/252](http://Wordlyknowledge.Uz/Index.Php/Iqro/Article/View/252)
12. Husaynova , M. . (2022). Neologizmlarning O'zbek Latifalari Matnidagi Ahamiyati. Journal Of Integrated Education And Research, 1(6), 55–57. Retrieved From [Https: //Ojs. Rmasav. Com/Index. Php/Ojs/Article/View/390](https://Ojs.Rmasav.Com/Index.Php/Ojs/Article/View/390)
13. Hamdamova O. Analysis Of The Science Of Hadith And Its Scientific-Practical And Educational Significance //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 17. – C. 71-74.
14. Rustamov I. A. Philosophical Heritage Of Abu Ali Ibn Sina As An Important Source In The Education Of The Modern Specialists. The Advansed Science Journal Science Issue United States. 2015-№1. 87-90
15. Rustamov I. A. Abu Ali Ibn-Sino Doctrine In The Context Formation Of Harmoniously Ideveloped Person. Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, Usa, №1(57). 2018. – Pp. 277-280.

16. Boynazov Z. Boshlang 'Ich Sinflarda Bugungi Ta'lim Jarayoni Va Usullari //Interpretation And Researches. – 2023. – T. 2. – №. 1.
17. Boynazov Z. U. Ways To Increase Literacy In A Mother Tongue Lesson //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 29-32.
18. Boynazov Z. U. From Mother Tongue Science In Elementary Grades Theoretical Foundations Of The Organization Of Extraneous Work //World Of Scientific News In Science. – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 50-57.
19. Boynazov Z. Boshlang'ich Sinflarda Ona Tili Va O'qish Savodxonligi Darslarini Tashkil Etish Jarayoni //Interpretation And Researches. – 2024. – T. 1. – №. 1.

TA'LIM VA TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN KREATIV YONDASHUVLAR VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Boynazov Zafarbek Urolovich

Termiz davlat pedagogika institute Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili
kafedrası o'qituvchisi

E-mail: zboynazov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15163189>

Annotatsiya: Ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirish uchun kreativ yondashuvlar o'quvchilarning fikrlash va o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Kreativ yondashuvlar nafaqat o'quvchilarni faollashtirish, balki ularni o'zlashtirayotgan materialni chuqurroq tushunishga yo'naltiradi.

Kalit so'zlar: Ta'lim samaradorligi, Tarbiya usullari, Kreativ yondashuvlar, Innovatsion texnologiyalar, Pedagogik metodlar, O'quv jarayoni, O'qituvchilik mahorati, Yangi pedagogik texnologiyalar, O'quvchilarning ijodiy fikrlashi

ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Аннотация: Творческие подходы к повышению эффективности образования и воспитания способствуют развитию у учащихся навыков мышления и обучения. Творческие подходы не только активизируют учащихся, но и способствуют более глубокому пониманию изучаемого материала.

Ключевые слова: Эффективность образования, Методы воспитания, Креативные подходы, Инновационные технологии, Педагогические методы, Учебный процесс, Профессионализм преподавателя, Новые образовательные технологии, Креативное мышление учащихся

CREATIVE APPROACHES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION AND UPBRINGING

Abstract: Creative approaches to improving the effectiveness of education and upbringing help develop students' thinking and learning skills. Creative approaches not only activate students, but also guide them to a deeper understanding of the material they are learning.

Keywords: Educational effectiveness, Teaching methods, Creative approaches, Innovative technologies, Pedagogical strategies, Learning process, Teacher's professional skills, Modern educational technologies, Students' creative thinking

KIRISH

Ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirish uchun kreativ yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar juda muhim o'rin tutadi. Hozirgi kunda, texnologiyalar va ijodiy usullarni ta'lim jarayoniga kiritish orqali o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ular uchun yanada samarali va qiziqarli o'rganish muhitini yaratish mumkin. Quydagi yondashuvlar va texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirishda yordam berishi mumkin:

Ta'lim va tarbiya — bu ikki asosiy jarayon, ular insonning shaxs sifatida rivojlanishi va jamiyatda to'g'ri o'rin egallashi uchun muhim ahamiyatga ega. Ta'lim va tarbiya bir-birini to'ldiruvchi jarayonlardir, lekin ular o'rtasida ayrim farqlar mavjud. Ta'lim — bu odamlarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonidir. Ta'limning asosiy maqsadi shaxsni

ongli, mustaqil fikrlovchi, bilimli va ijtimoiy javobgar inson qilib tarbiyalashdir. Ta'limda o'quvchilarga ma'lum bir soha yoki fan bo'yicha bilimlar beriladi. Bu jarayon odatda o'quv muassasalarida, ya'ni maktablarda, kollejlarda va universitetlarda amalga oshiriladi. Ta'limning asosiy maqsadlari:

1. O'quvchilarga asosiy bilimlarni va ko'nikmalarni o'rgatish.
2. O'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish.
3. Fikrlarni tahlil qilish va mustaqil qarorlar qabul qilishni o'rgatish.
4. Yangi bilimlarni o'rganish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish.

ASOSIY QISM

Tarbiya esa, odamning axloqiy va ma'naviy tomonlarini shakllantirishga qaratilgan jarayondir. Tarbiya orqali insonda yuksak axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy normalarga hurmat, mas'uliyat hissi, adolat va mehr-oqibatni rivojlantirishga intilish amalga oshiriladi. Tarbiya jarayoni, ko'pincha oila, maktab, jamoa va jamiyat bilan bog'liq bo'lib, ijtimoiy o'zaro aloqalar orqali amalga oshiriladi. Tarbiya asosiy maqsadlari: 1. Yuksak axloqiy qadriyatlar va normativlarni o'rgatish. 2. Insonni jamiyatga moslashishga, ijtimoiy javobgarlikni tushunishga tarbiyalash. 3. Milliy va umumiy insoniy qadriyatlarni hurmat qilishni o'rgatish. 4. Odamning ma'naviy dunyosini rivojlantirish, vijdonini shakllantirish. **Ta'lim va Tarbiya o'rtasidagi farqlar**

Maqsad: Ta'limning asosiy maqsadi bilim va ko'nikmalarni o'rgatish bo'lsa, tarbiyaning maqsadi axloqiy, ma'naviy va shaxsiy sifatlarni shakllantirishdir. **Jarayon:** Ta'lim asosan intellektual rivojlanish va bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lsa, tarbiya ijtimoiy va axloqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga mo'ljallangan. **Amaliyot:** Ta'lim ko'proq maktab va o'quv muassasalarida amalga oshirilsa, tarbiya oila, jamoa va jamiyat tomonidan beriladi.

Ta'lim va Tarbiya o'rtasidagi bog'liqlik Ta'lim va tarbiya bir-birini to'ldiradi. Ta'lim orqali inson ma'lumotga ega bo'ladi, lekin tarbiya orqali uning axloqiy va ma'naviy dunyosi shakllanadi. Ikkalasi ham birgalikda shaxsning to'laqonli rivojlanishiga xizmat qiladi. Agar birorta jarayonni e'tiborsiz qoldirsak, shaxsning to'laqonli rivojlanishi imkonsiz bo'ladi. Masalan, ta'limda yuqori bilimlarni olish mumkin, ammo agar tarbiya jarayoni yetarli darajada bo'lmasa, inson ma'naviy jihatdan shakllanmagan bo'lishi mumkin, bu esa uning jamiyatdagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ta'lim va tarbiya — insonning har tomonlama rivojlanishining asosiy omillaridir. Ularning to'g'ri muvofiqligi va birgalikda ishlashi natijasida odam nafaqat bilimli, balki yuksak axloqiy, ma'naviy qadriyatlarga ega, jamiyatda muvaffaqiyatli va mas'uliyatli shaxs bo'lib yetishadi

Interaktiv o'qitish metodlari: **Gamifikatsiya:** O'quv jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish. Masalan, o'yinlar, testlar va raqobatni o'rnatish orqali o'rganishni qiziqarli va samarali qilish

Ko'rgazmali metodlar: Interaktiv doskalar, grafiklar, videolar va animatsiyalarni taqdim etish orqali o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishiga yordam berish. Onlayn va raqamli platformalar: MOOC (Massive Open Online Courses): Internet orqali o'quvchilarga turli kurslarni taqdim etish, ular o'z vaqtida va o'z sur'atida o'rganishlari mumkin. E-learning platformalari: Moodle, Google Classroom kabi platformalar orqali ta'lim materiallarini boshqarish va o'quvchilarga onlayn darslar o'tkazish. Virtual sinflar: Zoom yoki Microsoft Teams kabi dasturlar orqali masofaviy o'qitish. Bu o'quvchilarga uzoqdan ta'lim olish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt va analitik vositalar: Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish rejalari: Har bir o'quvchining o'rganish uslubi va tezligiga moslashtirilgan darslar va materiallar yaratish. Ma'lumot tahlili: O'quvchilarning yutuqlari va zaif tomonlarini tahlil qilib, ta'lim

jarayonini optimallashtirish. AR va VR texnologiyalari (Kengaytirilgan va Virtual Haqiqat): Virtual sinflar va ekskursiyalar: O'quvchilarga haqiqiy dunyoni virtual tarzda ko'rish imkoniyatini yaratish, masalan, tarixiy joylarga virtual sayohatlar, biologiya yoki geografiya fanlarida amaliy tajribalar. AR yordamida o'rganish: Yangi tushunchalarni yaxshiroq tushunish uchun kengaytirilgan haqiqat texnologiyasidan foydalanish, masalan, geometrik shakllarni 3D tarzda ko'rish. Kreativ metodlar va muammolarni hal qilishga asoslangan o'qitish: Problem-based learning (PBL): O'quvchilarga muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan faol o'rganish metodikasi. Bu ularni o'rganishga, tahlil qilishga va tanqidiy fikrlashga o'rgatadi. Design thinking: Yangi g'oyalar yaratish va ularga innovatsion yondashuvlar bilan yechim topishga qaratilgan metod. Bu yondashuv talabalarni kreativ va samarali fikrlashga o'rgatadi. Collaborative (hamkorlikdagi) o'qitish: Online forumlar va guruh ishlari: O'quvchilarga jamoada ishlash, fikr almashish va birgalikda loyiha yaratish imkoniyatini berish. O'quvchilarning fikr va g'oyalari asosida darslar tashkil etish: Bu yondashuv ta'limni o'quvchilarga yaqinlashtiradi va ularni darslarga faolroq jalb qiladi. Kreativ yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning ta'limga qiziqishini oshiradi, shuningdek, o'rganishni samarali va esda qoladigan qiladi. Bu esa kelajakda yanada muvaffaqiyatli va bilimdon avlodni tarbiyalashga yordam beradi. Kognitiv yondashuv — bu odamlarning fikrlash, tushunish, o'rganish va qaror qabul qilish jarayonlarini o'rganishga qaratilgan psixologik va pedagogik yondashuvdir. U odamlarning ongli jarayonlarini, masalan, xotira, e'tibor, tasavvur, o'rganish va muammolarni hal qilishni tushunishga asoslanadi. Kognitiv yondashuvning asosiy g'oyasi shundaki, odamlar atrof-muhitdan ma'lumotlarni yig'ib, uni o'z ichida qayta ishlaydi, shuningdek, bu jarayonlar ularning xulq-atvori va qarorlariga ta'sir ko'rsatadi. Bu yondashuv, odatda, ta'limda va psixoterapiyada qo'llaniladi, chunki u qanday qilib ongli jarayonlarni yaxshilash va boshqarish mumkinligini tushunishga yordam beradi.

Kognitiv yondashuvning ba'zi asosi prinsiplari: Ma'lumotni qayta ishlash: Odamlar tashqi dunyodan kelgan ma'lumotlarni qayta ishlash orqali qarorlar qabul qiladi va xulq-atvorini shakllantiradi. Xotira va e'tibor: Bu yondashuvda xotira va e'tibor muhim omillar hisoblanadi, chunki ular odamning o'rganish va tasavvur qilish qobiliyatini shakllantiradi. Muammolarni hal qilish: Kognitiv yondashuv muammoni qanday hal qilish va yangi ma'lumotlarni qanday o'zlashtirishni tushunishga qaratilgan. Kognitiv yondashuv ta'limda o'rganish jarayonini yaxshilash uchun qo'llanilsa, psixologiyada esa odamlarning o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini va xulq-atvorini anglashga yordam beradi.

Ta'lim va tarbiya — bu ikki asosiy jarayon, ular insonning shaxs sifatida rivojlanishi va jamiyatda to'g'ri o'rin egallashi uchun muhim ahamiyatga ega. Ta'lim va tarbiya bir-birini to'ldiruvchi jarayonlardir, lekin ular o'rtasida ayrim farqlar mavjud. Ta'lim — bu odamlarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonidir. Ta'limning asosiy maqsadi shaxsni ongli, mustaqil fikrlovchi, bilimli va ijtimoiy javobgar inson qilib tarbiyalashdir. Ta'limda o'quvchilarga ma'lum bir soha yoki fan bo'yicha bilimlar beriladi. Bu jarayon odatda o'quv muassasalarida, ya'ni maktablarda, kollejlarda va universitetlarda amalga oshiriladi. Ta'limning asosiy maqsadlari:

1. O'quvchilarga asosiy bilimlarni va ko'nikmalarni o'rgatish.
2. O'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish.
3. Fikrlarni tahlil qilish va mustaqil qarorlar qabul qilishni o'rgatish.
4. Yangi bilimlarni o'rganish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish.

Tarbiya esa, odamning axloqiy va ma'naviy tomonlarini shakllantirishga qaratilgan jarayondir. Tarbiya orqali insonda yuksak axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy normalarga hurmat, mas'uliyat hissi, adolat va mehr-oqibatni rivojlantirishga intilish amalga oshiriladi. Tarbiya jarayoni, ko'pincha oila, maktab, jamoa va jamiyat bilan bog'liq bo'lib, ijtimoiy o'zaro aloqalar orqali amalga oshiriladi.

Tarbiya asosiy maqsadlari:

1. Yuksak axloqiy qadriyatlar va normativlarni o'rgatish.
2. Insonni jamiyatga moslashishga, ijtimoiy javobgarlikni tushunishga tarbiyalash.
3. Milliy va umumiy insoniy qadriyatlarni hurmat qilishni o'rgatish.
4. Odamning ma'naviy dunyosini rivojlantirish, vijdonini shakllantirish.

Ta'lim va Tarbiya o'rtasidagi farqlar Maqsad: Ta'limning asosiy maqsadi bilim va ko'nikmalarni o'rgatish bo'lsa, tarbiyaning maqsadi axloqiy, ma'naviy va shaxsiy sifatlarni shakllantirishdir. **Jarayon:** Ta'lim asosan intellektual rivojlanish va bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lsa, tarbiya ijtimoiy va axloqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga mo'ljallangan

Amaliyot: Ta'lim ko'proq maktab va o'quv muassasalarida amalga oshirilsa, tarbiya oila, jamoa va jamiyat tomonidan beriladi.

Ta'lim va Tarbiya o'rtasidagi bog'liqlik. Ta'lim va tarbiya bir-birini to'ldiradi. Ta'lim orqali inson ma'lumotga ega bo'ladi, lekin tarbiya orqali uning axloqiy va ma'naviy dunyosi shakllanadi. Ikkalasi ham birgalikda shaxsning to'laqonli rivojlanishiga xizmat qiladi. Agar birorta jarayonni e'tiborsiz qoldirsak, shaxsning to'laqonli rivojlanishi imkonsiz bo'ladi. Masalan, ta'limda yuqori bilimlarni olish mumkin, ammo agar tarbiya jarayoni yetarli darajada bo'lmasa, inson ma'naviy jihatdan shakllanmagan bo'lishi mumkin, bu esa uning jamiyatdagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ta'lim va tarbiya — insonning har tomonlama rivojlanishining asosiy omillaridir. Ularning to'g'ri muvofiqligi va birgalikda ishlashi natijasida odam nafaqat bilimli, balki yuksak axloqiy, ma'naviy qadriyatlarga ega, jamiyatda muvaffaqiyatli va mas'uliyatli shaxs bo'lib yetishadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ta'lim va tarbiya jarayonida kreativ yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilarning kasbiy mahoratini doimiy rivojlantirib borish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish va o'quvchilarning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etish – zamonaviy ta'limning asosiy omillaridan biridir. Shu bois, ushbu maqolada ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion va kreativ yondashuvlarning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlari yoritib berildi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Yangi Tahrirdagi Ta'lim To'g'risidagi Qonun 2020 Yil
2. Sh.M. Mirziyoyev. Qonun Ustuvorligi Va Inson Manfatlarini Ta'minlash – Yurt Taraqqiyoti Va Xalq Farovonligining Garovi. – Toshkent: "O'zbekiston" Nashriyoti, 2017. – 24-Bet.
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Bosh Tahrir Hay'ati A'zolari: M.Aminov Va B. – T.: "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" Davlat Ilmiy Nashriyoti, 2002. – 169 Bet.
4. N.A.Muslimov, Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Innovatsion Ta'lim Texnologiyalari – Toshkent: 2015. – 208 Bet.
5. J.F.Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik Texnologiya Asoslari. Toshkent «O'qituvchi» 2004y

6. Данилов О.Е. Применение Информационных Коммуникационных Технологий В Процессе Обучения
7. WwW/Ziyonet/Uz.
8. Тишабаева И. Р. Ўзбекистонда Мактабгача Таълим Муассасаларининг шаклланиши (1960-1990 йиллар) //Взгляд В Прошлое. – 2020. – Т. 3. – №. 11.
9. Tishabayeva, I. R. (2023). 1945-1970 Yillarda Shahar Va Qishloq Maktabgacha Tarbiya Muassasalarining Mutaxassis Kadrlar Bilan Ta'minlanishi: Yutuq Va Muammolar. Educational Research In Universal Sciences, 2(5), 866–869. Retrieved From [Http://Erus.Uz/Index.Php/Er/Article/View/2790](http://Erus.Uz/Index.Php/Er/Article/View/2790)
10. Husaynova , M., Abduvaliyev, B., & Turdimatova , Q. (2023). Raqamli Iqtisodiyot Va Uning Jamiyatni Rivojlantirishdagi Ahamiyati. Research And Implementation. Извлечено От [Https://Fer-Teach.Uz/Index.Php/Rai/Article/View/800](https://Fer-Teach.Uz/Index.Php/Rai/Article/View/800)
11. M.Husaynova, D.Rustamova. (2023). Zulfiya Isroilova She'riyatida Uchraydigan Lisoniy Hodisalar. Iqro , 2(1), 161–162. Retrieved From [Http://Wordlyknowledge.Uz/Index.Php/Iqro/Article/View/252](http://Wordlyknowledge.Uz/Index.Php/Iqro/Article/View/252)
12. Husaynova , M. . (2022). Neologizmlarning O'zbek Latifalari Matnidagi Ahamiyati. Journal Of Integrated Education And Research, 1(6), 55–57. Retrieved From [Https://Ojs.Rmasav.Com/Index.Php/Ojs/Article/View/390](https://Ojs.Rmasav.Com/Index.Php/Ojs/Article/View/390)
13. Hamdamova O. Analysis Of The Science Of Hadith And Its Scientific-Practical And Educational Significance //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – Т. 17. – С. 71-74.
14. Rustamov I.A. Philosophical Heritage Of Abu Ali Ibn Sina As An Important Source In The Education Of The Modern Specialists. The Advansed Science Journal Science Issue United States. 2015-№1. 87-90
15. Rustamov I.A. Abu Ali Ibn-Sino Doctrine In The Context Formation Of Harmoniously 1developed Person. Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, Usa, №1(57). 2018. – Pp. 277-280.
16. Boynazov Z. Boshlang 'Ich Sinflarda Bugungi Ta'lim Jarayoni Va Usullari //Interpretation And Researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
17. Boynazov Z. U. Ways To Increase Literacy In A Mother Tongue Lesson //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 29-32.
18. Boynazov Z. U. From Mother Tongue Science In Elementary Grades Theoretical Foundations Of The Organization Of Extraneous Work //World Of Scientific News In Science. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 50-57.
19. Boynazov Z. Boshlang'ich Sinflarda Ona Tili Va O'qish Savodxonligi Darslarini Tashkil Etish Jarayoni //Interpretation And Researches. – 2024. – Т. 1. – №. 1.

INKLYUZIV SINFLARDA ADAPTIV JISMONIY TARBIYA ORQALI IJTIMOIY MOSLASHUVNI QO'LLAB-QUVVATLASH

Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

E-mail: vivajahon@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208623>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv sinflarda adaptiv jismoniy tarbiya orqali imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlash masalalari ko'rib chiqiladi. Adaptiv jismoniy tarbiya nafaqat jismoniy rivojlanishni, balki psixologik va ijtimoiy integratsiyani ham ta'minlaydi. Maqolada jamoaviy o'yinlar, moslashtirilgan jismoniy mashqlar va rejalashtirilgan hamkorlik mashg'ulotlari orqali bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, tengdoshlar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga yordam berish usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, adaptiv jismoniy tarbiya, ijtimoiy moslashuv, maxsus ehtiyojli bolalar, rehabilitatsiya.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССАХ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы поддержки социальной адаптации детей с ограниченными возможностями посредством адаптивного физического воспитания в инклюзивных классах. Адаптивное физическое воспитание обеспечивает не только физическое развитие, но и психологическую и социальную интеграцию. В статье анализируются методы повышения уверенности детей в себе, развития навыков общения со сверстниками через запланированные совместные занятия.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, адаптивная физическая культура, социальная адаптация, дети с особыми потребностями, реабилитация.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССАХ

Abstract: This article examines ways to support the social adaptation of children with disabilities through adaptive physical education in inclusive classrooms. Adaptive physical education promotes not only physical development but also psychological and social integration. The article analyzes methods to boost children's self-confidence, develop peer communication skills, and facilitate successful integration into society through team games, adapted physical exercises, and planned cooperative activities.

Keywords: Inclusive education, adaptive physical education, social adaptation, children with special needs, rehabilitation.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda har bir insonning teng huquqli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli, inklyuziv ta'lim tizimi global miqyosda keng ommalashib bormoqda. Ushbu ta'lim modeli imkoniyati cheklangan bolalarni umumiy o'quv jarayoniga jalb etib, ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Lekin bu jarayonni samarali tashkil etish uchun maxsus pedagogik yondashuvlar, jumladan, adaptiv jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini qo'llash zarurati paydo bo'ladi [9].

Adaptiv jismoniy tarbiya – bu imkoniyati cheklangan bolalar uchun jismoniy faollikni oshirish, ularning harakat ko'nikmalarini rivojlantirish va ijtimoiy integratsiyani ta'minlashga yo'naltirilgan maxsus mashg'ulotlar tizimidir. Ushbu mashg'ulotlar o'quvchilarning jismoniy va psixologik holatini yaxshilash bilan birga, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi [2].

Adaptiv jismoniy tarbiya nafaqat bolalarning jismoniy rivojlanishiga, balki ularning psixologik barqarorligi va jamiyatga integratsiyasiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri rejalashtirilgan jismoniy mashg'ulotlar yordamida bolalar o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, harakat koordinatsiyasini yaxshilash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu boisdan, inklyuziv ta'lim tizimida adaptiv jismoniy tarbiya dasturlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Ushbu ishning **maqsadi** adaptiv jismoniy tarbiya sohasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish muammolarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan tahliliy vositalarni shakllantirishdan iborat.

Tadqiqotning usullari quyidagilardan iborat: ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish usuli; umumlashtirish usuli.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

Xalqaro tajriba va ilmiy tadqiqotlar. Dunyo bo'ylab olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limda adaptiv jismoniy tarbiya qo'llanilishi o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi, ruhiy holati va jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab mamlakatlarda inklyuziv ta'lim tizimida adaptiv jismoniy tarbiya muhim o'rin egallaydi. Masalan:

–AQShda maxsus jismoniy tarbiya dasturlari orqali nogiron bolalar uchun maxsus sport musobaqalari tashkil etiladi;

–Yevropa davlatlarida inklyuziv maktablarda imkoniyati cheklangan bolalar uchun individual yondashuv asosida jismoniy tarbiya dasturlari ishlab chiqilgan;

–Yaponiyada esa jismoniy tarbiya darslarida bolalar jamoadagi ijtimoiy faollikni oshirish uchun teatr va rolli o'yinlardan foydalaniladi [3].

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim tizimida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish orqali bolalarning akademik natijalari ham yaxshilanadi. Jumladan, Kanada, Finlandiya va AQSh kabi davlatlar imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus sport dasturlarini ishlab chiqib, ularning jamiyatga integratsiyasini samarali ta'minlamoqda. Ushbu maqolada inklyuziv sinflarda adaptiv jismoniy tarbiya orqali ijtimoiy moslashuvni qo'llab-quvvatlashning ahamiyati va usullari haqida batafsil fikr yuritiladi [10].

Inklyuziv ta'lim va ijtimoiy moslashuv. Bugungi kunda ta'lim jarayonida inklyuziv yondashuv tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Dunyo miqyosida inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli dasturlar amalga oshirilmoqda. Ushbu yondashuv barcha bolalar, jumladan, imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ham ta'lim olish imkoniyatini yaratishga xizmat qiladi.

Jismoniy tarbiya esa ushbu jarayonning ajralmas qismi bo'lib, bolalarning jismoniy rivojlanishi bilan birga, ularning jamiyatga moslashuv jarayonini ham tezlashtiradi. Ayniqsa, adaptiv jismoniy tarbiya mashg'ulotlari imkoniyati cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan metodlar asosida tashkil etilganda, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, jismoniy hamda psixologik farovonligini ta'minlashga yordam beradi [7].

Inklyuziv sinflarda ijtimoiy moslashuvning ahamiyati. Ijtimoiy moslashuv har qanday insonning jamiyat bilan integratsiyalashuvi jarayoni bo'lib, ayniqsa imkoniyati cheklangan bolalar uchun bu jarayon yanada muhimdir. Inklyuziv sinflarda o'qiyotgan bolalar uchun ijtimoiy moslashuv quyidagi jihatlar bilan ahamiyat kasb etadi:

- **o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish:** jamoadagi faol ishtirok orqali bolalar o'z qobiliyatlariga ishonch hosil qiladi;

- **muloqot ko'nikmalarini shakllantirish:** do'stlari va o'qituvchilari bilan muntazam muloqot qilish ularga kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi;

- **bag'rikenglik va empatiya:** tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlar orqali bolalar boshqalarning hissiyotlarini tushunish va hurmat qilishni o'rganadi;

- **o'qish jarayoniga moslashish:** ijtimoiy muhitga moslashgan bolalar akademik bilimlarni ham osonroq o'zlashtira oladilar.

Misol uchun, Germaniya va Rossiyada olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv sinflarda o'qigan bolalar kommunikatsiya ko'nikmalari va ijtimoiy moslashuv darajasi bo'yicha an'anaviy ta'lim olgan tengdoshlari bilan solishtirganda yuqori natijalarga erishgan. Shuningdek, Yaponiyada inklyuziv sinflarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning psixologik holati yaxshilanganligi kuzatilgan [5].

Psixologik barqarorlikni ta'minlash. Ijtimoiy moslashuv inklyuziv sinflardagi bolalarning psixologik holatiga bevosita ta'sir qiladi. Agar o'quvchi o'zini jamoaning to'laqonli a'zosi deb his qilsa, u o'zining bilim olish salohiyatini to'liq namoyon eta oladi. Aks holda, moslashish qiyinlashishi va bu uning bilim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ijoiy natijalar:

- o'ziga bo'lgan ishonch ortadi;
- stress va tashvish kamayadi;
- ruhiy bosimdan himoya qilinadi.

Jamoaviy munosabatlarni shakllantirish. Ijtimoiy moslashuv orqali o'quvchilar o'zaro do'stona va hurmatli munosabatlarni shakllantiradilar. Bunda ikki tomonlama jarayon sodir bo'ladi: imkoniyati cheklangan bolalar jamoadagi boshqa o'quvchilar bilan aloqa o'rnatishni o'rganadi, boshqa o'quvchilar esa inklyuziv muhitga moslashib, hamdardlik va tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. **Muhim jihatlar:**

- o'quvchilar bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydi;
- xurmat va mehr-muhabbat shakllanadi;
- jamoaviy ishlarda faollik ortadi.

Ta'lim samaradorligini oshirish. Inklyuziv muhitda ijtimoiy moslashuv yaxshi kechgan taqdirda, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishi ortadi va bu ta'lim sifatining yaxshilanishiga olib keladi. Shuningdek, individual yondashuv va maxsus metodikalar yordamida har bir o'quvchining qobiliyatlariga mos sharoit yaratiladi. **O'quv natijalari quyidagicha yaxshilanadi:**

- faollik va mustaqil fikrlash rivojlanadi;
- o'quv motivatsiyasi ortadi;
- ta'lim jarayonidan qoniqish hosil qilinadi.

Mustaqil hayotga tayyorgarlik. Inklyuziv ta'lim tizimi faqatgina maktabdagi muvaffaqiyatlar bilan cheklanmaydi. Uning asosiy maqsadlaridan biri bolalarni kelajakdagi mustaqil hayotga tayyorlashdir. Ijtimoiy moslashuv yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, imkoniyati cheklangan bolalar ham jamiyatda faol ishtirok etib, o'zlarining qobiliyatlarini namoyon eta oladilar [6]. **Kelajakda quyidagilarga erishiladi:**

- mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasi shakllanadi;
- jamiyatga to'laqonli qo'shilish imkoniyati ortadi;
- ish va kasb tanlashda ko'proq imkoniyat paydo bo'ladi.

Inklyuziv sinflarda adaptiv jismoniy tarbiya tamoyillari. Inklyuziv ta'lim sharoitida adaptiv jismoniy tarbiya quyidagi 5 tamoyillarga asoslanadi:

- individuallik – har bir bolaning jismoniy imkoniyatlari va ehtiyojlari inobatga olinadi;
- moslashtirish – mashg'ulotlar bolaning harakat qobiliyatiga mos ravishda tashkil etiladi;
- motivatsiya va qo'llab-quvvatlash – o'quvchilarning qiziqishlari rag'batlantiriladi;
- o'zaro hamkorlik – sog'lom bolalar va imkoniyati cheklangan bolalar birgalikda mashg'ulotlarda ishtirok etishi uchun sharoit yaratish;
- davomiy rivojlanish – natijalarni baholab, har bir bolaning jismoniy va ijtimoiy taraqqiyoti kuzatib boriladi [8].

Inklyuziv sinflarda ijtimoiy moslashuvni yaxshilash yo'llari. Ijtimoiy moslashuv jarayonini soddalashtirish va yanada samarali qilish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin [4] (1-jadval).

1-jadval. Moslashtirilgan jismoniy mashqlar turlari va ularning adaptiv yondashuvlari

Jismoniy mashqlar turlari	Adaptiv yondashuvlar
O'qituvchilar va sinfdoshlar orasida ijobiy muhit yaratish	o'qituvchilar hamma bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishi kerak; sinfdoshlar orasida hurmat va bag'rikenglikni targ'ib qilish muhim; jamoaviy o'yinlar, musobaqalar va tadbirlar orqali do'stona muhit shakllantirilishi lozim
Individual va guruhli mashg'ulotlar o'tkazish	o'quvchilar bilan individual suhbatlar orqali ularning ehtiyojlarini aniqlash; guruhli ishlash orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish; maxsus psixologik mashg'ulotlar tashkil etish
Pedagogik yondashuv va moslashtirilgan metodikalarni qo'llash	differensial ta'lim metodlaridan foydalanish; o'quv dasturlarini individual ehtiyojlarga moslashtirish; multimediya vositalari va interaktiv o'quv materiallaridan foydalanish
Ota-onalar bilan hamkorlik qilish	ota-onalar farzandining ijtimoiy moslashuv jarayonida faol ishtirok etishlari lozim; uyda ham bolani jamoa muhitiga moslashtirishga harakat qilish zarur; ota-onalarga pedagogik va psixologik maslahatlar berish muhim

Ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishning usullari. Adaptiv jismoniy tarbiya orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi usullar qo'llaniladi (2-jadval).

2-jadval. Imkoniyati cheklangan bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish mashqlari bo'yicha nazorat ko'rsatkichlari

Moslashtirilgan mashqlar	Monitoring va natijalar tahlili
Jamoaviy o'yinlar va sport turlari	nogiron bolalar va sog'lom tengdoshlar o'rtasida jamoaviy o'yinlar tashkil qilish ularning o'zaro muloqotini kuchaytiradi; basketbol, futbol, voleybol kabi moslashtirilgan o'yinlar orqali jamoadorlik hissi shakllanadi;
Harakatli o'yinlar	maxsus harakatlar asosida tuzilgan o'yinlar bolaning motorik qobiliyatlarini rivojlantiradi; ushbu o'yinlar bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi;
Individual dasturlar	har bir bolaning o'z imkoniyatlariga qarab tuzilgan shaxsiy mashg'ulot rejasi ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtiradi;
Tengdosh murabbiylik tizimi	sog'lom bolalar maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan birga mashg'ulotlar o'tkazishi, ularga yordam berishi orqali ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish mumkin;
San'at va harakat terapiyasi	musiqa va ritmik harakatlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshiradi; masalan, raqs terapiyasi orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etishni o'rganadilar

Ijtimoiy moslashuv va jismoniy tarbiya o'rtasidagi bog'liqlik. Jismoniy tarbiya nafaqat jismoniy rivojlanish, balki ijtimoiy moslashuv jarayonida ham muhim rol o'ynaydi. Sport va jismoniy mashg'ulotlar orqali bolalar:

jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi; o'zaro hamkorlik qilishni o'rganadi; muloqot qobiliyatlarini mustahkamlaydi; ijtimoiy munosabatlarni shakllantiradi.

Adaptiv jismoniy tarbiya metodlari. Inklyuziv sinflarda quyidagi adaptiv jismoniy tarbiya metodlaridan foydalanish mumkin:

–**individuallashtirilgan yondashuv** – har bir o'quvchining jismoniy imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos keluvchi mashg'ulotlarni tanlash;

–**jamoaviy o'yinlar** – sport o'yinlari va harakatli mashg'ulotlar orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish;

–**harakat terapiyasi** – raqs va muvozanat mashqlari orqali psixomotor rivojlanishga ko'maklashish;

–**trening va psixologik qo'llab-quvvatlash** – o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash uchun motivatsion dasturlarni qo'llash.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Inklyuziv sinflarda adaptiv jismoniy tarbiya nafaqat bolalarning jismoniy salomatligini yaxshilashga, balki ularning ijtimoiy moslashuviga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bu uslub orqali

bolalar o'z tengdoshlari bilan o'zaro muloqotga kirishadi, jamiyatga moslashadi va o'zlarining jamiyat a'zosi ekanliklarini his qilishadi. Shu sababli, inklyuziv ta'lim tizimida adaptiv jismoniy tarbiya dasturlarini keng joriy etish zarur. Kelajakda ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni kengaytirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish hamda xalqaro tajribalarni o'rganish inklyuziv ta'lim sifatini yanada oshirishga yordam beradi.

Inklyuziv sinflarda adaptiv jismoniy tarbiya orqali ijtimoiy moslashuvni qo'llab-quvvatlash ta'lim tizimi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishda muvaffaqiyatga erishish uchun: maxsus tayyorlangan jismoniy tarbiya dasturlarini ishlab chiqish; o'qituvchilar va murabbiylarni malaka oshirish kurslariga jalb qilish; ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Shunday qilib, inklyuziv sinflarda adaptiv jismoniy tarbiya bolalarning jismoniy rivojlanishi bilan bir qatorda, ularning jamiyatga to'liq moslashishiga ham xizmat qiladi. Kelajakda inklyuziv ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, maxsus dasturlar ishlab chiqish va o'qituvchilarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar davom ettirilsa, imkoniyati cheklangan bolalar ham jamiyatning to'laqonli a'zolariga aylanishi mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlatov Sh., Yusupova D. (2023). Adaptiv jismoniy tarbiya va inklyuziv pedagogikaning zamonaviy yondashuvlari // O'zbekiston Pedagogika Jurnal. – 2023. – №15(1). – B. 67-82.
2. Светличная Н.К. Развитие инклюзивного образования в области адаптивного физического воспитания детей // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. – Т.27. – №3. – С. 705-713.
3. European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2021). Promoting Inclusive Physical Education in European Schools: Policy and Practice. P. 30-49.
4. Jones G., Smith R. (2022). The Impact of Adaptive Sports on Social Inclusion and Psychological Well-Being of Children with Disabilities. Journal of Physical Activity and Health. 19(3). P. 210-225.
5. Moríña A. (2021). Inclusive Education in the 21st Century: International Perspectives and Best Practices. Springer. P. 55-78.
6. Pérez L., Block M.E. (2023). Effectiveness of Inclusive Physical Education Programs for Children with Disabilities: A Systematic Review. International Journal of Disability, Development and Education. 70(2). P. 145-160.
7. Sherrill C., Haegele J. (2021). Adaptive Physical Education and Sport. Human Kinetics. P. 112-129.
8. Slee R. (2020). Inclusive Education: From Policy to Practice. Routledge. P. 88-103.
9. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2021). The Role of Inclusive Education in Sustainable Development: A Global Perspective. Paris: UNESCO Publishing. P. 45-62.
10. World Health Organization (WHO) (2022). Guidelines on Physical Activity and Disability Inclusion in Education. Geneva: WHO. P. 23-38.

METHODOLOGY FOR TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN DESIGNING EDUCATIONAL CONTENT

Haydarkulova Mahliyo Zafarovna

Bukhara State Pedagogical Institute 2nd year basic doctoral student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15162989>

Abstract: This article analyzes the methodology for teaching future primary school teachers to design educational content. The importance of designing educational content for all parties involved in the teaching and learning process, including teachers, is highlighted. The article reflects on the importance of designing educational content to improve the quality of the education system, as well as to make the educational process innovative and effective. The relevance of modern lesson design in primary education and the importance of designing educational processes in primary schools are discussed.

Keywords: educational content, design, primary education, modern lesson, innovative technology, pedagogical process, project-based education.

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА

Аннотация: В данной статье анализируется методология обучения будущих учителей начальной школы проектированию образовательного контента. Подчеркивается важность проектирования образовательного контента для всех сторон, вовлеченных в процесс обучения и преподавания, включая учителей. В статье размышляется о важности проектирования образовательного контента для повышения качества системы образования, а также для того, чтобы сделать образовательный процесс инновационным и эффективным. Обсуждается актуальность современного проектирования уроков в начальном образовании и важность проектирования образовательных процессов в начальной школе.

Ключевые слова: образовательный контент, проектирование, начальное образование, современный урок, инновационные технологии, педагогический процесс, проектное обучение.

INTRODUCTION

In our changing world, the education system, like other areas, is developing rapidly. This shows that new concepts are emerging in the education system. In our country and abroad, prestigious universities and research institutes are primarily focusing on primary education and conducting research on the formation of the intellectual abilities of future primary education teachers, the consistent development of their creativity and creative abilities, and the formation of a well-educated, morally upright person. If we consider primary education as an example of a building, the builder who laid the foundation of this building is the primary school teacher. Significant reforms are being implemented in our country to create a system of training primary school teachers that meets international standards. This situation solves the problem of training high-quality, competitive teachers for all educational areas in high demand in the field of education, including primary school. As a result of the reforms carried out in recent years and in line with the principle of "Creating access to quality education throughout life" in the international education concept set for 2030, it is required to develop the design of educational content for future primary education teachers in higher education, to create new ideas that differ from the traditional approach, to develop the ability to think outside the box, to be individual, and to take initiative.

Designing educational content is the process of creating an educational program to provide students with the necessary knowledge, skills, and competencies.

MAIN PART

Project-based education has been used in pedagogy for more than 300 years. According to the research of the German pedagogue M. Knoll, the emergence of the concept of "project" dates back to the 16th century and is associated with the attempts of Italian architects to turn their activities into a profession, declaring architecture a science and elevating it to the level of academic disciplines. As a result of the emergence of the engineering profession at the end of the 18th century, the educational project began to be used first in France, then in Germany, Austria, Switzerland, and in the middle of the 19th century in technical and industrial higher schools in the USA. According to sources, the project method appeared in the USA in the second half of the 19th century, and its founder is the American educator and psychologist John Dewey. The design of the educational process is viewed as a value-oriented, deeply motivated, highly organized, purposeful professional activity aimed at changing the pedagogical reality. The term "project" has passed into the field of social sciences from the technical sphere, and means "the main idea of rebuilding the state of a particular area in accordance with specific rules." [2,17]

Design in the educational process is a specially organized purposeful educational activity by the teacher that ensures the student's independent action, from searching for a problem, planning and organizing activities to solving it, to mass evaluation. Design is an event, a process that occurs in a certain sequence over a certain period of time, leading to a unique result. It is appropriate to distinguish between the broad and narrow meanings of the term design. In the current conditions, there is no area of activity in society that does not work on the basis of design. In particular, the use of design methods in the educational process, instilling design skills in the growing younger generation, is difficult, but design is a process that directly affects the interests of the country and society. It requires will, consistency, great mobilization, dedication, and most importantly, serious aspiration and motivation from both educational subjects. In design-oriented activities, comparing evidence, logical generalization, critical approach, transforming conclusions into theory, order, planning, effort, using all your strength, not wasting time, comprehensively solving a didactic problem, developing systematic thinking, and increasing a person's cognitive activity are important factors.

According to the subject and content of the project: the project that includes one subject area and the systematic design of interdisciplinary activities are divided into research-related projects. Regardless of the form and type of the project, it is important that they are focused on specific didactic goals and take into account the level of the audience. Projecting requires mutual cooperation and responsibility from the participants of education.

The process of training future primary school teachers to design educational content requires the use of an interdisciplinary, systematic approach, since the lack of creativity in any pedagogical situation creates gaps in creative and professional activity. Therefore, it is advisable to fully organize the training of future primary school teachers in educational institutions and design educational content based on the use of various tools and methods.

The work on designing the content of education consists of two parts: designing the lesson and its implementation. In the process of developing design skills in the educational process of students of the primary education direction, it allows them to identify problems, correctly set goals, plan, and implement them. At the stage of identifying the problem, students have difficulties in analyzing the contradictions and problems in each subject during the teaching of specialized

subjects, and these difficulties are associated with insufficiently developed mental operations of analysis, comparison, and synthesis. This is to some extent due to the fact that today's youth are accustomed to quickly searching for information and finding ready-made answers. This is done on the basis of establishing close cooperation between the teacher and the student in the process of designing a solution to the problem, describing and analyzing the problem situation, and performing tasks on editing the problem.

METHODS

In order to properly organize the process of designing educational content, some topics from specialized subjects are developed on the basis of design and implemented using methods appropriate to the topics. In particular, the design lesson on the subject of mathematics teaching methods for students of primary education is aimed at the rapid, critical and logical thinking of students, and helps future teachers to activate their oral calculations and knowledge. The following methods can be used in this regard: the "Magic table" method, the "Separating numbers from numbers" method, the "Even and odd" method, the "Step by step" method, the "Discussion" method, the "Numbers and puzzles" method. For students of primary education, the subject of teaching methods of the native language. The design lesson is aimed at students' adherence to spelling rules, correct approach to content, and creative thinking. The recommended methods for preparing future teachers to activate their knowledge are the "Conversation" method, the "Sunflower" method, the "correct and beautiful writing" method, the "+ and -" method, the "Assessment" method, the "Continue the wrong letter" method, the "TTT" (Find the correct image) method. In addition, in the design lesson about teaching methods of natural sciences, students of primary education will have the opportunity to deepen their knowledge of this subject and connect it with everyday life. The following methods can be used in this subject: the "Conscious Choice" method, the "Let's Complete Together" method, the "Summarize Ideas" method, the "SMART" method, the "Mind Map", the "BBB" (I Knew, I Want to Know, I Found Out) method, and the "Best Idea" method are recommended. Lessons organized on the basis of this design not only give a positive effect, but also teach students to use every minute wisely in organizing a lesson and organize a lesson based on a plan. This improves the quality of the lesson and increases student activity. It helps future teachers learn new methods that they can use in the lesson process, and when they start their teaching career, they will realize how interesting, effective, and useful lessons can be if they organize education based on design.

One of the main tasks of primary education is to provide children with knowledge, form their worldview, and prepare them for social life. In order to educate primary school students in a way that meets these requirements, primary school textbooks must also meet these requirements, of course. We will not be mistaken if we say that the new primary school textbooks introduced in schools from 2023-2024 meet these requirements. These textbooks were created by international experts and Uzbek scientists, instilling Uzbek nationalism in a way that meets international assessment systems.

The information provided in the new textbooks encourages students to think creatively, broaden their horizons, and not just memorize what they have read, but to think, analyze, and think logically about what they have read. Let's look at this on the example of a 3rd-4th grade native language textbook. If we look at the 3rd grade native language textbook, in parts II, III, IV, after several topics, the topic "Creativity Hour. Project Work" is given. In part II of the textbook, topics 6, 10, 19, 24 are "Creativity Hour. Project Work", in part III, topics 6, 10, 23, 29 are "Creativity Hour. Project Work", in part IV, topics 5, 13, 20, 25 are divided into "Creativity Hour. Project

Work". In the 4th grade native language textbook, in Part II, topics 6, 11, 20, 26 are divided into "Creativity Hour. Project Work", in Part III, topics 5, 11, 21, 28, 33 are divided into "Creativity Hour. Project Work", and in Part IV, topics 5, 10, 18, 25 are divided into "Creativity Hour. Project Work". We can see that in these textbooks, after the student has been taught several topics, exercises are presented to be completed through a project called "creative hour" to consolidate their knowledge of these topics. For example, a 4th grade textbook is given a text called "Letter to a Friend," and after this text, students are given the task of writing a letter to their friends on this topic. Through this exercise, students learn to create another based on one project, follow the norms of the literary language during the creation of the text, and create a written text in an understandable way. In addition, students are introduced to the types of formal letters in the topics of project work. The topics in these textbooks encourage students to be creative, for example, exercises such as writing a poem or continuing a fairy tale.

By designing the content of education, the teacher uses the lesson time effectively and works with students individually, taking into account their individual psychological characteristics. This opens up a wider path for their deeper mastery of professional subjects. When organizing design work, the application of the didactic task and the problems of solving it are considered. Design is one of the important conditions for organizing the pedagogical process and ensuring its successful course. When designing the pedagogical process, such tasks as:

- a) analyzing the content of pedagogical activity;
- b) predicting the results;
- d) creating a project for implementing the planned activity are performed.

At this stage, the teacher's independent, but at the same time collaboratively with the student, designed activity based on determining the content and means of the educational process takes a leading place.[5, 23]

When planning a lesson, the teacher, of course, wonders about the method by which it will be conducted. On the surface, it seems that each topic can be taught using any method, but in practice this is not possible. A number of objective and subjective reasons and existing conditions negatively affect this. Monitoring student activity plays an important role in the design of the educational process. Therefore, designing the monitoring process also requires a particularly qualified approach from the teacher. Especially in primary grades, the teacher should pay special attention to this stage. In primary grades, the subjects in which projecting is most often used are native language and reading, natural sciences, and technology. In these lessons, it is important for the teacher to correctly design the project so that the topics are presented to students in a consistent, clear, and understandable way. Through properly organized lessons, students develop skills such as a clear idea of the topic, connecting the topic with life, and finding terms appropriate to the topic.

In the process of designing educational content, the teacher can use project-based learning. Project-based learning is a student-centered approach in which learning is organized through projects based on real-world tasks or problems. Educational content plays a crucial role in modern education and contributes to effective learning, accessibility, and adaptability. Educational content makes it easier for students to acquire and understand new knowledge and skills, allows people to learn at their own pace, considering different learning styles and preferences, and educational resources include multimedia elements, quizzes, and interactive features, which makes learning more interesting.

Educational design is a phenomenon that arises as a result of the interaction of new trends and the development of pedagogical theory and innovative practice. In foreign countries, including Russia, online paid courses called “Pedagogical Design of Educational Content” have been organized. This course is intended for students interested in pedagogy and who want to develop skills in developing educational content. The purpose of the program is to train students in the process of creating and organizing educational material and content based on modern pedagogical approaches. Students learn to analyze the needs of students, determine the goals and objectives of the educational process, plan and develop its content, effectively use information technologies, and adapt programs for different age groups and characteristics of students.

Project-based lessons require the teacher to be able to design a lesson in a well-thought-out, high-quality, work-oriented manner in a way that attracts students to the process. When organizing the educational process on a project basis, the teacher is required to play the role of a comprehensive creative educator, not an active operator. The problem of designing educational content in primary grades is important and relevant for both theory and practice. Project-based education allows solving the following urgent educational problems and meets the requirements of the time:

- ensures the implementation of education in a situation that is highly approximated to real life;
- allows the evaluation of theoretical information with practical activities and the involvement of students in the process of active independent knowledge;
- ensures the formation and development of professional and basic skills.

The process of teaching primary school teachers to design educational content begins when they are studying at the bachelor's level. To do this, the task of the teacher in higher education institutions is to create conditions for the effective independent creative activities of students and give them tasks to prepare projects. During the presentation of the projects created by the students, the teacher should tell them about the advantages and disadvantages of the projects they created. Through this method, they learn to create a project, develop projects to participate in various competitions. They learn to develop a technological map of how to organize theoretical and practical classes, that is, to develop a detailed plan for how to conduct a lesson, and in general, to plan their activities.

A primary school student perceives the world around him as a whole. For him, it is not the names of natural science, Russian, English, music and other subjects that are interesting, but the variety of sounds, colors, and sizes of objects in the world around him. The teacher feels and knows that children need to be taught to see the connection between nature and everything in everyday life. Therefore, if, by designing the content of education, the teacher explains the subjects to the students in an interesting way, connecting them with life, and has the student complete this project, the student's project completed during this lesson will be both interesting and effective. For example, in a mathematics lesson, the following small project can be used to teach shapes: shapes such as a circle, a rectangle, a square, a triangle, a cone are given, students first draw objects corresponding to these shapes, giving examples from everyday life, and then use these shapes to make something. They can build a house using triangles, rectangles, and squares. This project encourages students to think, imagine, and think logically. Especially in elementary grades, using such small projects is very convenient, easy, and interesting. In addition, today's demand is to teach students to work independently and think logically. Based on such small projects, the entire

lesson and educational process are gradually covered. Teachers who start organizing lessons in this way later plan their entire activities and thus design the educational content.

CONCLUSION

Primary education is the main foundation of education, and the knowledge given to students at this stage constitutes their main information reserve, and therefore the responsibility of the primary school teacher is great. If future primary school teachers are taught to design educational content, the teacher's work will be easier and more effective. Designing requires the teacher to have high knowledge, potential, skills, and a strong understanding of modern information technology. Therefore, in order to design each lesson, the teacher must not only know the necessary knowledge on that subject, but also know how to convey that knowledge to students on the basis of design. That is, first of all, the teacher must be creative and be able to use innovations effectively. He must be able to design each lesson and convey it to the student in an interesting way.

References

1. Decree Of The President Of The Republic Of Uzbekistan No. 5712 Dated April 29, 2019 “On Approval Of The Concept Of Development Of The Public Education System Of The Republic Of Uzbekistan Until 2030”
2. Husenova A.Sh. Abstract Of The Dissertation “Methodology Of Designing Teacher Activities In The Integration Of Primary School Native Language And Reading Lessons” (Phd), Bukhara 2023
3. Haydarkulova M.Z. “Organization Of Lessons In Primary Grades On The Basis Of The Educational Principle Of Designing” Journal “Pedagogical Skills” Issue 10, 2024. Bukhara
4. Haydarkulova M.Z. “Training Future Primary Teachers To Design Educational Content” Journal Of Education And Innovations No. 10 2024
5. Dehqonova M.Sh. “Methodology For Developing Pedagogical Design Competence Of Future Primary Education Teachers” (Phd) Dissertation Abstract T.,– 2024.
6. Sulaymanova D.N. Project-Based Learning (Pbl) As A Technology For Developing Creative Thinking In Future Teachers “Republican Scientific And Practical Conference On Psychological-Pedagogical Aspects Of Intensive Language Teaching In The Era Of Digital Technologies” June 2, 2023.

O'YIN VA TOMOSHA SPORT TADBIRLARIDA ESTETIK TAJRIBA HODISASI

Rasulov Zoxid O'sar o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi
Pegagogika va ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası v.b dotenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15162925>

Annotatsiya: O'yin va tomosha sport tadbirlarida estetik tajriba hodisasi bugungi kunda sport madaniyati va tomoshabinlar bilan o'zaro aloqalarini tahlil qilishda muhim o'rin tutadi. Bu maqolada sport tadbirlarida estetik tajriba va tomoshabinlarning estetik hissiyotlarini qanday shakllantirishini, o'yinlarning san'ati va dizaynining tomoshabinga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, sport voqealarining estetik yondoshuvi tomoshabinlarning sportga bo'lgan munosabatini qanday o'zgartirishi va estetik tajribani yanada boyitishga yordam berishini tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: Sport tadbirlari, estetik tajriba, tomoshabin, o'yin san'ati, dizayn, sport madaniyati, estetik hissiyot, tomosha

ЯВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ЗРЕЛИЩАХ

Аннотация: Явление эстетического переживания на спортивных мероприятиях и зрелищах занимает важное место в анализе спортивной культуры и взаимодействия с зрителями. В статье рассматривается, как формируется эстетическое восприятие на спортивных событиях и как искусство и дизайн игр влияют на зрителей. Также анализируется, как эстетический подход к спортивным событиям может изменить отношение зрителей к спорту и способствовать обогащению эстетического опыта.

Ключевые слова: Спортивные мероприятия, эстетическое переживание, зрители, искусство игры, дизайн, спортивная культура, эстетические эмоции, зрелище

THE PHENOMENON OF AESTHETIC EXPERIENCE IN SPORTS EVENTS AND SPECTACLES

Abstract: The phenomenon of aesthetic experience in sports events and spectator shows plays a significant role in the analysis of sports culture and the interaction between spectators. This article examines how aesthetic experiences are shaped in sports events and how the art and design of games impact spectators. It also analyzes how the aesthetic approach to sports events can alter spectators' attitudes toward sports and contribute to enriching the aesthetic experience.

Keywords: Sports events, aesthetic experience, spectators, game art, design, sports culture, aesthetic emotions, spectacle

KIRISH

Sport tadbirlari nafaqat jismoniy kuch va mahoratni namoyish etadigan faoliyatlar, balki ular tomoshabinlarda estetik hissiyotlarni uyg'otuvchi, madaniy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan hodisalardir. Hozirgi kunda sport o'yinlari va tomoshalari jismoniy faoliyatdan tashqari, keng ko'lamli estetik tajribalarni yaratishga qaratilgan. Bu jarayon nafaqat sportchilar uchun, balki tomoshabinlar uchun ham ahamiyatlidir, chunki ular o'zining estetik hissiyotlari va tasavvurlarini shakllantiradi.

Sport tadbirlarida estetik tajriba hodisasi tomoshabinlarni o'ziga jalb qilish, ularning emotsional va vizual taassurotlarini uyg'otish orqali sport voqealariga yangi mazmun qo'shadi. Shuningdek, o'yinlarning san'ati, dizayni, stadionlarning arxitekturasini va umumiy atmosferasi tomoshabinlarga o'ziga xos estetik yondoshuvni taqdim etadi. Bu holat sportni nafaqat jismoniy kurash, balki madaniy tadbir sifatida qabul qilishga undaydi.

Estetik tajriba sport madaniyatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, sportni ommaviylashtirish va tomoshabinlar bilan yanada chuqurroq aloqalarni o'rnatish imkonini beradi. Shu sababli, o'yin va tomosha sport tadbirlarida estetik tajriba hodisasi, ayniqsa, hozirgi kunda, sport va madaniyatning o'zaro bog'liq va rivojlanayotgan sohasi sifatida dolzarb mavzu hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi o'yin va tomosha sport tadbirlarida estetik tajriba hodisasini o'rganish, uning tomoshabinlar bilan o'zaro aloqalarini, shuningdek, sport voqealarining estetik yondoshuvining ta'sirini tahlil qilishdan iborat.

TADQIQOT USULLARI

Nazariy tahlil, empirik tadqiqot, kvalitatif tahlil, pedagogik kuzatish, kontent tahlili, statistik tahlil.

Tadqiqotning metodologik asoslari estetik tajriba hodisasini o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, u sport tadbirlari va tomoshalarida tomoshabinlar bilan o'zaro aloqalar, san'at va dizaynning sport voqealaridagi roli, hamda estetik hissiyotlarning shakllanish jarayonlarini tahlil qilishga imkon beradi.

Tadqiqotda fenomenologik yondashuv qo'llaniladi, bu esa sport tadbirlarida tomoshabinlarning estetik tajribalarini va hissiyotlarini o'rganish uchun tegishli usul hisoblanadi. Shuningdek, kontseptual tahlil yordamida estetik tajriba tushunchasining sport madaniyatida qanday amalga oshirilishini va bu jarayonda estetik yondoshuvlarning ahamiyatini ko'rib chiqish mumkin.

Tadqiqot jarayonida sport tadbirlari va tomoshalarida estetik tajriba hodisasini tahlil qilish uchun maxsus dastur ishlab chiqilgan. Ushbu dastur tomoshabinlarning estetik tajribalari, sport o'yinlarining dizayni, atmosferasi, sahna san'ati, musiqasi va boshqa estetik elementlar haqida ma'lumotlar to'plashga mo'ljallangan. Dastur yordamida so'rovnomalar va intervyularni onlayn yoki oflayn tarzda o'tkazish mumkin bo'ladi.

Tomoshabinlarning estetik tajribalarini o'rganish: Dastur yordamida sport tadbirlari va tomoshalar haqida tomoshabinlardan fikrlar va hissiyotlar yig'iladi.

Sport o'yinlari dizaynini tahlil qilish: O'yinlarning vizual, san'at va dizayn jihatlari haqida ma'lumot to'planadi.

Estetik hissiyotlarni o'lchash: Tomoshabinlarning sport tadbirlariga bo'lgan estetik reaksiyalari o'lchanadi va bu ma'lumotlar tahlil qilinadi.

Kuzatish va tahlil: Dastur yordamida sport tadbirlarida kuzatish olib borish va tomoshabinlarning estetik aloqalarini o'rganish mumkin.

Ma'lumotlarni tez va aniq yig'ish: Dastur yordamida so'rovnomalar va intervyularni samarali tarzda o'tkazish imkoniyati yaratiladi. Bu orqali sport tadbirlari va tomoshalaridagi estetik tajribalarni to'plash va tahlil qilish ancha tezlashadi.

Tomoshabinlarning hissiyotlarini o'lchash: Dastur tomoshabinlarning estetik hissiyotlari haqida aniq va sifatli ma'lumotlar beradi, bu esa tadqiqotning natijalarini ishonchli va ilmiy asosda chiqarishga yordam beradi.

Tadqiqot samaradorligini oshirish: Maxsus ishlab chiqilgan dastur yordamida tadqiqot jarayonida ishtirokchilarni ko'proq jalb qilish va ularning estetik tajribalari haqida kengroq ma'lumot olish mumkin bo'ladi.

Sport madaniyatini yanada chuqurroq tushunish: Dastur orqali yig'ilgan ma'lumotlar sport va estetik madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va sport tadbirlarida estetik yondoshuvni rivojlantirishda yordam beradi.

1-jadval. O'yin va tomosha sport tadbirlarida estetik tajriba dasturining qo'llanilishi va samaradorligi

Asosiy jihatlar	Tavsif
Ishlab chiqilgan dastur	Sport tadbirlari va tomoshalarida estetik tajriba hodisasini tahlil qilish uchun maxsus dastur ishlab chiqilgan. Dastur so'rovnomalar, intervyular va kuzatuvlar orqali ma'lumotlarni yig'adi.
Qo'llanilishi	1. Tomoshabinlarning estetik tajribalarini o'rganish 2. Sport o'yinlari dizaynini tahlil qilish 3. Estetik hissiyotlarni o'lchash 4. Kuzatish va tahlil.
Samaradorligi	1. Ma'lumotlarni tez va aniq yig'ish 2. Tomoshabinlarning hissiyotlarini o'lchash 3. Tadqiqot samaradorligini oshirish 4. Sport madaniyatini yanada chuqurroq tushunish.

2-jadvalda baholash mezonini ishlab chiqilgan. Bu tadqiqotning samaradorligini, natijalarining sifatini va tadqiqotda foydalanilgan usullarni to'g'ri baholash uchun muhim qadam hisoblanadi. Quyidagi mezonlar sport tadbirlarida estetik tajriba hodisasini tahlil qilishni baholashda qo'llanishi mumkin:

2-jadval. O'yin va tomosha sport tadbirlarida estetik tajriba dasturining samaradorligi bo'yicha baholash mezonlari

Mezonlar	Tavsif
Ma'lumotlarning ishonchliligi	Tadqiqotda to'plangan ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligi. So'rovnoma va intervyularda olingan javoblarning yagonaligi va to'g'riligi.
Tadqiqotning to'liqligi	Sport tadbirlarida estetik tajriba va uning tomoshabinlarga ta'siri haqida olingan ma'lumotlarning kengligi va chuqurligi.
Usul va metodlarning samaradorligi	Tadqiqotda qo'llangan metodlarning (so'rovnomalar, intervyular, kuzatish) samaradorligi va ular sport voqealarining estetik tajribasini qanday aniq tahlil qilishi.
Fikr va hissiyotlarning aks ettirilishi	Tomoshabinlarning estetik tajribalarini tahlil qilishda ularning fikr va hissiyotlarini to'liq aks ettirishning samaradorligi.
Sport va estetik madaniyat o'rtasidagi aloqalarni aniqlash	Sport tadbirlari va estetik tajribaning o'zaro bog'liqligini qanday aniqlash va tahlil qilish.

Innovatsion yondoshuv	Tadqiqotda ishlatilgan innovatsion metodlar va dastur vositalarining sport tadbirlaridagi estetik tajribani o'rganishga qo'shgan hisssasi.
Samaradorlik va vaqtni boshqarish	Tadqiqotning samaradorligi va vaqtni qanday boshqarish. Ma'lumot yig'ish, tahlil qilish va natijalarni olishda vaqtning samarali boshqarilishi.
Praktik qo'llanilishi	Tadqiqot natijalarining sport tadbirlari, tomoshalar va estetik tajriba bilan bog'liq sohalarda qanday qo'llanishi mumkinligi.

Ushbu baholash mezonlari yordamida tadqiqot jarayonining sifatini, metodologiyasini va natijalarini ob'ektiv ravishda baholash mumkin bo'ladi. Har bir mezon sport tadbirlarida estetik tajriba hodisasining tahlilini aniq va sifatli amalga oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sport tadbirlari va tomoshalarida estetik tajriba hodisasi tomoshabinlarning estetik hissiyotlarini shakllantiradi va sport voqealariga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Sport tadbirlarida tomoshabinlar ko'pincha o'yinlarning dizayniga, sahna san'ati va umumiy atmosferaga e'tibor berishadi. Ushbu estetik elementlar tomoshabinlarning emotsional holatini shakllantiradi va sport voqealariga bo'lgan qiziqishni oshiradi. O'yin dizayni va sahna san'ati tomoshabinlarning estetik tajribalarini boyitadi. Tomoshabinlar o'yinlar yoki tomoshalarining vizual jihatlarini kuzatishda o'zlarini qiziqtiradigan elementlarni aniqlashadi, masalan, ranglar, yoritish va musiqa. Estetik tajriba sport tadbirlarida tomoshabinlarning hissiyotlarini uyg'otadi va ularni sport tadbirlarining bir qismi sifatida faol ishtirok etishga undaydi.

XULOSALAR

Sport tadbirlari va tomoshalarida estetik tajriba tomoshabinlarning hissiyotlarini va tajribalarini shakllantiradi, bu esa sport voqealariga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Estetik tajriba sport va madaniyat o'rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi, tomoshabinlarga sport voqealarini madaniy va estetik nuqtai nazardan qabul qilishga imkon yaratadi. Tomoshabinlarning estetik reaksiyalari sport tadbirlari va tomoshalarining umumiy atmosferasi, dizayni va san'atidan shakllanadi, bu esa ularni yanada faolroq ishtirok etishga undaydi. Sport tomoshalaridagi estetik elementlar, masalan, sahna bezaklari, ranglar va musiqa, tomoshabinlarga faqat jismoniy faoliyat emas, balki estetik va madaniy voqealarni ham taqdim etadi. Estetik yondoshuvlar sport tomoshalarining madaniy qiymatini oshiradi, tomoshabinlar bilan aloqalarni mustahkamlab, sportga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Estetik tajriba sport tadbirlarining madaniy ahamiyatini oshiradi, bu esa sportni tomoshabinlar uchun faqat jismoniy faoliyat sifatida emas, balki madaniy va estetik tadbir sifatida qadrlil bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida» PF-5368-son farmoni. 2018 yil 5-mart.
2. 2019-2023-yillarda O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasi 2019-yil 15-fevral.
3. Yarashev K.D. Jismoniy tarbiya va sport sohasida bo'lajak kadrlarni tayyorlashning nazariy va amaliy asoslari.//Monografiya.–T.:<O'ZKITOBSAVDO>nashriyoti/-2023.-178 b.,
4. N.A.Muslimov. Kasb ta'limi mutaxassislarining kasbiy kompetentligini shakllantirish

- texnologiyasi, Monografiya.-T.:» Fan va texnologiya» nashriyoti, 2013.-36 b.,
5. S.S.Sharipov. Kasb tanlashga yo'llash va o'qitish metodikasi, Darslik T.:O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014.-133 b., G.S.Nasriddinova. Kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari. O'quv qo'llanma. –Toshkent, 2007. 56 b.
 6. Xolboyeva G.X. Jismoniy madaniyat mutaxassislarini kasbiy-karera faoliyatiga tayyorlash tizimini moderinizatsiyalash // Monografiya. Samarqand, nashriyoti, 2024. - 178 bet.
 7. Xolboyeva G.X. Jismoniy tarbiya mutaxassislari kasbiy salohiyatini zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida tizimli moderinizatsiyalash // NamDU axborotnomasi. 2024 9-son. B. 538-546. ISSN:2181-1458. ISSN:2181-0427. [13.00.01.№9].
 8. Xolboyeva G.X. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida jismoniy tarbiya mutaxassislarning kasbiy salohiyatini moderinizatsiyalash asosida oshirish // Scientific-theoretical journal of International education research.Vol. 2 No.ISSN 2181-4279 3-son 2024. –B.33-39. [13.00.00.№3].
 9. Holboyeva G.H., Theory and methodology of physical education. Textbook Samarqand state university edition. 2020; 56-59.

FORMING 4K SKILLS IN STUDENTS WHEN TEACHING THE TOPIC OF ACIDS

Sadikova Umidakhan Bakhtiyar kizi

Independent researcher at Tashkent State Pedagogical University Tashkent.Uzbekistan

E-mail: umidasodikova1244@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208714>

Abstract: This article develops tasks focused on 21st century skills: communication, creative and critical thinking, and collaboration in teaching the topic of acids in chemistry lessons. All chemistry teachers can use them to explain the topic of acids in 7th grade. In the formation of communication skills, tasks are given that link the importance of acids in our daily lives, which serves to increase students' interest in the lesson.

Keywords: chemistry lesson, communication, creative and critical thinking, collaboration, daily activities, acids, acetic acid, sour taste, shovel leaf.

KISLOTALAR MAVZUSINI O'QITISHDA O'QUVCHILARDA 4K KO'NIKMALARINI SHAKILLANTIRISH

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo darslarida kislotalar mavzusini o'qitishda XXI asr ko'nikmalari: kommunikativlik, kreativ va kritik fikrlash, kollaboratsiyaga yo'naltirilgan topshiriqlar ishlab chiqilgan bo'lib, ulardan barcha kimyo fani o'qituvchilari 7-sinflarda kislotalar mavzusini tushuntirishlarida foydalanishlari mumkin. Kommunikatsiya ko'nikmalarini shakillantirishda kislotalarning kundalik hayotimizdagi ahamiyatiga bog'lagan topshiriqlar berilgan bo'lib, bu o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini ortishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kimyo darsi, kommunikativlik, kreativ va kritik fikrlash, kollaboratsiya, kundalik faoliyat, kislotalar, sirka kislota, nordon ta'm, shavel bargi.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 4К У СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА КИСЛОТЫ

Аннотация: В данной статье разработаны навыки XXI века: коммуникабельность, творческое и критическое мышление, задания на сотрудничество для преподавания темы «Кислоты» на уроках химии, которые могут быть использованы всеми учителями химии при объяснении темы «Кислоты» в 7 классе. При формировании коммуникативных навыков даются задания, связанные с значением кислот в нашей повседневной жизни, что способствует повышению интереса учащихся к уроку.



Ключевые слова: урок химии, коммуникативное, творческое и критическое мышление, сотрудничество, повседневная деятельность, кислоты, уксусная кислота, кисловатый вкус, лист лопатки.

INTRODUCTION.

Developing communication skills. If you look at the fruits and plants in the pictures below, almost all of them have a sour taste.



What do you think gives them their sour taste? What are the positive and negative effects of eating them on the body? Why are there ants and shovel leaves in the picture?



Why does the body crave sour foods?
What does the desire to eat sauerkraut or a slice of lemon mean?



Students engage in discussions with each other, begin to analyze, think about the chemicals used in our daily activities, collect sour-tasting fruits and vegetables, and try to determine what they have in common, developing their communication skills. Solution. The word acid comes from the Latin word "acidus" meaning sour. Acids are widely distributed in nature and can be found in almost all the products we consume. [1].For example, lemons contain citric acid, grapes contain tartaric acid, ant stomachs contain formic acid, and willow leaves contain oxalic acid. Due to their bitter taste, they are called sour substances in some literature.[2] Acids are a key component in the production of many products we use in everyday life.[3]

MATERIAL AND RESEARCH METHODS

"Pea Rain" experiment. Collaborative tasks.

1.Required equipment and reagents: beaker, spatula, glass rod, acetic acid, baking soda, peas.

Pour 100 ml of acetic acid into a glass. Put 6-7 peas on top of it. What process was observed? Then pour baking soda on top of it, stir with a glass rod. Observe the process that occurs and answer the following questions.

Why did the peas sink to the bottom of the container when you put them in acetic acid?

Why did the peas slowly float to the top of the solution after you added baking soda to the acetic acid?

Write the equation for the reaction between acetic acid and baking soda.

2.Place the given acids in the tables below according to their bases. H_2SO_4 , HNO_3 , HCl , CH_2O_2 , $C_6H_8O_7$, H_2S , H_3PO_4 , H_2CO_3 , H_2SiO_3 , HF , HBr , HJ , H_2SO_3 , $HMnO_4$, $H_2 MnO_4$, $C_2H_2O_4$, H_3BO_3 ,

Classification table			
Monobasic acids	Dibasic acids	Tribasic acids	Organic acids

3. Read the following information about the uses of acids and determine which acid is being discussed.

1. HCl / H₂SO₄ is widely used in varnishes and paints, mineral fertilizers, chemical technology, the food industry, as an electrolyte in battery production, and as a paper dryer (hygroscopic substance).[4]



2. H₂SO₄ / HNO₃ is used in the production of explosives, in the production of mineral nitrogen fertilizers, and in the production of medicines (nitroglycerin).



3. HCl / H₂SO₄ - used in metallurgy, food production, electroplating, and medicine. It is found in gastric juice.



4. CH₂O₂ / C₆H₈O₇ - used in medicine as an antiseptic. A colorless liquid with a pungent odor. Food additive E236, used in agriculture as a preservative for feed, in beekeeping, to eliminate parasites, and in the textile industry.



5. CH₂O₂ / C₆H₈O₇ - used in the food industry as an acidity regulator, flavor additive, preservative, in medicine, and in the production of cosmetics. It is a weak acid. It dissolves well in water. It is a component of drilling fluids in oil and gas extraction.



Answers for verification

1-H₂SO₄, 2- HNO₃, 3-HCl, 4- CH₂O₂ , 5- C₆H₈O₇

CONCLUSION

Completing this task will help students quickly and easily apply the theoretical topic in practice, create mental activity during the lesson, and develop not only understanding of the topic, but also the ability to explain it. Teachers will also make theoretical lessons enjoyable and interesting.

Liretarure

1. Alimova F.A. Organization of independent work of future teachers of chemis-on the basis of project activities // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – V. 3. – no. 02. – Pp. 552-557.
2. Джураев Р.Х. Внедрение интерактивных ресурсов в практику школьного образования. Научно-методическое пособие. – Т.: SANO-STANDART, 2012.
3. Alimova F.A., Sodiqova U.B. “Kimyo darslarida XXI asr ko‘nikmalarini shakillantirishda kimyo fani o‘qituvchilarining pedagogik-psixologik jihatlari” //Ta’limni modernizatsiyalash sharoitida kimyo va uni o‘qitishdagi dolzarb masalalar: Yutuqlar,muammo, yechimlar Respublika konferensiya/(17-sentyabr 2024-yil,9-bet)
4. Sodiqova U.B. “Kimyo fanidan kritik va kreativ fikrlashga yo‘naltirilgan topshiriqlar ishlab chiqish metodikasi”// Коллоидная химия: инновации и решения для химической технологии, экологии и промышленности Международная научно-техническая конференция/(7-8-fevral 2025-yil,3-tom,381-bet)

YEVROPA ECTS KREDIT-MODUL TIZIMIDA MUSTAQIL TA'LIM VA UNGA O'QITUVCHINING RAHBARLIK FAOLIYATI

Toshmatov G'ulomjon Olimjonovich

Namangan davlat pedagogika instituti, ART pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15133579>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yevropa ECTS kredit-modul tizimida mustaqil ta'lim va unga o'qituvchining rahbarlik faoliyati haqida fikr yuritilgan bo'lib, mustaqil ta'limning ahamiyati, maqsadi, vazifalari talabalarning fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni, o'z-o'zini mustaqil ta'lim olish bilan rivojlantirib borish, auditoriyada olingan bilimlarini mustaqil bajarish orqali mustahkamlash va bu faoliyatlarni amalga oshirishda o'qituvchining rahbarligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, qiyinchiliklar, motivatsiya yetishmovchiligi, vaqtni boshqarish, o'qituvchi rahbarligi, doimiy nazorat.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ECTS

Аннотация: В статье рассматривается самостоятельное обучение и руководство преподавателя в европейской кредитно-модульной системе ECTS. В ней рассматриваются важность, цели и задачи самостоятельного обучения, роль самостоятельного обучения в развитии знаний, навыков и компетенций студентов по предмету, саморазвитие посредством самостоятельного обучения, закрепление знаний, полученных в классе, посредством самостоятельной работы и руководство преподавателя при реализации этих видов деятельности.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, трудности, отсутствие мотивации, управление временем, руководство учителя, постоянный контроль.

INDEPENDENT LEARNING AND TEACHER GUIDANCE IN THE EUROPEAN ECTS CREDIT-MODULE SYSTEM

Abstract: This article discusses independent learning and the teacher's guidance in the European ECTS credit-module system. It discusses the importance, goals, and objectives of independent learning, the role of independent learning in the development of students' knowledge, skills, and competencies in the subject, self-development through independent learning, consolidation of knowledge acquired in the classroom through independent performance, and the teacher's guidance in implementing these activities.

Keywords: independent learning, difficulties, lack of motivation, time management, teacher guidance, constant supervision.

KIRISH

Hozirgi kunda Oliy ta'lim tizimida Yevropa davlatlarining ECTS kredit-modul tizimi orqali o'qitilib talabalarga o'quv dasturdagi barcha majburiy va tanlov fanlarini samarali o'rgatishda va ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda keng qo'llanilmoqda. Bu tizimning asosiy maqsadi talabalar bilimlarini nazorat qilish va baholashni soddalashtirishdan iborat bo'lib, ularni o'z-o'zini rivojlantirishga, mustaqil ishlarga rag'batlantirishga yo'naltiradi. Kredit-modul tizimida ta'lim jarayoni talabaga o'z bilimlarini o'zlashtirish, o'qish jarayoniga faol ishtirok etish

va o'z-o'zini baholash imkoniyatini beradi. Mustaqil ta'lim, o'z navbatida, talabalarni o'z faoliyatini boshqarishga, ilmiy izlanishlar olib borishga va o'z bilimlarini mustahkamlashga undaydi. Shu bilan birga, o'qituvchining rahbarlik roli bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

Yevropa oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim muhim o'rin tutadi va talabalarga ta'lim olishning yanada erkin va o'ziga xos usullarini taklif etadi. Mustaqil ta'lim bu talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirish, o'rgangan materiallarni tahlil qilish va qo'llash, hamda o'z oldiga belgilangan maqsadlarni erishish uchun o'z vaqtini va resurslarini boshqarish imkoniyatidir.

Mustaqil ta'lim talabalarni o'zini boshqarish va mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Bu jarayon talabalarga yuqori darajadagi ijtimoiy va akademik kompetentsiyalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Yevropada ta'lim tizimi talabalarga o'z ta'lim yo'nalishini tanlashda va o'z vaqtini boshqarishda katta erkinlik beradi. Bu esa mustaqil ta'limni osonlashtiradi, chunki talabalar o'ziga mos va qulay bo'lgan o'qish jadvalini tuzishlari mumkin.

Ko'plab yevropalik universitetlar onlayn ta'lim resurslari, masofaviy o'qish, forumlar va boshqa raqamli vositalarni qo'llab-quvvatlashadi. Bu talabalarni mustaqil o'rganishga undaydi va ularga o'z bilimlarini rivojlantirishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Yevropadagi oliy ta'lim tizimi Bologna jarayoni doirasida yagona tizimga aylangan. Bu tizimda talabalarga o'z bilimlarini mustaqil ravishda o'stirish va turli o'qish metodlarini qo'llash imkoniyatlari yaratilgan. Mustaqil ta'lim Bologna jarayonining asosiy tamoyillaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Yevropada ta'lim kredit tizimi (ECTS) yordamida talabalarga o'z o'qish jarayonini rejalashtirish va boshqarish imkoniyatlari yaratiladi. Har bir kurs yoki o'quv fani belgilangan kreditlar soni bilan o'lchanadi, va bu talabaga mustaqil ta'limni amalga oshirishda katta yordam beradi.

Yevropada mustaqil ta'lim talabalarni yuqori darajada erkinlikka ega bo'lishga undaydi. Ular o'zlarini qiziqtirgan sohalarida yanada chuqurroq bilim olishlari mumkin. Shuningdek, mustaqil ta'lim talabalarga tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Kredit-modul tizimi va mustaqil ta'limga oid bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjud. Xususan, V. O'rinov, M. Sultonov., A. Umarovlar (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, kredit-modul tizimida o'qish jarayonining talabalar uchun qanchalik foydali ekanligi ko'rsatilgan. Tadqiqotda, bu tizim talabalarni mustaqil ishlashga, o'z-o'zini baholashga va vaqtni samarali boshqarishga o'rgatadi. Sh.I.Yo'ldashev (2022) tomonidan taqdim etilgan qo'llanmada esa mustaqil ta'limning pedagogik afzalliklari tahlil qilingan bo'lib, bu jarayonda o'qituvchining rahbarligi muhim o'rin tutadi. D.R. Karimova (2021) o'z tadqiqotida, o'qituvchi rahbarligida amalga oshiriladigan mustaqil ta'limning talabalar motivatsiyasini oshirish va ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishdagi o'rnini ta'kidlagan. Boshqa tadqiqotchilar R.D.Tosheva (2021) kredit-modul tizimining talabalarni yuksak darajada bilim olishga undashini, lekin ularning o'z-o'zini tashkil qilishda ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishlarini ko'rsatishgan.

NATIJALAR

Kredit-modul tizimi asosida o'tkazilgan ta'lim jarayonida mustaqil ta'limning ahamiyati aniq ko'rinadi. Talabalar o'qituvchidan faqat ko'rsatmalar va maslahatlar olishadi, lekin ko'p vaqtini mustaqil ishlashga sarflaydilar. Ushbu tizim orqali talabalar o'z bilimlarini yanada

mustahkamlaydi, vaqtni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi, shuningdek, ijodiy fikrlash va ilmiy izlanishlarni amalga oshirishda muvaffaqiyatga erishadilar. Natijada, talabalar faqat akademik bilimlarni emas, balki shaxsiy rivojlanish, muammolarni hal etish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini ham oshiradilar.

MUHOKAMA

Kredit-modul tizimida mustaqil ta'limning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, u talabalarni o'z-o'zini tashkil qilishga undaydi. Bu tizim, shuningdek, talabalarni motivatsiyalashga yordam beradi, chunki ular o'z maqsadlariga erishish uchun o'zlari javobgar bo'lishadi. O'qituvchi rahbarligi esa, talabalar uchun kerakli yo'nalishni beradi, qiyinchiliklarga duch kelganida yordam ko'rsatadi va ular uchun to'g'ri resurslarni taqdim etadi.

Biroq, bu tizimning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Talabalar o'z-o'zini boshqarish qobiliyatiga ega bo'lmagan bo'lsa, ularning samarali ishlashlari qiyinlashadi. Shuningdek, o'qituvchining nazorati va yo'l-yo'riqlari aniq bo'lmasligi, talabalar o'z bilimlarini to'g'ri yo'naltira olmasliklariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'qituvchining rahbarligi va ta'limni samarali tashkil qilish muhim ahamiyatga ega.

Mustaqil ta'limning imkoniyatlari va cheklovlari:

Imkoniyatlar: Mustaqil ta'lim talabalarga o'z qiziqishlariga qarab o'qish imkoniyatini beradi. Masalan, ular o'quv resurslarini (kitoblar, ilmiy maqolalar, videolar, onlayn kurslar) kengaytirishi va o'z o'rganish jarayonini nazorat qilishi mumkin.

Cheklovlar: Biroq, ba'zi talabalar uchun mustaqil ta'limning ayrim qiyinchiliklari ham mavjud. Bu jarayon o'z-o'zini tashkil etishni talab qiladi va ba'zan talabalarga o'z vaqtlarini boshqarish qiyin bo'lishi mumkin.

Mustaqil ta'lim olish jarayoni ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da, u bilan bog'liq qiyinchiliklar ham mavjud. Quyida eng asosiy muammolarni ko'rib chiqamiz:

Motivatsiya yetishmovchiligi. Mustaqil o'rganishda qat'iy nazorat yo'qligi sababli, talaba tezda dangasalik yoki sustkashlikka berilishi mumkin.

O'z-o'zini motivatsiya qilish qiyin bo'lishi mumkin. Tizimli reja tuzish muammosi sababli o'quv jarayonini to'g'ri tashkil qilish va samarali reja tuzish tajribasi bo'lmagan talabalar qiyinchiliklarga duch kelishadi. Vaqtni to'g'ri taqsimlamaslik natijasida ma'lumotlar chala yoki noto'g'ri o'zlashtirilishi mumkin.

O'quv mavzularini oz'lashtirishdagi tushunmovchiliklarni hal qilish qiyinligi sababli mustaqil ta'lim oluvchi inson murakkab mavzularni tushinishda qiynalishi mumkin. Savollar tug'ilganda ularga tezkor javob topish mushkul bo'ladi.

Axborotning haddan tashqari ko'pligi. Internet va kitoblarda juda ko'p ma'lumot mavjud bo'lgani sababli, muhimlarini ajratib olish qiyin. Ishonchsiz yoki sifatsiz manbalar bilan ishlash xavfi bor. Amaliyot yetishmovchiligi sababli nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin. Mustaqil ta'lim jarayonida laboratoriya, tajriba yoki muhokama elementlari yetishmaydi.

Yolg'izlik va muloqot etishmovchiligi. Jamoa yoki o'qituvchi bilan fikr almashish imkoni cheklangan bo'lgani uchun, bilim almashish jarayoni sust kechadi. Muammolarni muhokama qilish uchun mentor yoki murabbiy topish qiyin bo'lishi mumkin. Mustaqil ta'lim jarayonida yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun qanday yechimlar mavjud? Ushbu savolga quyidagi javoblarni keltirib o'tamiz:

Aniq reja tuzish – O'rganish jadvali tuzish va unga rioya qilish.

Kichik maqsadlar qo'yish – Yirik mavzularni bo'laklarga bo'lib o'rganish.

Ishonchli manbalar tanlash – Tanlangan materiallar sifati va ishonchliligini tekshirish.

Amaliy mashg'ulotlarni oshirish – O'rganilgan bilimlarni loyihalar yoki topshiriqlar orqali mustahkamlash.

O'quv hamjamiyatiga ya'ni qo'shilish – O'xshash qiziqishdagi odamlar bilan bog'lanish, kurslar yoki forumlardan foydalanish.

XULOSA

Kredit-modul tizimi va mustaqil ta'lim ta'lim jarayonida samarali ishlash uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi. Talabalar o'z-o'zini rivojlantirishga, ilmiy izlanishlar olib borishga, va o'z bilimlarini mustahkamlashga undaladi. O'qituvchining rahbarligi esa bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirishda katta rol o'ynaydi. Garchi bu tizimning ba'zi cheklovlari mavjud bo'lsa-da, umumiy holda, talabalarni o'z maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Takliflar. O'qituvchilarni kredit-modul tizimi va mustaqil ta'limni samarali tashkil etish bo'yicha maxsus kurslar orqali tayyorlash zarur.

1. Talabalar uchun samarali motivatsiya tizimi yaratish, ularni mustaqil ishlarni bajarishga rag'batlantiradi.

2. Talabalar uchun ta'lim resurslarini kengaytirish, ular o'z mustaqil ishlarini samarali bajarish uchun kerakli materiallarga ega bo'lishlari kerak.

3. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalar ishlarini doimiy ravishda nazorat qilib borish va ularning faoliyatini baholashning samarali tizimini joriy etish zarur.

Shu tarzda, kredit-modul tizimi va mustaqil ta'lim talabalarni ta'limda yanada mustahkam bilim olishga, o'z-o'zini rivojlantirishga va amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zaripov L., Xayitov N., Tohirov Z. Talabalar Mustaqil Ta'limini Tashkil Etish: Metodik Qo'llanma. - Toshkent, 2023. -163 B.
2. O'Rinov V., Sultonov M., Umarov A. O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'lim Tashkilotlarida Ects Kredit Modul Tizimi Asosiy Tushunchalar Va Qoidalar: O'Quv Qo'llanma. - Toshkent., Ma'naviyat, 2020. - 96 B.
3. Yo'ldashev Sh.I. Talabalarining Mustaqil Ta'limining Zamonaviy O'Quv Jarayonida Ahamiyati Va O'Rni: Uslubiy Qo'llanma. - Toshkent., O'Zmu, 2022.- 41b.
4. Karimova D.R. Kredit-Modul Tizimida Mustaqil Ta'lim: Uslubiy Qo'llanma. - Toshkent: Complex Print, 2021. - 126 B.
5. Tosheva R.D. Oliy Ta'lim Tizimida Mustaqil Ta'limning Ahamiyati: Yosh Tadqiqotchi Jurnal. Maqola. - Toshkent: 2023. - 157 B.
6. Toshmatov, G. U., & To'rabayeva, M. (2024). Talabaning Musiqiy Fanlardan Mustaqil Ta'lim Topshiriqlarini Bajarish Ko'nikmalarini Shakllantirish. Journal Of Universal Science Research, 2(11), 72-78.
7. Тошматов, Г., & Даминова, Г. (2022). Принципы Организации Самостоятельного Обучения В Кредитно-Модульной Системе. Общество И Инновации, 3(5/S), 50-57.
8. Olimjonovich, T. G. (2024). Development Of Knowledge Of Students Through Independent Study On The Basis Of A Systematic Approach. Web Of Scientists And Scholars: Journal Of Multidisciplinary Research, 2(11), 19-24.
9. Gaziyeu, J. J., & Toshmatov, G. O. (2021). Acts Credit Module System And Its Implementation Activities In Higher Educational Process. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(9), 467-472

YUNON-RIM KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLLANTIRSH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR

Tursunov Shuxrat Sabitjanovich

Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubi kafedrası p.f.b.f.d (PhD) v.v.b professori
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti O'zbekiston Chirchiq

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208848>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yunon-rim kurashchilarning texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish usullarini takomillashtirishdagi muammolar va ularni samarali hal etishga oid ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: o'rgatish bosqichlari, tayyorgarlik bosqichlari, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik.

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы совершенствования методики развития технико-тактической подготовки борцов греко-римского стиля и даются сведения об их эффективных решениях.

Ключевые слова: этапы обучения, этапы подготовки, техническая подготовка, тактическая подготовка.

PROBLEMS IN IMPROVING THE METHODS OF DEVELOPING THE TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF GRECO-ROMAN WRESTLERS

Annotation: This article describes the problems in improving the methods of developing the technical and tactical training of Greco-Roman wrestlers and information on their effective solution.

Keywords: training stages, training stages, technical training, tactical training.

KIRISH

Dunyo miqyosida yunon-rim kurashining tarixi uzoq o'tmish eramizdan avvalgi birinchi olimpiada o'yinlariga borib taqaladi, asrlar davomida sportning ushbu turi bo'yicha ko'plab rivojlangan davlatlarda yirik musobaqalar o'tkazib kelingan va u keng ommalashtirilgan. Yunon-rim kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarni tayyorlash tizimini zamon talablariga moslashtirish yuzasidan keng ko'lamlı ilmiy tadqiqotlar amalga oshirib kelinmoqda. Hozirgi kunda yunon-rim kurashi bilan dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida shug'ullanishadi, shuning uchun ham ushbu sport turini jahon miqyosida yanada rivojlantirish, yunon-rim kurashchilarini tayyorlash tizimini ilmiy asoslab berish muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Barcha sport turlarida kabi, yunon-rim kurashi sport turida ham sohani rivojlantirishning ilmiy, nazariy va uslubiy asoslari texnik-taktik tayyorgarlik komponentlariga bog'liq holda V.P.Filin, L.P.Matveev, L.P.Volkov, Yu.V.Veroxshanskiy, N.M. Galkovskiy, G.S.Tumanyan, Yu.F.Kuramshin, V.N.Platonov, M.A.Godik, J.K.Xolodov, V.S.Kuznesov, V.F.Boyko, G.V.Dankokabi yetakchi mutaxassis-olimlarning fundamental tadqiqotlarida yoritib berilgan. Bu borada mamlakatimizdagi va xorijdagi ko'plab olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan va bunday tadqiqotlar davom ettirilmoqda. Jumladan, jismoniy tarbiya va sport nazariyasi sohasidagi yetuk

olimlardan L.P.Matveev, V.N.Platonov, R.D.Xalmuxamedov, T.S.Usmanxodjaev, F.A.Kerimov, S.S.Tajibaev, N.A.Kerimov, N.A.Tastanovlar yuqori malakali sportchilarni nufuzli musobaqalarga tayyorlash muammolari yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borishgan. Kurash turlari bo'yicha mashg'ulotlarni rejalashtirish, tashkil qilish, yangi va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda kurashchilar sport mahoratini oshirish kabi masalalarga qaratilgan tadqiqotlarda N.A.Kerimov, F.A.Kerimov, A.K.Ataev, G.S.Tumanyan kabi olimlar nazariy va amaliy ahamiyatga ega natijalarga erishganlar. Lekin, sport mashg'ulotlarini tashkil qilishda barcha komponentlar singari kurashchining bir holati borki, bu, qulay fursat tug'ilishi bilan texnik-taktik tayyorgarlikni ishga solib raqib ustidan ustunlikka erishishdir. Ana shu tayyorgarlik holati ba'zida yuqori malakali sportchilarimizda yaxshi o'zlashtirilmaganligi sababli, ular nufuzli musobaqalarda mag'lubiyat alamini tortishmoqda. Shu boisdan, biz, aynan texnik-taktik tayyorgarlikni takomillashtirish muammosini bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri xamda katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi deb hisoblaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotga jalb etilgan qatnashuvchilar - yunon-rim kurashi guruhlarida ta'lim olayotgan o'quvchi yoshlar ikki guruhga bo'lindi. 1-guruh -kuzatuv guruhi (10 kishi), ushbu guruh tarkibiga kiruvchilar 2023-2024 o'quv yillarining sentabr-iyun oylarida quyida qayd etilgan sinov mashqlari yordamida nazoratdan (tekshiruvdan) o'tkazildi hamda kuzatuvning birinchi kunidan boshlab an'anaviy tarzda (Ixtisoslashgan olimpiya zahirolari maktab internati dasturiga binoan) o'tkaziladigan mashg'ulotlarda ishtirok etishni davom ettirishdi. 2-guruh-pedagogik tajriba guruhi (10 kishi) - bu guruh ham 1-guruh kabi tartibda parallel ravishda nazoratdan o'tkazildi.

Texnik–taktik mashqlarni bajarishda ekspress axborot uslubi va unda — CANON-34X video kamera vositasi qo'llanildi. Har bir mashqni bajarishda individual-guruhli uslub bilan asosiy va oddiy xatolar tuzatib borildi. Jismoniy mashqlar mashg'ulotning tayyorgarlik va asosiy qismlarida berildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA UNING SAMARADORLIGI

Sport kurash turlarida usullarni tasniflash tarixiy davrlar uchun o'kuv ishlarini tashkil qilishga xizmat qiladi. 1968 yilda darslikka kiritilgan tasniflash hozirgi davrga qadar xizmat qilib kelmoqda. 1972 yildagi darslik kitoblarda yunon-rim kurashining texnik holatlarini tasniflashda bizgacha bo'lgan mualliflar tomonidan tahlil qilingan usul va harakatlarni o'rganmasdan kurash turlarining hujum, raqib harakatlarga karshi mustaqil harakatlarni, parterda va tik turgan holatida kurash olib borish usullari va harakatlarini tasniflashga keng imkoniyat yaratilganligiga alohida to'xtalib o'tilgan.

Tadqiqotda kurash turlaridagi usul va harakatlarni ketma-ketlikda o'rganish uchun musobaqadagi aniq kurash harakatlarining ketma-ketligi tizimlashtirilib yangi usul va harakatlar kiritildi. Kiritilgan usullar oldingi qo'llanmalarda o'rganilganligini hisobga olinganligini yoritib o'tganlar. Qator mualliflar tomonidan kurashdagi tik turgan holatda o'tkaziladigan harakatlar yelkadan oshirib tashlash va undan himoyalalanish, unga qarshi usul ko'llash tasnifida o'rin olgan.

Boshqa nashrlardagi maanbalarga suyangan holda bir nechta mutaxassislar, o'quvchilar, murabbiylar uchun qo'llanmalar tayyorladilar tasniflash 4ta pog'onadan iborat bo'lib, kurashdagi texnik harakatlar quyidagicha joylashgan.

Birinchi daraja - kurash turlaridan parter holatidan texnik harakatlarni amalda bajarish.

Ikkinchi daraja - kurash musobaqasida harakatlar ballarda hisobga olinadigan usullardan tashkil topgan (holatni o'zgartirish, otish, yiqitish, aylantirib tashlash)

Uchinchi daraja - hujum qiluvchi kurashchining qo'llaydigan usul harakatlari: yonga engashib oldinga oshirib otish - tezlik bilan, aylantirish bilan, holatni o'zgartirib tashlash.

To'rtinchi daraja - guruhlariga tegishli usullari. Erkin kurashda -raqibning qo'li va gavdasini tortib o'rab olish, dzyudo kurashida - raqibning kimonosidan ushlash. 4 ta kurash turi uchun tuzilgan tasniflashda ularida foydalaniladigan lug'aviy so'zlar bir xilda qo'llaniladi.

Tasniflanishda muallif tomonidan yunon-rim (klassik) kurashining usul va harakatlari asos qilib olingan. Tasniflashda lug'aviy usullarning tahlili bo'lingan guruhlar orqali olib borilgan. Ya'ni tasniflanishning yutuqli tomonlaridan biri shundaki, unda hujum qiluvchi kurashchining texnik harakatlari texnik harakat asosi qilib olingan. Ma'lum texnik harakatlar asosida har bir usullar keng tahlil qilingan. Sambo va dzyudo kurashining umumiy tasnifiga qo'shilish to'g'ri yo'nalish hisoblanadi. Masalan, bunday yechim kurash turlari bo'yicha tuzilgan tasniflarda ularni guruhlashda usul va harakatlarni cheklaydigan kamchiliklarni bartaraf etishga, qo'llanib kelinayotgan oyoq bilan, qo'l bilan, gavdaning turli qismlari bilan harakatlanishlarning to'g'ri taqsimlanishiga asos bo'lgan. Shuning uchun ham oyoq bilan bajariladigan harakatlarni tasniflashda chalish, bir-birini itarish, uzoqlashtirish, raqibni to'xtatib qolish kabi usullar kurashda bir guruhni tashkil qilib, ular kurashchilarning holati, ya'ni qiya turish, burilish holatlari bilan bog'liqdir.

Nashr etilgan ko'plab adabiyotlardagi tasniflarning muvaffaqiyati yaqqol ko'rinib turibdi. Ushbu ko'lamga baho berish ilmiy-amaliy yondashuv orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu yondashuvning axamiyati kurashda harakat va usullar bo'yicha tuzilgan tasniflarning yagona tizimga keltirish imkonini beradi. Yagona tasnif va tizimdan turli kurash turlarida amaliy-nazariy darslarni o'tishda foydalanish mumkin, u;

- yosh sportchilarni shug'ullantirishda maxsus bilimni tez o'zlashtira olish imkonini beradi;
- kurash turlarida o'qitish o'rgatish va mashg'ulotlarning ilg'or usullarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini beradi;

Yunon-rim kurashi texnikasi – bu musobaqa qoidalarida ruxsat etiladigan usullar, qarshi usullar va himoyalanişlar yig'indisidir.

Usullar – bu maqsadga yo'naltirilgan hujum harakatlari bo'lib, ular yordamida kurashchi raqibidan ustunlikka erishadi. Har bir usul ikki qismdan iborat. Birinchi qism – usul qo'llash uchun ushlab olish. Ushlab olishlar yuqoridan, pastdan, orqadan, oldindan, yon tomondan va boshqa ushlab olishlarga bo'linadi. Ushlash usulni muvaffaqiyatli bajarishda katta ahamiyatga ega. Barcha usullarni bajarish sifati ushlab olishning qay darajada oqilona amalga oshirilganligiga bog'liq. Ikkinchi qismda turli xildagi harakatlar: tik turishda – o'tkazishlar, tashlashlar, ag'darishlar; parterda – o'girishlar va parterda tashlashlar bo'lishi mumkin.

Yunon-rim kurashida, erkin kurash, sambo, dzyudo va kurashdagidek, usullarni amalga oshirish paytida bir vaqtning o'zida oyoqlar bilan turli harakatlar ham bajarish, ya'ni chalishlar, qoqishlar, ilishlar, oldindan ilib otishlar, ushlashlar, orqadan ilib otish usullarini qo'llash mumkin emas.

Bir xildagi ushlash bilan bir qator harakatlarni bajarish mumkin va, aksincha, bir xil harakatning o'zi turli ushlashlar bilan bajarilishi mumkin. Masalan, qo'ldan va gavdadan ushlab tashlashni, zarba bilan ag'darishni amalga oshirish mumkin. Shuningdek, raqibni egilib, qo'l, gavda, qo'l va bo'yindan ushlab tashlash ham mumkin.

Kurashchi har qanday usulni hujum va qarshi hujum uchun qo'llashi mumkin. Usul yoki uning bir qismini aldamchi harakat sifatida qo'llab, kurashchi haqiqiy niyatidan raqib diqqatini

chalq'itish va boshqa usul bilan hujumni amalga oshirish uchun qulay sharoitlarni vujudga keltirib hujum qilishi mumkin.

Qarshi usullar – bu raqib hujumiga javob tariqasida bajariladigan maqsadli harakatlar bo'lib, ular yordamida kurashchi raqibi ustidan ustunlikka erishadi.

Qarshi usullar murakkab texnik harakatlarga kiradi. Qarshi hujum uyushtirayotgan kurashchi bir zumda to'g'ri qaror chiqarishi va raqibi usulni amalga oshirishga ulgurmasligi uchun o'z harakatlarini hujum qilayotgan raqib harakatlari bilan aniq moslashtirishi lozim.

XULOSA

Kurash turlarida usullarni tasniflash tarixiy davrlar uchun o'quv ishlarini tashkil qilishga xizmat qiladi. 1968 yilda darslikka kiritilgan tasniflash hozirgi davrga qadar xizmat qilib kelmoqda. 1972 yildagi darslik kitoblarda yunon-rim kurashining texnik holatlarini tasniflashda bizgacha bo'lgan mualliflar tomonidan tahlil qilingan usul va harakatlarni o'rganmasdan kurash turlarining hujum, raqib harakatlarga qarshi mustaqil harakatlarni, parterda va tik turgan holatida kurash olib borish usullari va harakatlarini tasniflashga keng imkoniyat yaratilganligiga alohida to'xtalib o'tilgan.

Boshqa nashrlardagi maanbalarga suyangan holda bir nechta mutaxassislar, o'quvchilar, murabbiylar uchun qo'llanmalar tayyorladilar tasniflash 4ta pog'onadan iborat bo'lib, kurashdagi texnik harakatlar quyidagicha joylashgan.

Birinchi daraja - kurash turlaridan parter holatidan texnik harakatlarni amalda bajarish.

Ikkinchi daraja - kurash musobaqasida harakatlar ballarda hisobga olinadigan usullardan tashkil topgan (holatni o'zgartirish, otish, yiqitish, aylantirib tashlash)

Uchinchi daraja - hujum qiluvchi kurashchining qo'llaydigan usul harakatlari: yonga engashib oldinga oshirib otish - tezlik bilan, aylantirish bilan, holatni o'zgartirib tashlash.

To'rtinchi daraja - guruhlariga tegishli usullari. Erkin kurashda -raqibning qo'li va gavdasini tortib o'rab olish, dzyudo kurashida - raqibning kimonosidan ushlash. 4 ta kurash turi uchun tuzilgan tasniflashda ularda foydalaniladigan lug'aviy so'zlar bir xilda qo'llaniladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Матвеев Л.П. - Дискусии о теории спортивной тренировки/ Л.П.Матвеев// Теория и практика физич.культуры. -1998.-Т/р7.-б.55-61.
2. Нуршин Ж.М., Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Ўзбекча миллий курашнинг кураши. Т., 1993.
3. Каримов М.А. Халмухаммедов Р.Д. Шамсематов И.Ю. Тажибаев С.С. – Боксчиларнинг спорт педагогик маҳоратини ошириш. Тошкент 2011 й. Ўқув қўлланма. 473 бет
4. Каримов У.Р., Ишмухамедов Т.Р. Совершенствование скоростно-силовой подготовки квалифицированных курашистов. Ж.: “Фан-спортга”, Т., 2015, № 2. 8-б.
5. Jiyanov O.M. Methods of Improving the Physical Fitness of Young Hand-to-Hand Fighters // Eurasian Journal of Sport Science 2023; 1(2): B-176-179. <https://ejss.uz/methods-of-improving-the-physical-fitness-of-young-hand-to-hand/>.
6. Jiyanov O.M. 11-12 yoshdagi qo'l jangi kurashchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus jismoniy tayyorgarlikning roli //Scientific Bulletin of NamSU- Научный вестник НамГУ-НамДУ ilmiy axborotnomasi–2023-yil_7-son. B-713-718.
7. Жиянов О.М. Бошланғич тайёргарлик босқичда ёш қўл жангчиларнинг ўқув машғулотларини режалаштириш// Fan – sportga №4/2023. B-50-52.

8. Jiyanov O.M. 10-12 yoshli qo‘l jangichilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholashga yangicha yondoshuvlar// “Gimnastika sport turlarini rivojlantirishni zamonaviy muammolari va istiqbollari” Xalqaro ilmiy - amaliy anjumani to‘plami. - Toshkent: 2024. B-283-285.
9. Jiyanov O.M. /Yosh qo‘l jangichilar maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda mashg‘ulot yuklamalarini nazorat qilish/.O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati kafedrasi“Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” ilmiy –amaliy anjuman 2024-yil 30-34 bet.

GANDBOLCHILARNING TEZKOR-KUCH TAYORGARLIGINI DIFFERENSIYALI YONDOSHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Xoldorov Sharof G'ulom o'g'li

O'zbekiston Finlandiya pedagogika institute Samarqand shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15162886>

Annotatsiya: Maqolada Pedagogik tadqiqot natijalari 14-16 yoshdagi gandbolchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda "differenssial yondashuv" dan foydalanish samaradorligi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi. 14-16 yoshdagi gandbolchilarni tayyorlashning yillik sikli jarayonida tezkorlik va kuchga yo'naltirilgan samarali mashqlar majmualari eksperimental ravishda sinovdan o'tkazildi. Old va orqa chiziq o'yinchilarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda o'quv-mashg'ulot jarayoniga "differenssial yondashuv" ning joriy etilishi hamda 14-16 yoshdagi gandbolchilarning o'yin harakatlarining samaradorligini, ularning musobaqalardagi chiqishlarining umumiy samaradorligini oshirish bo'yicha uslublar yoritilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, gandbol, tezkor-kuch sifati, o'rgatish vositalari va usullari.

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ИГРОКОВ С МЯЧОМ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

Аннотация: Результаты педагогического исследования в статье позволяют сделать вывод об эффективности использования "дифференциального подхода" в развитии скоростно-силовых качеств гандболистов 14-16 лет. В ходе годового цикла подготовки гандболистов 14-16 лет экспериментально испытывались эффективные комплексы упражнений, ориентированные на скорость и силу. Освещено внедрение "дифференцированного подхода" к учебно-тренировочному процессу в развитии скоростно-силовых качеств игроков передней и задней линии, а также методики повышения эффективности игровых действий гандболистов 14-16 лет, общей результативности их выступлений на соревнованиях.

Ключевые слова: физическая подготовка, гандбол, скоростно-силовые качества, средства и методы тренировки.

METHODOLOGY FOR IMPROVING THE SPEED-STRENGTH STABILITY OF THE INSIDE OF THE HANDBALL ON THE BASIS OF A DIFFERENTIAL APPROACH

Abstract: The results of pedagogical research in the article allow us to draw conclusions about the effectiveness of the use of a "differential approach" in the development of fast-strength qualities of handball players aged 14-16 years. In the process of the annual cycle of training handball players aged 14-16, effective exercise complexes aimed at speed and strength were experimentally tested. The introduction of a "differential approach" to the training process in the development of speed-strength qualities of front and back line players and methods for improving the effectiveness of Game movements of handball players aged 14-16, the overall effectiveness of their performances in competitions are covered.

Keywords: physical fitness, handball, fast-strength quality, training tools and methods.

KIRISH

Jismoniy tarbiya tizimida yosh avlodning har tomonlama jismoniy rivojlanishi, axloqiy va estetik tarbiyasiga hissa qo'shadigan sport o'yinlari muhim amaliy o'rin egasidir. Bunday o'yinlardan biri g'andboldir. Bu tabiiy harakatlarni birlashtirgan chiroqli va shug'ullanuvchilik o'yini: yugurish, sakrash, uloqtirish orqali harakatlar kombinatsiyalarini integratsiya qilish. To'p uchun kurashda raqib bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish sharoitida o'yin faoliyatining yuqori sur'ati hamda to'satdan paydo bo'lgan o'yin vaziyatlarida mukammal harakat qilish qobiliyati, o'yin texnikasini bajarishda o'ta aniqlik, yuqori hissiyot va uning boshqa xususiyatlari sportchining jismoniy rivojlanishi, funksional va aqliy faoliyatiga katta talablarni qo'yishda.

Jahonda g'andbol o'yini juda yuqori professionallik, maksimal tezkorlikda bajariladigan texnik-taktik harakatlarning xilma-xilligi, o'yinchilarning o'ynashi va bir-birini almashtirishi bilan ajralib turadi. Gandbolchilarda o'yin samaradorligiga erishish yo'li samarali o'qitish vositalari va usullaridan foydalanish funksional xususiyatlari bilan bog'liq doimiy ravishda tuzatishlar kiritiladigan oqilona tayyorgarlik tizimi orqali amalga oshirilmoqda. Shug'ullanuvchilarda jismoniy rivojlanish va tezkor-kuch sifatlaridagi yoshga bog'liq o'zgarishlarning dinamikasi mos kelmaydi. Jismoniy va funksional rivojlanish ko'rsatkichlarining 19-20 yilgacha uzluksiz o'sishi bilan 14-16 yoshdagi shug'ullanuvchilarda tezkorlik va tezkor-kuch sifatlarining pasayishi kuzatiladi. Shu munosabat bilan katta maktab yoshidagi shug'ullanuvchilarda tezkorlik va tezkor-kuch sifatlarini maqsadli rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. So'nggi yillarda g'andbolchilarni tayyorlash tizimida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi, bu birinchi navbatda o'quv va raqobat jarayonining tuzilishini o'zgartirishda, unga ilmiy asoslangan ish usullarini kiritishda namoyon bo'ldi.

ASOSIY QISM

14-16 yoshdagi g'andbolchilarning o'quv va musobaqa faoliyatida differensial usullarni qo'llashning tashkiliy-uslubiy asoslari tashkil etadi.

Tadqiqotning usullari. **Tadqiqotda ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish, so'rovnomalar, antropometriya, goniometriya, mashg'ulot jarayonining tahlili, somatoskopiya, pedagogik testlash, pedagogik tajriba, pedagogik kuzatuvlar, pulsometriya, matematik-statistika usullaridan foydalanilgan.**

Tadqiqotning maqsadi voleybolchilarning jismoniy fazilatlarini tarbiyalashning samarali metodologiyasining xususiyatlarini aniqlashdir.

Vazifalarni hal qilish uchun quyidagi usullardan foydalanilgan: ilmiy va uslubiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish; mavjud amaliyotning pedagogik tajribasini umumlashtirish; pedagogik tajriba; pedagogik kuzatuvlar; pedagogik nazorat sinovlari (testlar); matematik statistika usullari. Pedagogik tadqiqot bosqichida qo'llaniladigan umumiy va maxsus jismoniy marosimlarni o'qitishning tavsiya etilgan metodologiyasi tezlik qobiliyatlari, sakrash qobiliyati, tezlikka chidamlilik, kuch qobiliyatiga nisbatan samarali bo'ldi.

Voleybol sportchilarining tayyorgarligini boshqarish bo'yicha asosiy nazariy va amaliy masalalarni bilish o'quv mashg'ulotlarini yanada oqilona qurishga yordam beradi. Jismoniy qobiliyatlarning sifati va rivojlanish darajasi mashg'ulotlarning dastlabki bosqichlarida ham, sportni takomillashtirish bosqichida ham katta rol o'ynaydi [4]. Shuning uchun ularni takomillashtirish imkoniyati, boshqa tayyorgarlik turlari bilan bir qatorda, raqobatbardosh faoliyatda yuqori natijalarga erishishda katta rol o'ynaydi [2,6].

Tadqiqot ob'ekti voleybol sportchilarining jismoniy tayyorgarligi. Mavzu: voleybolchilarning jismoniy fazilatlarini tarbiyalash xususiyatlari.

Tadqiqotning maqsadi tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda “differentsial yondashuv” ni qo'llash asosida yosh gandbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish.

Tadqiqot gipotezasi: -ixtisoslashuv bosqichida gandbolchilarni tayyorlashning yillik siklida ishlab chiqilgan tezkor-kuch vositalarini taqsimlash rejasi asosida “differentsial yondashuv” metodidan foydalanish 14-16 yoshdagi gandbolchilarning tezkor-kuch xarakteridagi ko'rsatkichlar natijadorligini oshirish.

Tadqiqotning vazifalari yosh gandbolchilarni tezkor kuch sifatlarini tayyorlashning maxsus pozitsiyalarini ishlab chiqish

-bir yillik sikl doirasida 14-16 yoshdagi gandbolchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish

gandbolda barcha turdagi mashg'ulotlar mavjud, ammo ularning nisbati va eng muhimi, rasmlari sezilarli darajada farq qiladi (3-jadval). Umumiy jismoniy va texnik tayyorgarlik pasayish tendentsiyasiga ega. Maxsus jismoniy, taktik va musobaqa yuklamalarning ulushi doimiy ravishda oshib bormoqda.

3-jadval. Turli bosqichlarda barcha turdagi tayyorgarliklarning nisbati

Tayyorgarlik turi	Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlari		
	dastlabki tayyorgarlik	boshlang'ich ixtisoslashuv	chuqur ixtisoslashuv
UJT	25	21	18
MJT	16	18	19
Texnik	21	20	17
Taktik	15	16	16
O'yin	17	16	18
Musobaqalar	6	9	12
Jami:	100%	100%	100%


Barcha bosqichlarda turli yo'nalishdagi yuklamalarni taqsimlashga umumiy yondashuv jismoniy tayyorgarlik (umumiy va maxsus), texnik-taktik (texnik va taktik) va o'yin (mashg'ulotlarda o'yin, nazorat va taqvim o'yinlari) uchun ajratilgan soatlar sonining taxminiy tengligidan iborat. Biroq, bosqichdan bosqichga umumiy jismoniy tayyorgarlikning pasayishi bilan maxsus jismoniy tayyorgarlikning qiymati oshadi (4-jadval).

Xuddi shu rasm texnik va taktik tayyorgarlik nisbatlarida kuzatiladi. O'yin musobaqa yuklamasi o'quv jarayonida o'tkaziladigan o'yin mashg'ulotlariga qarshi doimiy ravishda o'sib boradi.


O'rtacha koeffitsient bilan ($P < 0.05$), qo'llarsiz uzunlikka sakrash va masofaga 1 kg to'ldirma to'pni tashlash kabi testlardagi natijalar farq qiladi.

Orqa hujum chizig'i o'yinchilarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda ishlatiladigan mashqlar: Tezlikda, 30 dan 40 m gacha bo'lgan segmentlarda turli pozitsiyalardan (o'tirish, turish, yotish) yuz, yon va orqa tomondan oldinga siljish. Qadamlarning maksimal chastotasi bilan joyida va harakatlanishda yugurish. Vizual ravishda sezilgan signallar bo'yicha jerklar: sherikni ta'qib qilish, to'pni o'zlashtirish uchun sherik bilan musobaqalashish, uni ushlash vazifasi bilan uchib

ketayotgan to'p uchun. Rahbarning orqasida o'zgarmasdan va yo'nalishni o'zgartirmasdan yugurish (zigzag, yuz va orqa oldinga, mokusimon yugurish, burilish bilan). Masofaning oxirida, o'rtasida, boshida sakrash bilan qisqa segmentlarga yugurish. Chuqurlikka sakrash, so'ngra yuqoriga sakrash (yakka, ketma-ket). Bir necha marta oyoqdan oyoqqa sakrash (ma'lum miqdordagi sakrashlar uchun; ma'lum bir segmentda 10 dan 50 m gacha bo'lgan sakrashlar soni uchun).



Bir oyoqli sakrash joyida va harakatda tortinmasdan va itaruvchi oyoqning kestirib, tortib olish bilan. Yon tomonga sakrash (yakka va ketma-ket) joyida "truba" orqali va oldinga, orqaga qarab. Og'irliklar bilan yugurish va sakrash (kamar, pastki oyoq manjetlari, dori to'plari). Gandbolchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda eksperimental ma'lumotlar asosida ishlab chiqilgan "differentsial yondashuv" dan maqsadli foydalanish o'yin jarayonini o'yinchilarga xos bo'lgan tezkor-kuch ko'rsatkichlarini oshirish nuqtai nazaridan optimallashtirishga imkon beradi. Oldingi va orqa chiziq ularning tayyorgarligi va o'yin vazifalarining o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq.



8-rasm. Orqa chiziqdan eksperimental guruhi gandbolchilarining tezkor-kuch tayyorgarligi ko'rsatkichlarining nisbati.

Shartli belgilar:

- 1-qator-tadqiqotdan oldin;
- 2-qator-tadqiqotdan keyin;
- 1. Yugurish 30 m (sek)
- 2. Uzunlikka sakrash (sm)
- 3. Uch hatlab sakrash (sm)
- 4. 15 soniyada surish (bir marta)
- 5. To'ldirma to'p otish 1kg (m)
- 6. 1 kg to'ldirma to'p ni ikki (m)o'tirgan holda uloqtirish
- 7. To'ldirma to'p ni otish kg o'tirgan ikki (m)
- 8. To'ldirma to'p ni otish kg ikki marta orqaga o'tirish (m)
- 9. Tez yugurish 6m (sek)

O'tirgan holda kg to'ldirma to'pni uloqtirish va ikki qo'l bilan orqaga o'tirgan holda 3 kg to'ldirma to'pni uloqtirish aniq farqlarga ega emas.

10-jadvalda nazorat guruhining orqa chizig'i o'yinchilaridagi tezkor-kuch tayyorgarligi ko'rsatkichlari va ularning farqlarining ishonchliligi ko'rsatilgan va 10-rasmda ularning nisbati ko'rsatilgan.

Nazorat guruhining orqa chizig'idagi gandbolchilarning tezkor-kuch tayyorgarligi barcha ko'rsatkichlarda farq qiladi. Uchta ko'rsatkich bo'yicha (30 metr yugurish, joydan uzunlikka sakrash, uch hatlab sakrash) farq sezilarli ($P<0.001$) va ikkitasida (15 soniyada surish (bir marta), 1 kg to'ldirma to'pni ikki qo'li bilan bir qatorda uloqtirish) u kamroq ahamiyatga ega ($P<0.005$). O'yinchilarda ahamiyatlilik koeffitsiyenti ($P<0.01$) bilan natijalarning kamroq o'sishi 1 kg to'ldirma to'pni masofaga uloqtirishda va 3 kg to'ldirma to'pni ikki qo'l bilan orqaga uloqtirishda portlovchi kuchni ko'rsatadigan testlarda kuzatiladi. Ikki qo'l bilan o'tirgan 3 kg to'ldirma to'pni otish testlaridagi farqlarning -ishonchliligi va qo'llarsiz uzunlikka sakrash ($P<0.05$). 6 metr Tez yugurish testida ishonchli farqlar yo'q.

XULOSA

Pedagogik tadqiqot natijalari 14-16 yoshdagi gandbolchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda "differenssial yondashuv" dan foydalanish samaradorligi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi. 14-16 yoshdagi gandbolchilarni tayyorlashning yillik sikli jarayonida tezkorlik va kuchga yo'naltirilgan samarali mashqlar majmualari eksperimental ravishda sinovdan o'tkazildi. Old va orqa chiziq o'yinchilarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda o'quv-mashg'ulot jarayoniga "differenssial yondashuv" ning joriy etilishi 14-16 yoshdagi gandbolchilarning o'yin harakatlarining samaradorligini, ularning musobaqalardagi chiqishlarining umumiy samaradorligini oshirishga yordam berdi.

ADABIYOTLAR

1. Айрапетьянц Л. Р., Годик М. А. Спортивные игры. - Ташкент: Изд-во имени ибн Сины, 1991. - 160 с.
2. Akramov J.A, Gandbol: JTI uchun darslik, T. 2 2. Ignateva V.YA. Gandbol: Uchebnik dlya IFK, M.- FiS, 1982. – 380s.
3. Pavlov SH.K, Abduraxmanov F.A, Raxmanova M.M. —Gandboll- o'quv qo'llanma, 2010y, 32-45b.

4. Pavlov SH.K, Azizova R.I, Gandbol – BO‘SMlar uchun dastur. 2009 y 5. Pavlov SH.K, Abduraxmanov F.A, Podgotovka gandbolistov – UzGIFK T.: 2006y, 299s.
5. Pavlov SH.K, Abduraxmanov F.A, Akramov J.A, Gandbol: JTI uchun darslik, 2005 y, 80-91b.Беляев А. В. Исследование тренировочных и соревновательных нагрузок в волейболе: Автореф. дис. ...канд.пед.наук. -М., 1974. -28 с.
6. Abduraxmanov F.A, Lemeshkov V.A, Livitskiy A.N, Pavlov SH.K, YArotskiy YA.I —Podgotovka gandbolistov|| Toshkent – 1992. iz. Otd. UzGIFK.
7. Ignateva V.YA., Petracheva I.V. Mnogoletnyaya podgotovka gandbolistov v DYUSSH. M: Sovetskiy sport 2023
8. Ignateva V.YA., Portov YU.M., Gandbol: Uchebnik dlya fizkulturnykh vuzov. M. Fon, 1996 10. Ignateva V.YA. Gandbol. Azbuka sporta. –M: FiS, 2001
9. Ignateva V.YA., Petracheva I.V., Gusev A.V. Napravlennost podgotovki gandbolnykh vratarey-jenšin-M: Soyuz gandbolistov Rossii 2001
10. Akramov J.A., Bolalar va o‘smirlar sporti mashg‘ulotlari nazariyasi va uslubi. T., “Ilm ziyo”. 2006. -158b
11. [Gulhayo Kholboevna Kholboeva](#) Mechanisms of improving the motor activity of children aged 6-7 years through initial gymnastics classes. Published 2021.Education, Medicine
12. Kholboeva Gulhayo Kholboevna. Increasing the potential of training specialists in physical culture for a modern market economy. Pages: #29pp 122-125
13. Kholboeva Gulhayo Kholboevna. Jismoniy madaniyat mutaxassislarini kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini modernizatsiyalash. Fan sportga. Ilmiy-nazariy jurnali 2024. 4-son

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-МАТЕМАТИКОВ В ВУЗАХ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛАХ

Г.Г. Тожиакбарова

Андижанский государственный педагогический институт, Узбекистан, г. Андижан

E-mail: gtoziakbarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208821>

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема модернизации подготовки педагогов-математиков в высших учебных заведениях. Основное внимание уделяется внедрению современных методик обучения и цифровых технологий, направленных на повышение качества преподавания математики в школах. Проанализированы основные подходы к организации образовательного процесса, включающие интеграцию цифровых инструментов, развитие навыков использования интерактивных платформ и адаптацию традиционных методов преподавания к новым условиям. Предлагают практические рекомендации по совершенствованию образовательных программ для подготовки педагогов-математиков, подчеркивая важность формирования у будущих учителей компетенций, необходимых для работы в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: подготовка педагогов-математиков, цифровые технологии, современные методики, качество образования, математическая грамотность.

MODERNIZING THE TRAINING OF MATHEMATICS TEACHERS IN UNIVERSITIES THROUGH THE IMPLEMENTATION OF MODERN METHODOLOGIES AND DIGITAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY OF MATHEMATICS TEACHING IN SCHOOLS.

G.G. Tojiakbarova

Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

E-mail: gtoziakbarova@gmail.com

Abstract: The article addresses the pressing issue of modernizing the training of mathematics teachers in higher education institutions. The focus is on the implementation of modern teaching methods and digital technologies aimed at improving the quality of mathematics instruction in schools. Key approaches to organizing the educational process are analyzed, including the integration of digital tools, the development of skills for using interactive platforms, and the adaptation of traditional teaching methods to new conditions. Practical recommendations are offered for improving educational programs for training mathematics teachers, emphasizing the importance of equipping future educators with the competencies necessary for working in a digital educational environment.

Keywords: mathematics teacher training, digital technologies, modern methodologies, quality of education, mathematical literacy.

ВВЕДЕНИЕ

Современные вызовы системы образования требуют кардинальных изменений в подходах к подготовке педагогов, особенно в таких фундаментальных дисциплинах, как математика. В условиях цифровизации и изменения требований государственных

образовательных стандартов (ГОС), возникает необходимость разработки новых подходов к обучению будущих педагогов-математиков, способных эффективно адаптироваться к вызовам времени. Данная статья рассматривает актуальные направления модернизации подготовки педагогов-математиков в вузах, основанные на внедрении современных методик и технологий.

Кроме того, в условиях глобализации и внедрения новых технологий важно учитывать международный опыт подготовки педагогов-математиков. Сравнительный анализ образовательных систем различных стран, таких как Финляндия, Сингапур и Южная Корея, показывает, что успех в преподавании математики достигается за счет интеграции традиционных и инновационных подходов, а также постоянного профессионального развития педагогов [1].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одним из ключевых вызовов современного образования является необходимость индивидуализации обучения. Педагоги-математики должны уметь адаптировать учебный процесс под потребности различных групп школьников: одаренных, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также учеников с низкой учебной мотивацией. Это требует использования гибких методик, опирающихся на цифровые ресурсы и интерактивные формы обучения.

Еще одним важным вызовом является необходимость соответствия преподавания математике требованиям современного рынка труда. Многие профессии требуют развитого аналитического и логического мышления, которое формируется в процессе изучения математики. Педагоги должны уметь формировать у школьников не только знания, но и навыки, применимые в реальной жизни, включая решение практических задач и использование математического аппарата в междисциплинарных исследованиях.

Согласно исследованиям, использование технологий визуализации и симуляций способствует лучшему пониманию сложных математических концепций [2]. Такие инструменты, как системы компьютерной алгебры, доказали свою эффективность в развитии математического мышления у школьников [3].

Цифровизация образовательного процесса открывает новые возможности для подготовки педагогов. В вузах внедряются онлайн-курсы, интерактивные тренажеры и платформы для совместной работы, такие как Google Classroom и Moodle. Эти ресурсы позволяют студентам не только осваивать теоретический материал, но и на практике развивать навыки проектирования учебного процесса с использованием цифровых инструментов.

Например, использование платформы GeoGebra в педагогической практике демонстрирует, как цифровые инструменты могут улучшить преподавание геометрии и алгебры, делая их более доступными для учеников [4].

Современные образовательные программы все больше ориентируются на практическую подготовку будущих педагогов. Студенты вовлекаются в проектную деятельность, где разрабатывают и апробируют собственные методические разработки. Кроме того, практика в школах позволяет будущим учителям получить реальный опыт работы с учащимися различных возрастных категорий.

Исследования показывают, что педагоги, прошедшие многопрофильную практическую подготовку, значительно успешнее адаптируются к профессиональной деятельности [5].

Эффективная подготовка педагогов-математиков невозможна без обновления квалификации преподавателей самих вузов. Регулярные курсы повышения квалификации, семинары и стажировки позволяют преподавателям вузов внедрять современные методики обучения, актуальные цифровые ресурсы и инновационные образовательные подходы.

Например, программы повышения квалификации, включающие модули по работе с BIGdata и искусственным интеллектом, позволяют преподавателям обновлять содержание своих курсов и готовить педагогов, соответствующих современным требованиям [6].

Важной задачей модернизации педагогического образования является изучение и адаптация международного опыта. Например, в Финляндии акцент делается на индивидуальный подход к обучению и значительное количество практики, а в Сингапуре широко используются инновационные технологии и проектные методики. Такие подходы можно успешно интегрировать в образовательные программы российских вузов, адаптировав их под национальные особенности.

Международные стажировки для студентов и преподавателей вузов также способствуют обмену опытом и внедрению передовых практик в подготовку педагогов. Например, программы академической мобильности Erasmus+ позволяют вузам развивать партнерства и повышать квалификацию сотрудников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модернизация подготовки педагогов-математиков является ключевым элементом в повышении качества преподавания математики в школах. Внедрение цифровых технологий, актуальных методик обучения и практико-ориентированного подхода формирует у будущих учителей необходимые профессиональные компетенции. Комплексный подход к обучению педагогов-математиков позволит не только решить задачи, поставленные современным обществом, но и создать условия для дальнейшего развития системы образования в целом.

Внедрение указанных подходов требует систематической работы, направленной на обновление учебных планов, развитие инфраструктуры вузов и создание условий для профессионального роста педагогов. Только таким образом можно обеспечить долгосрочное повышение качества преподавания математики и соответствие системы образования запросам общества и экономики.

Список литературы

1. Смирнова И.В. Международные подходы к подготовке педагогов. – Казань, 2020.
2. Иванов А.А., Петров Б.В. Использование технологий визуализации в преподавании математики. – М., 2020.
3. Петров В.И. Системы компьютерной алгебры в образовательной практике. – Новосибирск, 2021.
4. Сидорова Е.Н. Интеграция цифровых инструментов в обучение математике. – СПб., 2022.
5. Кузнецова Т.П. Практическая подготовка будущих педагогов. – Екатеринбург, 2019.
6. Brown J., Smith A. Effective Mathematics Teaching Practices: Global Perspectives. – London, 2021.

РАЗРАБОТКА И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ- ЮНИОРОВ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВЕСОВЫХ ГРУПП

Джуманов Бахытжан Мухтарович

Доцент, Негосударственное учреждение высшего образования “Alfraganus university”, г.Ташкент, Узбекиста. Кафедра «Спортивной деятельности»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15161064>

Аннотация: В статье рассматривается методика оптимизации технико-тактической подготовки дзюдоистов-юниоров с учетом особенностей различных весовых категорий. Проанализированы ключевые аспекты тактической дифференциации, разработана программа подготовки, учитывающая антропометрические и функциональные характеристики спортсменов. Представленные рекомендации могут быть использованы в практике тренеров для повышения эффективности подготовки юниоров..

Ключевые слова: дзюдо, юниоры, весовые категории, технико-тактическая подготовка, оптимизация, методика тренировки.

DEVELOPMENT AND CONTENT OF THE METHODOLOGY FOR OPTIMIZING TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF JUNIOR JUDOKAS BASED ON THE DIFFERENTIATION OF WEIGHT GROUPS

Abstract: The article discusses the methodology for optimizing the technical and tactical training of junior judoka, taking into account the characteristics of various weight categories. The key aspects of tactical differentiation are analyzed, and a training program has been developed that takes into account the anthropometric and functional characteristics of athletes. The presented recommendations can be used in the practice of coaches to improve the effectiveness of junior training.

Keywords: judo, juniors, weight categories, technical and tactical training, optimization, training methods.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявленные на первом этапе исследования особенности процесса технико-тактической подготовки дзюдоистов на этапе совершенствования спортивного мастерства в аспекте разделения по весовым группам, позволили установить приоритетные пути разработки экспериментальной методики подготовки атлетов на основе целенаправленного выбора и реализации средств, методов, тренировочных режимов в соответствии с весовой группой борцов.

Необходимо отметить, что разработка экспериментальной программы базировалась, в первую очередь, на содержании важнейшей педагогической закономерности любого учебно-воспитательного процесса в виде принципа индивидуального и дифференцированного подхода к занимающимся, что требует от педагога организации воздействий с учетом особенностей и различий их личности[70]. Вместе с тем, были учтены требования специфических принципов, присущих сфере теории и методики спортивной тренировки: принципа максимизации и углубленной индивидуализированной специализации [54], принципа углубленной специализации и направленности к высшим достижениям [46], принципа единства и взаимосвязи структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленности [63].

Анализ показателей соревновательной деятельности, специальной физической и технико-тактической подготовленности дзюдоистов-юниоров дал основание разработать методику дифференцирования средств технико-тактической подготовки дзюдоистов-юниоров разных весовых групп.

Методика дифференцирования средств технико-тактической подготовки дзюдоистов-юниоров разных весовых групп предусматривает следующую последовательность действий: разделение дзюдоистов-юниоров на весовые группы; разработка общего тренировочного плана; корректировка содержания тренировочных планов в зависимости от особенностей дифференцированного применения арсенала технических действий дзюдоистами разных весовых групп; разработка тренировочных заданий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовленности дзюдоистов разных весовых групп; реализация тренировочных планов по микроцикле и мезоцикле подготовки; контроль эффективности тренировочного процесса и коррекция подготовки в случае несоответствия фактического тренировочного эффекта с запланированным.

Распределение дзюдоистов-юниоров на весовые группы осуществлялось на основании весовых категорий, в которых спортсмены выступают на соревнованиях. Было сформировано три весовые группы: «легковесы», «средневесы», «тяжеловесы». В группу «легковесы» вошли борцы весовых категорий 55, 60 кг и 66 кг. Группу «средневесы» составили борцы весовых категорий 73 кг и 81 кг. В группу «тяжеловесы» вошли борцы весовых категорий 90 кг, 100 кг, и +100 кг.

Общий тренировочный план строился на основе поставленной цели и конкретных задач подготовки дзюдоистов-юниоров разных весовых групп, а также информации о контрольных, отборочных и главных соревнованиях спортивного сезона. Исходя из этого, подбирались и разрабатывались специальные упражнения и тренировочные задания, направленные на повышение технико-тактической подготовленности дзюдоистов разных весовых групп. Тренировочный план включал количество и сроки проведения микроциклов, мезоциклов в макроцикле спортивной подготовки.

Содержание тренировочных планов разрабатывалось на основании связи между весовыми группами спортсменов и показателями специальной физической и технико-тактической подготовленности, а также критериями соревновательной деятельности дзюдоистов разных весовых групп.

При разработке дифференцированных тренировочных заданий, направленных на совершенствование технико-тактической подготовленности дзюдоистов-юниоров разных весовых групп, учитывалось следующее:

- *дзюдоистам-легковесам* было рекомендовано совершенствовать технику приемов борьбы в комбинациях, используя следующие технические действия: боковая подсечка, передняя подсечка, посадка, бросок через спину с колен, подсечка изнутри, зацеп изнутри, бросок через голову.

- *дзюдоистам- средневесам* - повышать свое технико-тактическое мастерство, применяя комбинации из следующих приемов: подхват под одну ногу, бросок через грудь, бросок через бедро, бросок через спину со стойки, передняя подножка, зацеп изнутри.

- для повышения технико-тактической подготовленности *дзюдоистам тяжелых весовых категорий* рекомендовано использовать следующие сочетания технических

действий: бросок захватом руки под плечо, бросок через бедро, задняя подножка, передняя подножка, подхват (под одну и под две ноги).

Совершенствование техники коронных приемов дзюдоистов разных весовых групп в условиях учебно-тренировочных схваток выполнялось при помощи следующих тренировочных заданий:

- борьба на захватах;
- борьба на контрприемах;
- борьба с «соперником-правостоечником»;
- борьба с «соперником-левостоечником»;
- борьба с акцентом на партер.

Весь подготовительный процесс (экспериментальный период) длился в течении трех месяцев и представлял собой один из мезоциклов тренировочного года.

Контроль эффективности подготовки осуществлялся при помощи наблюдения (мониторинга) за основными параметрами специальной физической и технико-тактической подготовленности спортсменов, что позволяло производить оперативную коррекцию содержания тренировочного плана по параметрам объема и интенсивности тренировочной нагрузки в том случае, если фактический результат подготовленности дзюдоистов разных весовых групп не совпадал с запланированным.

Таким образом, на основании разделения дзюдоистов-юниоров на разные весовые группы и выявления у них особенностей в технико-тактической подготовленности и соревновательной деятельности, апробировалась методика технико-тактической подготовки дзюдоистов-юниоров с учетом приемов, преимущественное выполнение которых характерно для каждой весовой группы.

Анализ эффективности экспериментальной методики развития средств технико-тактической подготовки дзюдоистов-юниоров

Определение эффективности экспериментальной методики осуществлялось по показателям специальной физической подготовленности (СФП) и технико-тактической подготовленности (ТТП).

По истечению срока эксперимента были отмечены изменения результатов тестирования показателей СФП дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп, которые представлены в таблице 1

Таблица 1. Показатели специальной физической подготовленности дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента

Показатели		Весовая группа	До exper. $X \pm \sigma$	После exper. $X \pm \sigma$	p
Броски манекена за 30 секунд (количество раз)	КГ	«Легковесы»	9,5±1,2	10,1±1,1	p>0,05
		«Средневесы»	10,1±1,7	11±1,0	p>0,05
		«Тяжеловесы»	7,7±1,3	8,1±0,4	p>0,05
	ЭГ	«Легковесы»	9,9±1,3	15,79±1,7	p<0,05
		«Средневесы»	10,2±1,6	15,13±1,3	p<0,05
		«Тяжеловесы»	7,4±1,1	12,7±0,73	p<0,05
Броски	КГ	«Легковесы»	23,9 ±1,4	25,9 ±1,9	p<0,05

манекена за 3 минуты (количество раз)	ЭГ	«Средневесы»	27,5±2,0	28,2±1,0	p>0,05
		«Тяжеловесы»	21,4±1,5	21,7±2,0	p>0,05
		«Легковесы»	25,1±1,8	31,57±1,9	p<0,05
		«Средневесы»	27,0±1,6	32,1±1,3	p<0,05
		«Тяжеловесы»	21,7±2,0	22,3±1,4	p<0,05
Непрерывное выполнение учи-коми 30 раз (секунды)	КГ	«Легковесы»	22,6±1,1	22,1±1,0	p>0,05
		«Средневесы»	23,3±1,5	22,4±1,3	p>0,05
		«Тяжеловесы»	27,6±2,1	28,0±1,0	p>0,05
	ЭГ	«Легковесы»	22,4±1,4	19,6±1,2	p<0,05
		«Средневесы»	23,2±1,3	21,8±1,4	p<0,05
		«Тяжеловесы»	27±2,0	25,6±1,3	p>0,05

Показатели СФП контрольной группы статистически достоверно увеличились в тестах ($p<0,05$): «броски манекена за 30 с.» («легковесы»). Изменения остальных результатов в показателях СФП оказались статистически недостоверными ($p>0,05$).

В экспериментальной группе показатели СФП имеют положительные статистически достоверные изменения ($p<0,05$) во всех тестовых испытаниях: «броски манекена за 30 с.», «броски манекена за 3 мин.», «непрерывное выполнение учи-коми 30 раз».

Таким образом, основываясь на результатах, полученных в ходе анализа изменений показателей специальной физической подготовленности дзюдоистов разных весовых групп, входящих в состав контрольной и экспериментальной групп, необходимо отметить, что по истечении педагогического эксперимента в обеих группах были отмечены сдвиги в показателях СФП. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что у «легковесов», «средневесов» и «тяжеловесов» экспериментальной группы наблюдается значительное статистически достоверное преимущество ($p<0,05$) по сравнению с борцами контрольной группы, представляющих такие же весовые группы. В частности, относительный прирост результатов у спортсменов экспериментальной группы в целом превышает прирост результатов контрольной группы, что представлено сравнительным анализом показателей СФП обеих групп в таблице 2

Таблица 2. Сравнительный анализ специальной физической подготовленности дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп после эксперимента

Показатели	Весовая группа	КГ $\bar{X} \pm \sigma$	ЭГ $\bar{X} \pm \sigma$	p
Броски манекена за 30 секунд (количество раз)	«Легковесы»	10,1±1,1	9,5±1,2	p<0,05
	«Средневесы»	11±1,0	10,1±1,7	p<0,05
	«Тяжеловесы»	8,1±0,4	7,7±1,3	p<0,05
Броски манекена за 3 минуты (количество раз)	«Легковесы»	25,9 ±1,9	31,57±1,9	p<0,05
	«Средневесы»	28,2±1,0	32,1±1,3	p<0,05
	«Тяжеловесы»	21,7±2,0	22,3±1,4	p<0,05
Непрерывное выполнение учи- коми 30 раз (с)	«Легковесы»	22,1±1,0	19,6±1,2	p<0,05
	«Средневесы»	22,4±1,3	21,8±1,4	p>0,05
	«Тяжеловесы»	28,0±1,0	25,6±1,3	p<0,05

В таблице 3 представлены изменения показателей технико-тактической подготовленности дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп после обработки результатов педагогического эксперимента.

Таблица 3. Показатели технико-тактической подготовленности дзюдоистов контрольной и экспериментальной группы до и после эксперимента

Показатели		Весовая группа	До exper. $\bar{X} \pm \sigma$	После exper. $\bar{X} \pm \sigma$	p
Активность (А), кол-во атак в минуту	КГ	«Легковесы»	2,6±0,7	3,0±1,1	p>0,05
		«Средневесы»	2,8±0,7	3,1±0,7	p>0,05
		«Тяжеловесы»	2,2±0,8	2,5±1,2	p>0,05
	ЭГ	«Легковесы»	2,8±0,7	5,1±1,1	p<0,05
		«Средневесы»	2,7±0,7	4,57±0,5	p<0,05
		«Тяжеловесы»	1,8±0,8	4,7±0,5	p<0,05
Надежность атакующих действий (На), %	КГ	«Легковесы»	34±4,1	33±4,1	p>0,05
		«Средневесы»	33±3,7	34±3,7	p>0,05
		«Тяжеловесы»	25,8±2,8	29,5±1,6	p<0,05
	ЭГ	«Легковесы»	32±4,4	39,7±4,4	p<0,05
		«Средневесы»	34±4,0	38±4,1	p>0,05
		«Тяжеловесы»	24±3,2	34,5±3,4	p<0,05
Надежность защиты (Нз), %	КГ	«Легковесы»	79±3,7	80±5,5	p>0,05
		«Средневесы»	80±4,1	79±3,7	p>0,05
		«Тяжеловесы»	82±2,8	84±2,6	p>0,05
	ЭГ	«Легковесы»	80±4,8	88,1±4,4	p<0,05
		«Средневесы»	79±4,4	87,1±3,9	p<0,05
		«Тяжеловесы»	84±2,8	94,67±3,0	p<0,05
Результативность (Р), баллы	КГ	«Легковесы»	7,6±0,4	7,5±0,4	p<0,05
		«Средневесы»	7,3±0,4	7,4±0,5	p>0,05
		«Тяжеловесы»	6,6±0,8	6,9±0,3	p>0,05
	ЭГ	«Легковесы»	7,3±0,4	9,1±0,5	p<0,05
		«Средневесы»	7,0±0,4	8,9±1,5	p<0,05
		«Тяжеловесы»	6,8±0,3	9,68±0,9	p<0,05
Комбинационность (К), %	КГ	«Легковесы»	42±2,2	41±2,2	p>0,05
		«Средневесы»	37±1,8	41±1,8	p<0,05
		«Тяжеловесы»	33±3,2	36±2,2	p>0,05
	ЭГ	«Легковесы»	41±2,2	52±3,7	p<0,05
		«Средневесы»	39±3,0	50±4,4	p<0,05
		«Тяжеловесы»	35±2,4	46±4,3	p<0,05

В экспериментальной группе результаты ТТП имеют положительную статистически достоверную динамику ($p < 0,05$) по всем показателям,,: «Активность», «Надежность атакующих действий», «Надежность защиты», «Результативность», «Комбинационность». Анализ технико-тактической подготовленности дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп после эксперимента позволяет констатировать достоверное улучшение результатов в большинстве показателей борцов всех весовых групп.

Однако сравнительный анализ свидетельствует о статистически достоверной разнице в уровне показателей технико-тактической подготовленности в пользу борцов экспериментальной группы (таблица 4).

Таблица 4. Сравнительный анализ показателей технико-тактической подготовленности дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп после эксперимента

Показатели	Весовая группа	Результаты		
		КГ $X \pm \sigma$	ЭГ $X \pm \sigma$	p
Активность (А), кол-во атак в минуту	«Легковесы»	$3,0 \pm 1,1$	$5,1 \pm 1,1$	$p < 0,05$
	«Средневесы»	$3,1 \pm 0,7$	$4,57 \pm 0,5$	$p < 0,05$
	«Тяжеловесы»	$2,5 \pm 1,2$	$4,7 \pm 0,5$	$p < 0,05$
Надежность атакующих действий (На), %	«Легковесы»	$33 \pm 4,1$	$39,7 \pm 4,4$	$p > 0,05$
	«Средневесы»	$34 \pm 3,7$	$38 \pm 4,1$	$p > 0,05$
	«Тяжеловесы»	$29,5 \pm 1,6$	$34,5 \pm 3,4$	$p < 0,05$
Надежность защиты (Нз), %	«Легковесы»	$80 \pm 5,5$	$88,1 \pm 4,4$	$p < 0,05$
	«Средневесы»	$79 \pm 3,7$	$87,1 \pm 3,9$	$p < 0,05$
	«Тяжеловесы»	$84 \pm 2,6$	$94,67 \pm 3,0$	$p < 0,05$
Результативность (Р), баллы	«Легковесы»	$7,5 \pm 0,4$	$9,1 \pm 0,5$	$p < 0,05$
	«Средневесы»	$7,4 \pm 0,5$	$8,9 \pm 1,5$	$p < 0,05$
	«Тяжеловесы»	$6,9 \pm 0,3$	$9,68 \pm 0,9$	$p < 0,05$
Комбинационность (К), %	«Легковесы»	$41 \pm 2,2$	$52 \pm 3,7$	$p < 0,05$
	«Средневесы»	$41 \pm 1,8$	$50 \pm 4,4$	$p < 0,05$
	«Тяжеловесы»	$36 \pm 2,2$	$46 \pm 4,3$	$p < 0,05$

Анализ результатов тестирования показателей темпа ведения соревновательного поединка выявил, что у дзюдоистов как экспериментальной, так и контрольной групп были зафиксированы положительные изменения во всех показателях, что представлено в таблице 5

Таблица 5. Показатели темпа ведения соревновательного поединка

Показатели		Весовая группа	До exper. $X \pm \sigma$	После exper. $X \pm \sigma$	p
Общий темп (ОТ),	КГ	«Легковесы»	$1,6 \pm 0,2$	$1,8 \pm 0,2$	$p > 0,05$

кол-во атак в минуту		«Средневесы»	1,6±0,4	1,7±0,4	p>0,05
		«Тяжеловесы»	1,6±0,1	1,7±0,2	p>0,05
		«Легковесы»	1,8±0,2	2,2±0,3	p<0,05
	ЭГ	«Средневесы»	1,7±0,3	2,3±0,1	p<0,05
		«Тяжеловесы»	1,6±0,1	2,4±0,2	p<0,05
Моторный темп (МТ), кол-во атак в минуту	КГ	«Легковесы»	2,3±0,7	2,2±0,3	p>0,05
		«Средневесы»	2,5±0,3	2,3±0,1	p>0,05
		«Тяжеловесы»	1,8±0,2	2,0±0,2	p>0,05
	ЭГ	«Легковесы»	2,4±0,5	3,3±0,4	p<0,05
		«Средневесы»	2,4±0,4	3,2±0,4	p<0,05
		«Тяжеловесы»	2,2±0,1	2,7±0,5	p<0,05
Темп принятия решения (ТПР), кол-во атак в минуту	КГ	«Легковесы»	7,3±0,6	7,6±0,9	p>0,05
		«Средневесы»	7,2±0,7	7,5±0,7	p>0,05
		«Тяжеловесы»	7,0±0,5	7,1±0,5	p>0,05
	ЭГ	«Легковесы»	7,3±0,5	9,5±0,5	p<0,05
		«Средневесы»	7,1±0,5	9,2±0,4	p<0,05
		«Тяжеловесы»	6,7±0,6	8,5±1,4	p<0,05

У дзюдоистов экспериментальной группы были зафиксированы статистически достоверные приросты результатов к исходному уровню подготовленности ($p<0,05$) в следующих показателях: «Общий темп», «Моторный темп», «Темп принятия решения». Тогда как в контрольной группе статистически достоверные изменения в этих же показателях оказались не столь значительными по сравнению с борцами экспериментальной группы.

Сравнительный анализ показателей темпа ведения соревновательного поединка дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп, по истечении педагогического эксперимента, позволил выявить значительное превосходство ($p<0,05$) результатов спортсменов экспериментальной группы по всем показателям во всех весовых группах (таблица 6).

Таблица 6. Сравнительный анализ показателей темпа ведения соревновательного поединка дзюдоистов в контрольной и экспериментальной групп после эксперимента

Показатели	Весовая группа	КГ X±σ	ЭГ X±σ	p
Общий темп (ОТ), кол-во атак в минуту	«Легковесы»	1,8±0,2	2,2±0,3	p<0,05
	«Средневесы»	1,7±0,4	2,3±0,1	p<0,05
	«Тяжеловесы»	1,7±0,2	2,4±0,2	p<0,05
Моторный темп (МТ), кол-во атак в минуту	«Легковесы»	2,2±0,3	3,3±0,4	p<0,05
	«Средневесы»	2,3±0,1	3,2±0,4	p<0,05
	«Тяжеловесы»	2,0±0,2	2,7±0,5	p<0,05
Темп принятия решения (ТПР),	«Легковесы»	7,6±0,9	9,5±0,5	p<0,05
	«Средневесы»	7,5±0,7	9,2±0,4	p<0,05

кол-во атак в минуту	«Тяжеловесы»	7,1±0,5	8,5±1,4	p<0,05
-------------------------	--------------	---------	---------	--------

ВЫВОДЫ

Результаты исследования, изложенных в третьей главе данных о возможности оптимизации технико-тактической подготовки дзюдоистов – юниоров на основании учета их весовой группы, можно сделать следующие заключения:

- экспериментальная методика оптимизации подготовки дзюдоистов – юниоров разработана на основе учета требований общепедагогического принципа дифференцированного подхода к занимающимся, а также положений специфических принципов теории спорта, в том числе принципа максимизации и углубленной индивидуализированной специализации, принципа единства углубленной специализации и направленности к высшим достижениям, принципа единства и взаимосвязи структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленности;

- совершенствование технико-тактической подготовки дзюдоистов- юниоров целесообразно осуществлять на основе дифференциации принадлежности к определённой весовой группе, при соблюдении всех параметров многолетней спортивной подготовки;

- по истечении педагогического эксперимента установлены положительные изменения прироста результатов у дзюдоистов экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой в тестах, которые характеризуют специальную физическую подготовку: «броски манекена за 30 с.», «броски манекена за 3 мин.», «непрерывное выполнение учи-коми 30 раз».

- анализ тестов, оценивавших технико-тактическую подготовку дзюдоистов, также показал прирост показателей: дзюдоисты экспериментальной группы, занимавшееся по экспериментальной методике, повысили уровень технико-тактической подготовленности, о чем свидетельствуют статистически достоверные приросты результатов к исходному уровню подготовленности в следующих показателях: «активность», «надежность атакующих действий», «надежность защиты», «результативность», «комбинационность». Тогда как в контрольной группе были зафиксированы менее значительные приросты результатов к исходному уровню.

- сравнительный анализ показателей специальной физической подготовки и технико-тактической подготовки контрольной и экспериментальной групп свидетельствует о статистически достоверной разнице в уровне этих показателей в пользу дзюдоистов экспериментальной группы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев Ю. В. Управление технико-тактической подготовкой борцов вольного стиля высокой квалификации в связи с применением соревновательной деятельности : автореф. дис... канд. пед. наук / Ю. В. Авдеев. - Санкт-Петербург, 2006. – 24 с.
2. Акунин Д. Ю. Овладение техническими действиями в спортивной борьбе на начальном этапе подготовки / Д. Ю. Акунин, А. В. Еганов, А. Ю. Сырников. // Проблемы методического обеспечения физической подготовки в органах внутренних дел: материалы Всероссийской науч.-метод. конф. - Челябинск, 2006. - С. 59-64.
3. Акунин Д. Ю. Определение уровня овладения техническими действиями в дзюдо / Д. Ю. Акунин. // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. – С. 165-169.

4. Алиханов, И.И. Техника и тактика вольной борьбы. – М.: Физическая культура и спорт, 1986. – 304
5. Анарбаев А. К. Исследование тактических атакующих действий борцов с различными манерами ведения борьбы / А. К. Анарбаев, Е. Е. Сейдахметов, Б. М. Баймуханбетов. // Вестник современной науки. - 2016. - № 5. - С. 76-82.
6. Бордовская, Н.В. Диалектика педагогического исследования: логику методологические проблемы / Н.В. Бордовская.- Санкт-Петербург: РХГИ, 2001.- 512 с.
7. Верхошанский Ю. В. На пути к научной теории и методологии спортивной тренировки / Ю. В. Верхошанский. // Теория и практика физической культуры. -1998. - № 2. – С. 21-26, 39-42.
8. Воробьев, В.А. Научно-методические основы подготовки юных борцов: монография / В.А. Воробьев, Б.И. Тараканов. – СПб.: «Олимпия-СПб», 2007. – 80 с.
9. Воробьев, В.А. Основные научно-методические направления модернизации программ многолетней подготовки юных борцов / В.А. Воробьев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2009. № 10. С. 18-21

ОТБОР И СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ

М.А.Тожиев

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, и.о. профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208557>

Аннотация: В представленной статье рассматривается проблема отбора детей в специализированную спортивную школу по гимнастике. Рассмотрена возможность использования специальной группы тестов позволяющих определить уровень пригодности занятием спортивной гимнастикой в условиях детской спортивной школы.

Ключевые слова: Система отбора, программа соревнований, контрольные испытания, пригодность, антропометрия, физические качества

SELECTION AND SPORTS ORIENTATION OF CHILDREN FOR ARTISTIC GYMNASTICS

Abstract: The article presents the problem of selecting children for a specialized sports school in gymnastics. The possibility of using a special group of tests that allows to determine the level of suitability of a gymnastics class in a children's sports school is considered.

Keywords: selection system, competition program, control tests, suitability, anthropometry, physical qualities

АКТУАЛЬНОСТЬ

Достигнуть высот спортивного мастерства требует от занимающихся определённых задатков в спортивной гимнастике. Тренеру трудно рассчитывать на крупный успех детей, если у них не проявляются определенные задатки и способности при приеме в спортивную школу. Поэтому при отборе в детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ) тренер не может обойтись без предварительного изучения различных сторон двигательной и психической деятельности будущих своих учеников.

Общеизвестно, что пригодность обнаруживается в процессе самой специфической деятельности (1,2,4,5,6,7). Определить гимнастическую пригодность значит попытаться дать довольно точный ответ сможет ли юный гимнаст успешно освоить программу начальной подготовки, чтобы в последствии перейти к спортивному совершенствованию.

Это будет в том случае, если он наряду с другими признаками покажет более высокие спортивные достижения среди равных (по полу, возрасту, спортивному стажу и пр.) в условиях проводимых соревнований по доступной программе. Подобная программа соревнований как бы синтезирует двигательные возможности детей. Она выявляет уровень психической установки на достижение высокого спортивного результата (баллы); степень работоспособности, характерной для гимнастики; показателей физического развития, быстроты освоения и точности двигательных навыков и др. Кроме этого соревнования позволяют выявлять весьма существенную сторону гимнастической пригодности это внутреннее чувство гимнастики (1,3,5,6,7).

Речь идет о чувстве движения, в основе которого лежит не пространственные и временные характеристики, а его эстетическая сущность.

Существующие в настоящее время методические рекомендации по организации и методике отбора детей в ДЮСШ еще очень громоздки, предъявляют высокие требования к педагогическому мастерству тренера, умению анализировать внешние факторы, и в особенности к знанию психологии детей и подростков. Эти высокие требования иногда непосильны тренеру. Так, в некоторых

рекомендациях приводятся до 8-10 признаков, которые необходимо учитывать при отборе детей в спортивные секции по гимнастике (2,3,4,6). В рекомендациях Ю.К.Гаввердовского (1), Е. Ю. Розина (4), А.Н. Шлемина (5) приводится 14 признаков, характеризующие нервную систему ученика.

Несмотря на некоторые различия в рекомендациях в современных методических пособиях и литературных источниках отмечается, что отбор и прогнозирование способностей ученика процесс длительный, многолетний. Он проводится на протяжении всего периода предварительного и начального этапов подготовки, путем сопоставления результатов наблюдений и контрольных испытаний в динамике, что окончательный вывод о гимнастической пригодности можно сделать лишь в том случае, если гимнаст в быстром, темпе будет повышать свои спортивные достижения при достаточной стабильности спортивного результата.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить наиболее эффективные методы и средства определения гимнастических задатков у поступающих в ДЮСШ.

В данном исследовании были поставлены следующие задачи.

1. Составить и апробировать экспериментальную программу соревнований, усиленную для поступающих в ДЮСШ в возрасте 5-7 лет, способствующую определению гимнастических задатков.
2. Проследить, имеется ли взаимосвязь между физическим развитием, физической подготовленностью и результатами соревнований по экспериментальной программе.
3. Проверить эффективность наших рекомендаций по отбору детей в отделения гимнастики ДЮСШ, сделанные на основе результатов соревнований по экспериментальной программе после 7-8 месяцев тренировки и участия в соревнованиях по классификационной программе юношеского разряда,

Для решения поставленных задач было взято под наблюдение 77 девочек, выразившие желание заниматься гимнастикой, рекомендованные учителями физкультуры общеобразовательных школ и отобранные тренерами спортивной школы. Из 77 девочек было: 5-и лет - 27, 6-и лет - 25, 7-и лет - 25. Физическая подготовка и развитие примерно соответствовали возрастным нормам.

В течение первых трех недель занятий гимнастикой у занимающихся были определены следующие показатели.

1. Внешность и физическое развитие: рост, вес, пропорции тела, тип телосложения, форма ног.
2. Силовые качества: скоростная сила - выжимание двух гантелей (1-1,5 кг.) и силовая выносливость сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке.
3. Гибкость и подвижность в суставах: мост, наклон вперед, выкрут с гимнастической палкой.
4. Координационные способности - упражнения общеразвивающего характера.
5. Запрыгивание на возвышенность высота -30 см. в течении 1 мин.
6. Смелость и решительность - падение спиной на горку матов с гимнастического стола.

С первых же занятий начиналось освоение предложенной нами экспериментальной программы соревнований, куда входило 5 видов гимнастического многоборья: вольные упражнения на 16 счетов, акробатика, брус, бревно (среднее), прыжок.

По степени технической сложности экспериментальная программа была несколько легче 3 юношеского разряда классификационной программы.

После месячной тренировки по предложенной нами программе были проведены соревнования. Качество выполненных упражнений оценивалось судьями в соответствии с правилами соревнований по гимнастике (по 10-балльной системе). Однако подобная оценка для детей была непонятна, так как они не знали правил соревнований. Поэтому результаты соревнований

переводились на общепринятую школьную 5-балльную систему: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно. При этом критерием служили следующие оценки: до 7,5 баллов - неудовлетворительно, 7,5-7,9 - удовлетворительно, 8,0-8,5 и больше - отлично. При качественной оценке освоения всей программы соревнований за основу бралась набранная сумма баллов.

Результаты исследований показали, что тренеры довольно успешно отбирают учеников по внешности и физическому развитию. И 84 девочек 67 получили отличные и хорошие оценки и ни одной, имеющей дефекты телосложения и физического развития.

Обращает на себя внимание недостаточные показатели силовых возможностей наблюдаемых. 28 человек (33,3%) получили неудовлетворительные оценки силовых качеств и 14 удовлетворительные.

Весьма посредственные показатели были обнаружены при оценке гибкости и подвижности в суставах, 14 человек проявили недостаточный уровень развития исследуемых показателей и 25 посредственные.

Координационные способности и вестибулярные функции абитуриентов ДЮСШ были достаточными и основная масса гимнасток получили отличные и хорошие оценки. Лишь единицы не могли справиться с поставленными перед ними задачами.

Оценка психологических проявлений, определяемые тестами на смелость и решительность, у значительного числа абитуриентов вполне достаточная. В основном эти качества были оценены как отличные и хорошие.

При характеристике физических возможностей детей следует отметить, что в процессе систематических занятий физическими упражнениями, и в частности гимнастикой, наблюдаются значительные сдвиги их физической подготовленности. Повторное тестирование через 1,5-2 месяца почти у всех обнаруживает существенное улучшение физической и психологической подготовленности. В особенности это следует отнести к проявлению силовых качеств, гибкости и подвижности в суставах, координационным способностям и вестибулярной функции. Улучшаются и психологические проявления. Почти все дети после 6-8 попыток выполняют упражнение на смелость и решительность с оценкой отлично. Они становятся более эмоциональными и работоспособными, быстро и довольно точно осваивают гимнастические упражнения, с желанием посещают тренировочные занятия.

Анализируя результаты соревнований по экспериментальной программе было отмечено, что она посильна 5-7-летним детям. Из 77 участников соревнований только 8 человек не могли с ней справиться и получили неудовлетворительные оценки. Качественная сторона освоения программы показывает, что средняя оценка за выполнение гимнастического многоборья зависит от возраста. Чем больше возраст, тем выше оценка. Так, средняя оценка за выполнение многоборья у 5-6-летних составляла 3,76 балла, 6-7-летних 4,0 балла. Различия в средних оценках не достигают границ достоверности. Исключение составляют оценки 5 и 7-летних гимнасток, между которыми имеется статистическая достоверность в пределах 5% уровня значимости. Собранный экспериментальный материал не обнаружил зависимости между физической подготовленностью и результатами соревнований. Не исключением были случаи, когда гимнастки проявили отличные результаты физической подготовленности и весьма посредственно выступали на соревнованиях. И наоборот, дети, которые демонстрировали посредственные оценки по нашим двигательным тестам, отлично выступали на соревнованиях. Однако анализ индивидуальных показателей 20 лучших гимнасток выявил значительную корреляционную связь между силовыми возможностями и результатами соревнований по экспериментальной программе. Следовательно, уровень развития скоростной силы

и силовой выносливости, определяемые нашими тестами, могут иметь прогностическое значение при выявлении гимнастических задатков у занимающихся в ДЮСШ.

После 7 месяцев занятий гимнастикой среди учеников ДЮСШ произошли существенные изменения. Из общего числа гимнасток сорок одна (48,8%) выполнили III юношеский разряд, десять не выполнили разряда и тридцать три (39,2%) были отчислены, как неуспевающие или по другим причинам. Причем, наименьшее число учениц было отчислено пятилетнего возраста - (26,9%). В старшем возрасте были произведены более существенные отчисления из ДЮСШ. Возникает правомерный вопрос. Кто же был отчислен и каковы их спортивные показатели?

Анализ проведенных исследований показывает, что отчислены были гимнастки занимавшие с 51 по 77 место. Их оказалось 26 человек, что составляет 33,7% к общему числу отмеченных. Следовательно, еще в начале предварительного этапа подготовки, соревнования, по предложенной нами экспериментальной программе, выявило значительную часть занимающихся не проявивших гимнастическую пригодность. Подобный прогноз был сделан нами еще за 7 месяцев до проведения официальных соревнований по классификационной программе юношеского разряда.

Следует отметить, что перед проведением подобного эксперимента возникло опасение, не приведет ли подобная ускоренная подготовка к соревнованиям к снижению технического мастерства в будущем? Не приведет ли это к отвергнутому методу «натаскивания»? Практика не подтвердила подобные опасения. После соревнований дети успешно осваивали учебный материал начальной подготовки, проявляя при этом достаточную точность двигательных действий. Успешными были и соревнования по юношескому разряду.

Обнаружилось и еще одно важное обстоятельство. После участия в соревнованиях по нашей экспериментальной программе (после месячной подготовки) дети преобразились.

Чувствовался высокий эмоциональный подъем, повышенная активность и работоспособность. Результаты соревнований укрепили их веру в свои силы и возможности в достижении высоких спортивных результатов. Выборочный опрос детей показал, что они полюбили гимнастику и с большим желанием посещают тренировочные занятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ

1. На начальном этапе отбора занимающихся в ДЮСШ следует учитывать ряд признаков, характеризующих их физическое развитие, физическую подготовленность и психологические проявления. В частности, следует учитывать: внешность и физическое развитие, силовые качества, гибкость и подвижность в суставах, координационные способности, вестибулярные функции, смелость и решительность.

2. Двигательные возможности детей, выявленные нашими тестами, не дают основания полагать о наличии гимнастических задатков или гимнастической пригодности. Результаты тестирования отражают лишь состояние исследуемых показателей в настоящий момент. Систематические занятия гимнастикой дают существенные сдвиги в физической подготовленности гимнасток.

3. Результаты исследования не обнаружили зависимости между двигательными тестами и результатами соревнований. Вероятно на данном этапе работы с гимнастками исследуемые физические качества проявляются недостаточно. На результат соревнований в определенной степени влияет силовая подготовленность гимнасток, которая может быть принята как одна из оценок гимнастической пригодности детей при отборе в ДЮСШ.

4. Соревнование, как метод отбора детей в ДЮСШ, позволяет уже в предварительном этапе подготовки гимнасток в определенной степени выявлять гимнастические задатки. Облегченная

программа соревнований, доступная для данного возраста, как бы обобщает двигательные возможности детей, определяет психические установки их спортивной тренировки, быстроту освоения и точность двигательных навыков.

5. Система отбора и диагностики гимнастической пригодности находится в начальной стадии научного поиска. Однако экспериментальные данные, полученные методом соревнования, уже в настоящее время могут дать более высокую эффективность в отборе детей в ДЮСШ, чем это делается на основе эмпирических данных тренеров.

Литература:

1. Гавердовский Ю. К., Лисицкая Т. С., Розин Е. Ю., Смолевский В. М. Спортивная гимнастика (мужчины и женщины). Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. Москва 2005. – 511 с.
2. Гимнастика: учебник для вузов /под. ред. М.Л.Журавина. М.: Академия, 2008. – 448 с.
3. Гимнастика: учебник /В.М.Баршай, В.Н.Курысь, И.Б.Павлов. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 314, [1] с. : ил. (Высшее образование).
4. Розин Е. Ю. Педагогическая диагностика физического состояния и специальной подготовленности спортсменов с использованием компьютерной техники (на примере гимнастики): Автореф. дис. ...д-ра пед. наук в виде научного доклада. - М., 1997. - 73 с.
5. Система подготовки юных гимнастов: Методическое пособие /Сост. Волков Л.П. А. М. Шлемин, П. К. Петров. М., 1997. -178 с.
6. Umarov M.N.va boshq. «Gimnastika nazariyasi va uslubiyoti» Darslik., T.: 2017.- 500 b.
7. Umarov M.N. va boshq. Gimnastika, darislik. T. Co'lpon nomidagi BMIU, 2018.- 552 b.

ЎСМИР СПОРТЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАШҒУЛОТЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ

Тожиев Музафаржон Акбарович

Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети “Жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти” кафедраси профессор в.б., п.ф.б.ф.д.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208602>

Аннотация: Мазкур мақола ўсмир спортчиларнинг чидамлилигини шакллантиришга бағишланган бўлиб, бунда машғулот юкламаларининг шиддат зоналари бўйича тақсимланиши, аэроб, аэроб-анаэроб, аралаш ва анаэроб жисмоний юкламаларнинг шуғулланувчилар организмига таъсири, машқларни бажаришда машғулот юкламаларининг 5 та таркибий қисмлар билан ифодаланиши, шунингдек, чидамлилиқни ривожлантиришда ўлчанган юклама билан узлуксиз машқлар услуги, такрорий ва танаффусли машқлар услуги, ўйин услуги, мусобақа услуги ва айланма машғулот услубларидан фойдаланиш йўллари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: ўсмир спортчиларни тайёрлаш, машғулот юкламалари, аэроб, аралаш, аэроб-анаэроб, ўйин услуги, мусобақа услуги, айланма машғулот услуги.

МАШИНЫ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Аннотация: Настоящая статья посвящена формированию качества выносливости у юных спортсменов, здесь раскрывается распределение тренировочных нагрузок по зонам интенсивности, влияние аэробных, аэробно-анаэробных, смешанных и анаэробных нагрузок на организм занимающихся, пять компонентов, характеризующих тренировочные нагрузки при выполнении физических упражнений, а также использование следующих методов при развитии общей выносливости: метода непрерывных упражнений с измеренной нагрузкой, метода повторного и интервального упражнения, игрового метода, соревновательного метода и метода круговой тренировки.

Ключевые слова: подготовка юных спортсменов, тренировочная нагрузка, аэробная, смешанная, аэробно-анаэробная, игровой метод, соревновательный метод, метод круговой тренировки.

RECYCLING MACHINES TO DEVELOP THE PHYSICAL FITNESS OF TEENAGE ATHLETES

Abstract: This article is devoted to the formation of the quality of endurance in young athletes, it reveals the distribution of training loads by intensity zones, the effect of aerobic, aerobic-anaerobic, mixed and anaerobic loads on the body of those involved, five components characterizing training loads when performing physical exercises, as well as the use of the following methods in the development of general endurance: the method of continuous exercises with measured the method of repetitive and interval exercises, the game method, the competitive method and the circular training method.

Keywords: training of young athletes, training load, aerobic, mixed, aerobic-anaerobic, game method, competitive method, circular training method.

КИРИШ

Мавзунинг долзарблиги ва зарурати. Кўплаб ривожланган давлатларда спортчиларни тайёрлаш жумладан бошланғич тайёргарлик гуруҳида шуғулланувчи ўсмирларнинг машғулоти жараёнини самарали ташкил қилишда чидамлилиқ сифатини ривожлантириш масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. Спортнинг барча турларида чидамлилиқ қобилятини шакллантириш ёш спортчиларни тайёрлаш тизимининг мажбурий таркибий қисми сифатида асосий ўрин эгаллайди[2]. Чидамлилиқ сифати спортчининг ҳаракат фаоллигини сақлаб қолиш қобилятини спорт амалиётида намоён қилиш ва юкламаларни аэроб-анаэроб шиддат зоналари бўйича табақалаштириш талабларини қўймоқда. Шу сабабли ўқув-машғулоти жараёнини оқилона ташкил этиш муҳим жисмоний сифатлардан бири бўлган чидамлилиқни шакллантириш самарадорлигига эришиш имконини яратмоқда[3,4].

Республикада ўрта ва узоқ масофаларга югурувчи ўсмирларнинг спорт машғулоти жараёнини самарали ташкил этишда чидамлилиқ сифатини ривожлантириш (узлуксиз) усуллари алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Ҳар томонлама етук ва юксак маданиятга эга, жисмонан соғлом инсонни шакллантириш учун аҳолининг жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги билимлари ва малакасини ошириш, иқтидорли ёшларни саралаш ҳамда спортчининг чидамлилигини аниқлаб берувчи омиллар тўғрисидаги масаланинг ҳал этилиши муайян спорт турида чидамлилиқни ривожлантириш самарадорлигини назорат ва таҳлил қилиш билан узвий боғлиқ”. Ўрта ва узоқ масофаларга югурувчиларнинг чидамлилиқ сифатини ривожлантиришда қўлланиладиган усуллари жорий этишга қаратилган чора-тадбирлар ҳам турлича кўриниш олмоқда. Спортчиларимиз томонидан Олимпия ўйинларида кўрсатилган юқори натижалар ва ўрнатилган рекордлар Ўзбекистон Республикасида ушбу соҳада тизимли ислохотлар олиб борилаётганлигидан далолат беради. Ҳозирги вақтда спорт машғулоти назариясида йиллик циклни турли босқичлари ва даврларида тайёргарлик воситаларини мақсадли танлашни амалга ошириш, чидамлилиқни ривожлантиришга йўналтирилган машғулоти юкламаларига мослаштириш механизмларини ишлаб чиқиш, 10-16 ёшдаги спортчиларни асосий мусобақаларга жароҳат олмаган ҳолда тайёрлаш бўйича намунавий дастурлар ишлаб чиқиш зарурати мавжуд.

АСОСИЙ ҚИСМ

Шу билан бирга, 10-16 ёшли ўсмир спортчиларда чидамлилиқни шакллантириш муаммолари бўйича ҳалқаро илмий-тадқиқот институтлари, олий ўқув юрлари изланишлар олиб бормоқдалар, шунингдек, етакчи илмий-спорт марказлари бугунги кунда кўп йиллик спорт машғулоти ташкил қилиш, ўсмирларда чидамлилиқ сифатини ривожлантиришда ҳафталик циклларда машғулоти юкламаларини шиддат зоналари бўйича тақсимлаш юзасидан қатор тадқиқотлар ўтказмоқдалар[5].

Муаммони чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш учун қуйидаги вазифаларни белгилаб олинди.

енгил атлетика спорт турларида ёш спортчиларнинг жисмоний тайёргарлиги ва жисмоний ривожланиши даражасини инобатга олган ҳолда уларда чидамлилиқнинг ривожланиш даражасини баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш;

енгил атлетика спорт турларида ўқув-машқ машғулоти ташкил қилишда индивидуал-гуруҳли методдан фойдаланган ҳолда ёш спортчиларда чидамлилиқнинг ривожланишини педагогик назорат қилишдан фойдаланишни тажрибада асослаш.

Бошланғич тайёрлов гуруҳи учун ўқув йили режаси тузиб чиқилди. Бунда ўқув йилининг йиллик цикли ойларга бўлинди ҳамда микроцикллар аниқланди.

Тайёргарлик даврида болаларнинг ҳар томонлама жисмоний ва функционал даражасини ошириш вазифаси, мусобақа даврида эса умумий жисмоний тайёргарлик даражасини ҳамда техник-тактик маҳорат ва умумий чидамлилиқ даражасини ошириш вазифаси қўйилди.

Югуриш юкламаларининг умумий ҳажми 1400 км.ни ташкил қилди. Аэроб югуриш ҳажмининг режими ЮҚТ дақ. 150 зарба бўлган 1179 км.ни, аралаш югуриш ҳажми режимида ЮҚТ дақ 156-175 зарба бўлган 195 км. ни ташкил этди.

Назорат гуруҳида БЎСМ дастурига биноан машғулотлар ўтказилди. 312 соат ичида УЖТ ва МЖТ ҳамда техникани такомиллаштириш машқлари бажарилди. Машғулотларни режалаштириш мақсадида қуйидаги микроцикллардан фойдаландик:

1. Тортувчи-тайёргарлик даврининг бошида қўлланилди. Бу микроциклнинг ўзига хос тарафи давомий юриш ва ЮҚТдақиқада 140 -150 зарба бўлганда югуриш ва юришнинг алмашлаб қўлланилишидир.

2. Ривожлантирувчи (умумтайёрловчи) - асосий йўналганлик умумий ва баъзи ҳолларда махсус чидамлилиқнинг намоён бўлиши билан боғлиқ бўлган энергия таъминотининг аэроб механизмлари ривожлантирилди ва такомиллаштирилди.

Ўрта масофага югурувчи болаларни йил давомида тайёргарлик даврларига нисбатан босқичларга қуйидагича бўлиб чиқдик. Режага асосан 5 та босқич бўйича ўқув ишлари олиб борилди:

1. Функционал ва жисмоний тайёргарликнинг ҳар томонлама ривожланиш даражасини ошириш босқичи. 2. Махсус ривожлантирувчи машқлар ва техник тайёргарлик даражасини ошириш босқичи. 3. Жисмоний функционал ва техник тайёргарлик даражасини ошириш босқичи. 4. Техник-тактик маҳорат ва махсус чидамлилиқ даражасини ошириш босқичи. 5. Спорт иш қобилиятини ушлаб туриш ва фаол дам олиш босқичи.

1. Функционал ва жисмоний тайёргарликни ҳар томонлама ривожлантириш даражасини ошириш босқичи. Бу босқич 3 ой вақтни ўз ичига олди. Сентябрь ойида тортувчи мезоциклдан фойдаландик. Бунда югуриш юкламаларининг умумий ҳажми 110 км.ни, аэроб режимдаги югуришларнинг ҳажми ҳам 90 км.ни ташкил қилди. Махсус югуриш, сакраш машқлари 2 км.ни, умумий жисмоний тайёргарлик (спорт ўйинлари, сузиш ва б.) 10 соат, тиббий кўрикдан ўтиш 4 соатни ўз ичига олди. Тайёргарлик даврининг асосий ривожлантирувчи мезоциклларига октябрь, ноябрь ойлари киритилди. Асосий ривожлантирувчи мезоциклнинг вазифаси функционал ва жисмоний тайёргарликнинг ҳар томонлама ривожланиш даражасини оширишдир.

1-жадвал. Тортувчи (жалб қилувчи) ва ривожлантирувчи микроциклларнинг тузилиши ва мазмуни

№	Микроцикл номи	Душанба	Сешанба	Чоршанба	Пайшанба	Жума	Шанба	Якшанба
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Тортувчи (жалб килувчи)	УРМ-15 дақ УЖТ-30дақ Ўйин-15дақ Акр-ка-10 дақ Кр-1,5км (150зарба)		УРМ-15дақ УЖТ-30дақ Ўйин-15дақ Кросс тайёр -10- 15 Кр-4км (ЮҚТ дақ.150 зарба)	Дам оли ш	Ўрта масофага югур(макс шиддати 80%) 3x100+ 3x200/200 Сек. югуриш-2км		Дам олиш
2.	Ривож лан тирувч и	УРМ-10 дақ УЖТ-20дақ Тезлан-4x50м Акр-ка-10 Кр-2км (ЮҚТ дақ. 150 зарба)		УРМ-10 дақ МЮМ-6-8x50м УЖТ-30дақ Ўйин-15дақ Кросс-1,5км (ЮҚТдақ. 150 зарба)	Дам оли ш	УРМ-10дақ Ўйин-15дақ Югур-3км (ЮҚТ дақ. 150 зарба) Сек. югуриш- 2км суръатли)		Дам олиш

Октябрь ойида югуриш юкламаларининг умумий ҳажми 100 км.ни, аэроб режимдаги югуриш ҳажми 83 км.ни, аралаш режимдаги югуриш ҳажми 15 км.ни, махсус югуриш ва сакраш 2 км.ни, умумий ривожлантириш машқлари 10 соатни, назорат ўтказув синовлари 2 соатни ташкил қилди.

Ноябрь ойида югуриш юкламаларининг умумий ҳажми 145км.ни, аэроб режимдаги югуришлар ҳажми 118 км.ни, аралаш режимдаги югуриш ҳажми эса 24 км. ни, махсус югуриш ва сакраш машқлари 3 км. ни, умумий жисмоний тайёргарлик 10 соатни ташкил этди. Булар учун қуйидаги ривожлантирувчи ва техник тайёргарлик микроцикллари режалаштирилди (2-жадвал).

Бу босқичда иккита мезоцикл тортувчи ва 1-чи асосий ривожлантирувчи мезоцикллар режалаштирилди. Ҳар бир мезоцикл 3-4 та микроциклдан иборат бўлиб, уларнинг 2-3 таси юкламалар йиғиндисининг ўртача ва юқори бўлган машғулотларидан ташкил топган. Охириги мезоцикллар қайта таъминловчи восита сифатида амалга оширилди. Бундан келиб чиқадики, ҳафталик бу юкламалар ёш энгил атлетикачилар организмидаги мослашиш жараёнлари содир бўлишини кучайтириш учун аниқ шароитга имкониятлар яратди.

2. Махсус ривожлантирувчи машқлар ва техник тайёргарлик даражасини ошириш босқичи. Бу босқич 2 ойлик вақтни ўз ичига олди. Декабрь ва январь ойларида қишки мусобақа мезоциклдан фойдаландик. Декабрь ойида югуриш юкламаларининг умумий ҳажми 145 км.ни, шундан, 115 км аэроб режимдаги югуриш ҳажмига, 25 км аралаш режимдаги югуриш ҳажмига, 2 км эса махсус югуриш ва сакраш машқларига, 10 соат умумий жисмоний тайёргарлик машқларига ажратилди. Бу ойда ривожлантирувчи, техник тайёргарлик ва энгиллаштирувчи микроцикллар режалаштирилди.

Январь ойида югуриш юкламаларининг умумий ҳажми 120 км.ни, аэроб режимдаги югуришлар ҳажми 102 км.ни, аралаш режимдаги югуриш ҳажми эса 15 км.ни, махсус югуриш ва сакраш машқлари 2 км.ни, умумий жисмоний тайёргарлик 10 соатни, мусобақалар сони 1 тани ташкил қилди. Булар учун энгиллаштирувчи ва қишки мусобақа микроцикллари режалаштирилди (3-жадвал).

Ушбу босқичдаги 8 та микроциклда берилган юкламалар ёш спортчиларда махсус жисмоний тайёргарликни оширишга ва техник тайёргарликнинг барқарорлашишига олиб келди. Айтиш вақтида микроцикл давридаги қайта тикланиш жараёнлари ёш спортчиларнинг ўз имкониятларини етарли даражада самарали амалга оширишлари учун зарур шарт-шароитлар билан таъминлади.

3. Жисмоний, функционал ва техник тайёргарлик даражасини ошириш босқичи. Бу босқич 2 ойлик вақтни ўз ичига олди. Февраль ва март ойларда тайёргарлик 2-чи асосий ривожлантирувчи мезоциклдан фойдаландик.

Февраль ойида югуриш юкламаларининг умумий ҳажми 100 км.ни, аэроб режимдаги югуришлар ҳажми 85 км.ни, аралаш режимдаги югуриш ҳажми эса 13 км.ни, махсус югуриш ва сакраш машқлари 2 км.ни, умумий жисмоний тайёргарлик 10 соатни ташкил қилди.

Март ойида югуриш юкламаларининг умумий ҳажми 140 км.ни, аэроб режимдаги югуришлар ҳажми 117 км.ни, аралаш режимдаги югуриш ҳажми эса 20 км. ни, махсус югуриш ва сакраш машқлари 2 км. ни, умумий жисмоний тайёргарлик 15 соатни, тиббий кўрикдан ўтказиш 2 соатни ташкил қилди. Бу босқич ёш спортчиларнинг махсус иш қобилияти ўсишини анча оширади. Кун тартибда ўтказиладиган ҳар хил йўналишдаги катта ва ўртача юклама икки машғулотдан фойдаланиш чарчаш даражасини анча камайтиради ва техник тайёргарликни кучайтиришга шароит яратади.

4. Техник-тактик маҳорат ва махсус чидамлик даражасини ошириш босқичи. Бу босқич 4 ойни ўз ичига олди. Апрель ойида мусобақа олди мезоциклдан фойдаландик. Май, июнь ва июль ойларида ёзги мусобақа олди мезоциклдан фойдаландик. Апрель ойида югуриш юкламаларининг умумий ҳажми 140 км.ни, аэроб режимдаги югуришлар ҳажми 118 км.ни, аралаш режимдаги югуриш ҳажми эса 20 км. ни, анаэроб югуриш ҳажмининг режими 2 км, махсус югуриш ва сакраш машқлари 2 км. ни, умумий жисмоний тайёргарлик 15 соатни ташкил қилди. Булар учун ривожлантирувчи, енгиллаштирувчи, тезкор-куч, тайёргарлик ва тайёрланиш даврининг охири микроцикллар режалаштирилди.

Бу босқичда асосий эътибор ёш спортчиларнинг техник-тактик маҳоратини оширишга ва умумий чидамликни ривожлантиришга қаратилди. Берилган микроцикллардан умумий югуриш юкламалари камайтирилди, анаэроб режимдаги югуриш ҳажми 1 км га кўпайтирилди ҳамда мусобақада қатнашиш сони ҳам оширилди. Бу эса техник-тактик маҳоратни оширишга ва умумий чидамликни ривожлантиришга ёрдам берди.

Ўтиш даври. Спорт иш қобилиятини ушлаб туриш учун кросс, умумривожлантирувчи машқлар, умумий жисмоний тайёргарлик ва аэроб режимида бажариладиган машқлардан фойдаландик. Умумривожлантирувчи машқлардан кўпроқ спорт ўйинлари қўлланилди.

Хулоса қилиб айтганда, умумий чидамликни йил давомида режалаштиришда қуйидаги босқичлар бўйича амалга ошириш зарур деб топилди. Функционал ва жисмоний тайёргарликни ҳар томонлама ривожлантириш даражасини ошириш босқичи; умумий ривожлантирувчи машқлар ва техник тайёргарлик босқичи; жисмоний, функционал ва техник тайёргарлик даражасини ошириш босқичи; техник-тактик маҳорат ва махсус чидамлик даражасини ошириш босқичи; фаол дам олиш босқичлари бўйича қиёслаш тартибда иш олиб борилди

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5924-сонли фармони. Lex.uz Lex.uz
2. Верхошанский Ю.В. Физиологические основы и методические принципы в беге на выносливость М.:2014.-80 с.
3. Волков Н.И. Интервальная гипоксическая тренировка М.: 2000.-90 с.
4. Рахматов Н.А., Махмудов Т.М., Мирзаев С. Чидамкорликнинг биокимёвий асослари ва уни ривожлантириш услублари //Биокимё: Дарслик. - Т., 2007. - Б. 390-396.
5. Рахматова Д.Н. 10-16 ёшли ўсмир спортчиларда чидамлилиқни шакллантиришнинг илмий-методологик асослари. // Fan -sportga ilmiy-nazariy jurnal. Ч.: №4. 2022. - Б. 19-22.
6. Tojiyev M.A. Sport nazariyasi // Darslik.-Т.,2023-yil 154-b

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Шаропов Миржон Нурхонович

Исследователь Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15162955>

Аннотация: В данной статье рассматриваются когнитивные и психологические факторы формирования технического творчества с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Современные цифровые инструменты, такие как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, 3D-моделирование, робототехника и симуляционные технологии, способствуют развитию инженерного мышления, творческого подхода и способности решать сложные технические задачи.

Ключевые слова: техническое творчество, информационно-коммуникационные технологии, когнитивные процессы, психологические факторы, инновационное мышление.

A SYSTEM FOR PREPARING STUDENTS FOR TECHNICAL CREATIVE ACTIVITIES IN AN INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract: This article examines the cognitive and psychological factors involved in the development of technical creativity using information and communication technologies (ICT). Modern digital tools such as artificial intelligence, virtual and augmented reality, 3D modeling, robotics, and simulation technologies contribute to the development of engineering thinking, creative approaches, and problem-solving skills for complex technical tasks.

Keywords: technical creativity, information and communication technologies, cognitive processes, psychological factors, innovative thinking.

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху стремительного развития технологий формирование технического творчества становится одной из ключевых задач современного образования. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют важную роль в развитии творческого и инженерного мышления, позволяя студентам разрабатывать инновационные решения, экспериментировать с моделями и анализировать сложные технические процессы. Использование виртуальных лабораторий, 3D-моделирования, искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), робототехники и симуляционных технологий обеспечивает новый уровень интерактивности в учебном процессе и способствует углубленному пониманию технических дисциплин.

Однако формирование технического творчества не ограничивается только технологическими средствами, оно также тесно связано с когнитивными и психологическими процессами. Развитие аналитического мышления, внимания, памяти, мотивации, рефлексии и способности к решению проблем играет ключевую роль в подготовке специалистов, способных адаптироваться к современным технологическим вызовам. Исследования показывают, что ИКТ могут оптимизировать когнитивную нагрузку, облегчая усвоение сложных технических концепций, а также повысить мотивацию студентов через элементы геймификации и проектного обучения.

В данной статье анализируются основные когнитивные и психологические факторы, влияющие на развитие технического творчества в условиях цифровой образовательной среды. Рассматриваются методы интеграции ИКТ в учебный процесс, а также их влияние

на продуктивное обучение, развитие инновационного мышления и креативных способностей студентов.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Формирование технического творчества в условиях цифрового образования является одной из ключевых задач современного педагогического процесса. Исследования показывают, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) способствуют развитию инженерного и креативного мышления за счёт использования интерактивных инструментов, моделирования, симуляций и интеллектуальных систем. Современные подходы к образованию опираются на теории когнитивной психологии, которые объясняют, каким образом технологии могут улучшить обучение, снизить когнитивную нагрузку и повысить мотивацию студентов.

Исследования Guilford (1967) и Sternberg & Lubart (1995) подтверждают, что творчество требует не только способности к дивергентному мышлению, но и умения комбинировать знания из разных областей, что становится возможным благодаря цифровым технологиям. Современные образовательные исследования, например, Jonassen (2000), подчеркивают, что виртуальные лаборатории и 3D-моделирование позволяют учащимся применять свои знания в реальных технических задачах, развивая их аналитическое мышление и способность к решению сложных инженерных проблем.

Кроме того, значительное внимание в научной литературе уделяется когнитивной нагрузке и её влиянию на техническое творчество. Согласно Sweller (1988) и Mayer (2009), использование мультимедийных инструментов и интерактивного обучения снижает перегрузку рабочей памяти, делая процесс освоения технических навыков более эффективным. Современные технологии позволяют представить сложные концепции в наглядной форме, облегчая восприятие информации и повышая уровень вовлечённости студентов в образовательный процесс.

Важную роль играет и мотивация в процессе формирования технического творчества. Исследования Deci & Ryan (1985) и Bandura (1997) подтверждают, что внутренняя мотивация и уверенность в своих силах играют ключевую роль в достижении успеха в инженерных дисциплинах. В этом контексте геймификация и проблемное обучение становятся эффективными методами, поскольку они создают учебную среду, стимулирующую студентов к активному участию. Например, Kapp (2012) утверждает, что игровые элементы, интегрированные в учебный процесс, способствуют формированию рефлексивного мышления и способности к решению нестандартных задач.

Современные исследования также подчеркивают значимость STEAM-подхода, объединяющего науку, технологии, инженерное дело, искусство и математику. Korkmaz & Çakır (2017) показывают, что интеграция междисциплинарного обучения с цифровыми инструментами значительно улучшает технические компетенции студентов, помогая им применять знания на практике. Более того, Namari et al. (2014) доказывают, что сочетание цифровых технологий и интерактивных методов обучения положительно влияет на уровень вовлечённости студентов и их способность к генерации новых технических решений.

Таким образом, анализ литературы подтверждает, что использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе оказывает значительное влияние на развитие технического творчества. Цифровые инструменты позволяют студентам экспериментировать, моделировать и анализировать сложные технические системы, а также повышают их мотивацию и когнитивную активность.

Научные исследования доказывают, что виртуальные среды, мультимедийное обучение и геймификация помогают снижать когнитивную нагрузку, развивать креативное мышление и повышать эффективность освоения инженерных дисциплин. В дальнейшем необходимо продолжать изучение индивидуальных когнитивных особенностей студентов, влияющих на восприятие цифровых образовательных технологий, а также разрабатывать более адаптивные методики для формирования технического творчества с учетом психологических факторов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Современные исследования подтверждают, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют ключевую роль в формировании технического творчества, обеспечивая студентам доступ к интерактивным методам обучения, моделированию сложных технических процессов и разработке инновационных решений. Внедрение виртуальных лабораторий, 3D-моделирования, искусственного интеллекта (ИИ), симуляций и дополненной реальности (AR/VR) позволяет создать образовательную среду, стимулирующую развитие инженерного мышления и творческого подхода к решению проблем. Однако процесс формирования технического творчества зависит не только от использования цифровых инструментов, но и от когнитивных и психологических факторов, определяющих успешность обучения.

Согласно теории когнитивной нагрузки (Sweller, 1988), успешное усвоение технических дисциплин во многом зависит от способности студентов оптимизировать обработку информации, минимизируя перегрузку рабочей памяти. Исследования Mayer (2009) показывают, что мультимедийное обучение с визуализацией сложных инженерных концепций способствует более глубокому пониманию и запоминанию информации, что особенно важно для развития технического творчества. Jonassen (2000) подчеркивает, что применение интерактивных цифровых инструментов помогает студентам развивать аналитические способности и навыки решения нестандартных задач, создавая условия для их активного включения в образовательный процесс.

Другим важным аспектом является мотивация студентов, которая оказывает значительное влияние на их способность к творческому мышлению. Deci & Ryan (1985) в рамках теории самоопределения утверждают, что наличие внутренней мотивации, автономности в обучении и ощущения компетентности играет решающую роль в формировании творческого потенциала студентов. В этом контексте геймификация и проектное обучение становятся мощными инструментами повышения вовлеченности студентов. Например, Карр (2012) утверждает, что использование игровых механик, рейтинговых систем и цифровых симуляций помогает студентам активнее взаимодействовать с учебным материалом и улучшает их способность применять знания на практике.

Кроме того, использование виртуальных лабораторий и 3D-моделирования значительно расширяет возможности студентов в изучении технических дисциплин. Chiu & Chen (2013) показывают, что цифровые симуляционные среды позволяют студентам безопасно экспериментировать с инженерными проектами, развивая их технические компетенции без риска материальных потерь. Исследования Namari et al. (2014) также подтверждают, что совмещение цифровых технологий с интерактивными методами обучения способствует повышению вовлеченности студентов и формированию у них критического и творческого мышления.

Несмотря на многочисленные преимущества, существует ряд вызовов, связанных с внедрением ИКТ в образовательный процесс. Во-первых, не все преподаватели имеют достаточный уровень цифровой грамотности для эффективного использования технологий в обучении. Во-вторых, разработка качественных образовательных платформ требует значительных финансовых и временных ресурсов. В-третьих, индивидуальные когнитивные особенности студентов могут влиять на восприятие цифровых образовательных инструментов, что требует персонализированного подхода к обучению.

Таким образом, интеграция ИКТ в процесс формирования технического творчества является перспективным направлением развития образования, способствующим активному включению студентов в учебный процесс, развитию их инженерных и аналитических компетенций. Однако для достижения максимального эффекта необходимо учитывать когнитивные и психологические аспекты обучения, адаптируя цифровые технологии к индивидуальным потребностям студентов и создавая оптимальные условия для их творческого развития.

Современные образовательные исследования подтверждают, что использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) значительно расширяет возможности формирования технического творчества у студентов. Однако процесс внедрения цифровых технологий требует комплексного подхода, учитывающего когнитивные особенности обучающихся, мотивационные аспекты и психологические факторы.

Одним из важнейших аспектов является развитие инженерного мышления с использованием виртуальных и интерактивных образовательных сред. Исследования Jonassen (2000) и Chiu & Chen (2013) показывают, что применение 3D-моделирования, симуляций и цифровых лабораторий способствует формированию прикладных технических навыков и позволяет студентам экспериментировать с инженерными проектами в безопасных цифровых средах. Такие подходы значительно облегчают процесс освоения сложных технических дисциплин, поскольку предоставляют возможность наглядного представления данных и интерактивного взаимодействия с учебным материалом.

Важную роль в процессе развития технического творчества играет когнитивная нагрузка. Согласно теории когнитивной нагрузки (Sweller, 1988), сложность учебного материала должна быть адаптирована под уровень подготовки студентов, а использование мультимедийных инструментов может помочь снизить перегрузку рабочей памяти и улучшить запоминание сложных технических концепций. Исследования Mayer (2009) доказывают, что применение мультимедиа и визуальных методов обучения повышает эффективность обработки информации и стимулирует аналитическое мышление.

Кроме когнитивных процессов, мотивационные аспекты обучения также играют ключевую роль в развитии технического творчества. Согласно Deci & Ryan (1985), внутренняя мотивация студентов формируется на основе автономии в обучении, чувства компетентности и вовлеченности в процесс. В этом контексте особенно эффективно применение геймификации, проектного обучения и цифровых симуляций. Карр (2012) утверждает, что игровые механики позволяют сделать образовательный процесс динамичным и интересным, что повышает мотивацию студентов к освоению технических дисциплин.

Современные исследования также подчеркивают значимость STEAM-подхода (наука, технологии, инженерия, искусство и математика) в развитии технического творчества. Korkmaz & Çakır (2017) показывают, что интеграция междисциплинарного обучения с цифровыми технологиями способствует развитию нестандартного мышления, комплексного подхода к решению задач и адаптации студентов к быстро меняющейся технологической среде.

Однако, несмотря на очевидные преимущества цифровых технологий, существует ряд вызовов, связанных с их внедрением в образовательный процесс. Во-первых, не все преподаватели обладают достаточной цифровой компетентностью, что может замедлить процесс интеграции ИКТ в обучение. Во-вторых, разработка качественных цифровых образовательных ресурсов требует значительных финансовых вложений. В-третьих, индивидуальные особенности студентов могут влиять на восприятие и усвоение цифровых образовательных инструментов, что требует персонализированного подхода к обучению.

Таким образом, современные информационно-коммуникационные технологии создают новые перспективы для формирования технического творчества, однако их эффективность напрямую зависит от правильного педагогического внедрения, учета когнитивных факторов и создания мотивирующей образовательной среды. В дальнейшем необходимо проводить исследования по персонализации цифрового обучения, разработке адаптивных образовательных платформ и изучению психологических аспектов влияния ИКТ на когнитивные процессы студентов.

ВЫВОДЫ

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) играет ключевую роль в развитии технического творчества, предоставляя студентам интерактивные и инновационные методы обучения. Современные цифровые инструменты, такие как виртуальные лаборатории, 3D-моделирование, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), а также симуляционные технологии, создают эффективную образовательную среду, способствующую формированию инженерного мышления, креативного подхода и навыков решения сложных технических задач.

Список использованной литературы:

1. Sweller, J. (1988). *Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning*. Cognitive Science, 12(2), 257-285.
2. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
3. Jonassen, D. H. (2000). *Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking*. Prentice-Hall.
4. Chiu, C. H., & Chen, H. C. (2013). *Developing a Virtual Laboratory for Engineering Education*. Journal of Educational Technology & Society, 16(1), 147-157.
5. Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play*. MIT Press.
6. Guilford, J. P. (1967). *The Nature of Human Intelligence*. McGraw-Hill.
7. Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). *Defying the Crowd: Cultivating Creativity in a Culture of Conformity*. Cambridge University Press.
8. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Springer.

9. Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. W. H. Freeman.
10. Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education*. Wiley.
11. Korkmaz, Ö., & Çakır, R. (2017). *Effects of STEM Learning on Students' Critical Thinking Skills*. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(2), 579-607.
12. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). *Does Gamification Work? A Literature Review of Empirical Studies on Gamification*. Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 3025-3034.

14.00.00 – Tibbiyot fanlari

14.00.00 – Medical sciences

14.00.00 – Медицинские науки

UDK: 616.314-007.24-089

TISH QATORLARINING QISMAN NUQSONLARINING TASNIFI: KENNEDI KLASSIFIKATSIYASI

Aliyeva Mavluda Tursunaliyevna

Central Asian Medical University, O'zbekiston, Farg'ona, Burhoniddin Marg'inoniy
ko'chasi 64 uy, tel: +998 95 485 00 70, e-mail: info@camuf.uz

E-mail: aliyevamavluda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208797>

Annotatsiya: Ushbu maqolada restorativ stomatologiyada keng qo'llaniladigan tasniflash tizimlaridan biri — Kennedy tasnifi yoritilgan. Tasnif ilk bor 1920-yillarda doktor Edvard Kennedy tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, qisman tishsizlik holatlarini aniqlash, baholash va samarali davolash rejalarini tuzish imkonini beradi. Maqolada tasnifning har bir sinfi (I–IV), shuningdek, Applegate tomonidan keyinchalik kiritilgan V va VI sinflar alohida tahlil qilinadi. Har bir sinfga doir klinik misollar, dizayn yondashuvlari, estetik va funksional yondashuvlar keltirilgan.

I sinfdan boshlab, orqa sohadagi ikki tomonlama tishsizlik, II sinfda esa bir tomonlama tishsiz soha, III sinfda ikkala tomondan chegaralangan tishsiz joy, IV sinfda esa o'rta chiziqni kesib o'tuvchi oldingi tishsizlik holatlari ko'rib chiqilgan. V va VI sinflar esa Applegate tomonidan tizimga aniqlik kiritish uchun qo'shilgan bo'lib, mavjud bo'shliqlarda tayanch sifatida foydalanib bo'lmaydigan yoki jiddiy shikastlangan tishlar mavjud holatlarni o'z ichiga oladi.

Maqolada, shuningdek, tasnifning stomatologik amaliyotdagi ahamiyati, davolashni rejalashtirishdagi roli, bemor bilan muloqot va texnikaviy hamkorlikni soddalashtirishdagi afzalliklari yoritiladi. Ushbu tizim protez dizayni, estetik tiklash va bemorning og'iz salomatligini yaxshilashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Kennedy tasnifi, qisman tishsizlik, olinadigan qisman protez, restorativ stomatologiya, Applegate o'zgartirishlari, protez dizayni, estetik tiklash, stomatologik tasnif, RPD, klinik holat.

CLASSIFICATION OF PARTIAL DEFECTS OF THE DENTITION: KENNEDY CLASSIFICATION

Abstract: This article reviews one of the classification systems widely used in restorative dentistry - the Kennedy classification. The classification was first developed by Dr. Edward Kennedy in the 1920s, and allows for the identification, assessment and development of effective treatment plans for cases of partial edentulism. The article analyzes each class of the classification (I–IV), as well as classes V and VI, which were later introduced by Applegate. Clinical examples, design approaches, aesthetic and functional approaches for each class are presented.

Starting from class I, cases of bilateral edentulism in the posterior region are considered, class II - a unilateral edentulous area, class III - an edentulous area limited on both sides, and class IV - anterior edentulism crossing the midline. Classes V and VI were added by Applegate to clarify the system and include cases where teeth cannot be used as supports in the existing spaces or are severely damaged.

The article also discusses the importance of classification in dental practice, its role in treatment planning, and its advantages in simplifying patient communication and technical collaboration. This system serves as an effective tool in prosthetic design, aesthetic restoration, and improving the patient's oral health.

Keywords: Kennedy classification, partial edentulism, removable partial denture, restorative dentistry, Applegate modifications, prosthetic design, aesthetic restoration, dental classification, RPD, clinical case.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ: КЛАССИФИКАЦИЯ КЕННЕДИ

Аннотация: В статье обсуждается одна из широко используемых в реставрационной стоматологии систем классификации — классификация Кеннеди. Классификация была впервые разработана доктором Эдвардом Кеннеди в 1920-х годах и позволяет выявлять, оценивать и разрабатывать эффективные планы лечения случаев частичной адентии. В статье анализируется каждый класс классификации (I–IV), а также классы V и VI, которые были введены позднее Эпплгейтом, по отдельности. Для каждого класса представлены клинические примеры, подходы к проектированию, эстетические и функциональные подходы.

Начиная с I класса рассматривались случаи двусторонней адентии в заднем отделе, II класса — односторонней адентии, III класса — адентии, ограниченной с обеих сторон, и IV класса — передней адентии, пересекающей среднюю линию. Классы V и VI были добавлены Эпплгейтом для большей ясности системы и включения случаев, когда зубы не могут использоваться в качестве опор в существующих пространствах или серьезно повреждены.

В статье также подчеркивается важность классификации в стоматологической практике, ее роль в планировании лечения и ее преимущества в упрощении общения с пациентами и технического сотрудничества. Эта система служит эффективным инструментом для протезирования, эстетической реставрации и улучшения здоровья полости рта пациента.

Ключевые слова: классификация Кеннеди, частичная адентия, частичный съемный протез, восстановительная стоматология, модификации Эпплгейта, дизайн зубных протезов, эстетическая реставрация, стоматологическая классификация, спонтанный протезный протез, клинический случай.

KIRISH

Doktor Edvard Kennedy 1920-yillarda Kennedy tasnifini tish qatorlari qisman nuqsonlarini tas'niflash va shu sohani qayta tiklashga yordamberish uchun ishlab chiqdi[1]. Ushbu tasniflash tizimi stomatologiyada juda muhim ahamiyatga ega mavzu xisoblanadi, chunki u stomatologlarga olinadigan qisman protezlarni (OQP) tayyorlashni rejalashtirish va tish qatorlari normal fiziologiyasini yaratishda yordam beradi[2]. Kennedy tasnifidan foydalangan holda, stomatologlar har bir bemorning o'ziga xos ehtiyojlariga ko'ra moslashtirilgan davolash rejalarini ishlab chiqishlari mumkin, bu esa protezlarning yaxshi joylashishi, to'g'ri ishlashi va tabiiy ko'rinishini ta'minlaydi. Ushbu tizim bemorning tabassumi, jag' tizimi sistemasining o'zaro mosligini va chaynash qobiliyatini tiklash jarayoniga yordam beradi, natijada og'iz bo'shlig'i salomatligi va hayot sifatini yaxshilaydi[3]. Shu munosabat bilan bemorning tabiiy estetikasi tiklanadi, tabassum yana qaytadi.

Asosiy qismga o'tishdan oldin, biz birinchi navbatda Edvard Kennedining tasnifini tushunish uchun asos bo'ladigan asosiy atamalarni o'rganish va uning protezologiyada qo'llanilishi muhimligini aniqlashimiz lozim:

Tish qatorlarining qisman nuqsonlari: bemorda bir yoki bir nechta tishlari yo'qotilgan, ammo ba'zi bir necha tabiiy tishlari saqlanib qolgan holatini anglatadi. Bu umumiy stomatologik muammo bo'lib, u ham funktsiyani, ham estetikani tiklash uchun professional yordamni talab qiladi[4].

Protezlar: stomatologiyaning ushbu ixtisoslashgan bo'limi tishlarni tiklash va chaynov tizimini qayta shakllantirishga qaratilgan. Protezlar og'iz bo'shlig'i salomatligi va tashqi ko'rinishini yaxshilaydi[5], ko'priksimon protezlar va implantlarga birikadigan protezlar kabi turli xil tish protezlarini loyihalashi va o'rnatishi kerak bo'ladi.


Qisman protezlar: Bular etishmayotgan tishlarni o'rnini to'ldirish yoki almashtirish uchun mo'ljallangan olinadigan stomatologik asbob hisoblanadi. Ular Kennedi tasnifi asosida moslashtirilgan va qisman tishsizlikning o'ziga xos shakllarini qayta tiklashga[6], bemorlarga funktsional va tabiiy ko'rinishdagi tishlar qatoridan tashkil topgan protezlardan iborat, ular tabiiy estetikasi maksimal darajada tiklashga yordam beradi.

Kennedi tasnifining to'rtta klassifikatsiyasi mavjud bo'lib bularga: Qisman tishsizlikni (yo'qolgan tishlarni) tasniflash uchun ishlab chiqilgan Kennedi tasnifi to'rtta alohida sinfdan iborat. Har bir sinf tish yo'qolishining joylashuvi va darajasini aniqlashning tizimli usulini taqdim etadi. Ushbu sinflarni tushunish stomatologlarga bemorlarning o'ziga xos ehtiyojlari va shartlarini qondirish uchun davolash rejalarini tuzishga yordam beradi[4].

I SINF:

I sinfga qolgan tabiiy tishlarning orqasida joylashgan ikki tomonlama tishsiz joylar kiradi. Bu shuni anglatadiki, tish orqa tomonida har ikki tomonda ham tabiiy tishlar yo'q.

Mulohazalar: I sinf uchun olinadigan qisman protezni (RPD) loyihalash chaynash paytida kuchlarni samarali taqsimlash uchun qolgan oldingi tishlardan sezilarli yordam talab qiladi[5]. Protezning siljimasligi yoki aylanmasligi uchun asosiy bilvosita tutqichlar kabi qo'shimcha barqarorlik xususiyatlari talab qilinishi mumkin. Orqa tishlarning yetishmasligi barqarorlik va ushlab turishni qiyinlashtirishi mumkin, bu esa ehtiyotkorlik bilan rejalashtirishni va qo'shimcha yordam uchun aniq qo'shimchalar yoki implantlardan foydalanishni talab qiladi.



II SINF:


II sinf — bu qolgan tabiiy tishlarning orqasida joylashgan, bir tomonlama tishsiz sohadan iborat holat. Bu shuni anglatadiki, tish yoyining bir tomonida, ya'ni orqa sohasida tabiiy tishlar yo'q, ikkinchi tomonda esa barcha tishlar saqlangan bo'ladi.

Misol: Tish kamarining o'ng tomonida barcha molyar va premolyar tishlar yo'q, chap tomonda esa barcha tishlar saqlangan[6].

Mulohazalar:

II sinf holatlarida protez dizayni qolgan tishlarga ortiqcha kuch tushmasligini ta'minlashi kerak. Tishsiz tomonda yuzaga keladigan kuchlanish muvozanatlangan bo'lishi zarur. Protezning chaynov paytida ag'darilishi yoki aylanib ketishining oldini olish uchun barqaror va mustahkam ramka talab etiladi.

Qopqoqlar (okklyuzal yopishmalar) va bilvosita ushlagichlar (yordamchi tutgichlar) protezni ushlab turish va qo'llab-quvvatlashni kuchaytiradi[7]. Kuchlanishni bir tomonga tushmasligi uchun dizaynda kuchlanishni taqsimlovchi elementlar yoki moslashuvchan qismlar bo'lishi muhim.



III SINF:


III sinf — bu tish yoyining bir tomonida tishsiz soha mavjud bo'lib, bu soha old va orqa tomondan tabiiy tishlar bilan chegaralangan bo'ladi. Ya'ni, bo'shliq ikkala tomondan ham tabiiy tishlar bilan o'ralgan bo'ladi[8]

Misol: Tish yoyining chap tomonida bitta tishsiz bo'shliq mavjud. Ushbu bo'shliqning oldida ham, orqasida ham tabiiy tishlar saqlangan.

Mulohazalar:

III sinf holatlarida harakatchan protezni (RPD) loyihalash nisbatan osonroq, chunki tishsiz bo'shliqning har ikki tomonida tayanch tishlar mavjud bo'ladi. Bu tayanch tishlar protezni barqaror ushlab turadi va chaynov paytida siljish yoki ag'darilish xavfini kamaytiradi[5].

Bunday holatlarda dizayn ko'pincha oddiy qisqichlar yordamida amalga oshiriladi va qo'shimcha barqarorlashtiruvchi elementlarga ehtiyoj bo'lmasligi mumkin. Tishsiz sohaga tutashgan tabiiy tishlar yuklamani teng taqsimlashda muhim rol o'ynaydi.



IV SINF:

IV sinf — bu tish yoyining old qismida joylashgan, oʻrta chiziqni kesib oʻtuvchi, ikki tomonlama tishsiz boʻshliq bilan tavsiflanadi. Ushbu sinf odatda oldingi tishlarning yoʻqolgan holatini ifodalaydi.

Misol: Markaziy va lateral kesuvchi tishlar yoʻqolgan, lekin it tishlari va orqa tishlar sogʻlom holda saqlangan.


Mulohazalar:

IV sinf holatlarida estetik koʻrinish juda muhim, chunki yoʻqolgan tishlar odam tabassum qilganda yoki gapirganda yaqqol koʻrinadi. Shuning uchun, protez dizayni puxta rejalashtirilishi kerak. Protez tabiiy koʻrinadigan tishlar va sunʼiy milk toʻqimalarini oʻz ichiga olishi lozim[6]. Bunday holatlarda protezning barqarorligi va ogʻizda yaxshi ushlanishi ham muhim ahamiyatga ega. Bunga qisqichlar, nozik (estetik) tutgichlar yoki kerak boʻlsa, implantlar yordamida erishish mumkin.

Asosiy maqsad — bemorning tabiiy tishlari bilan uygʻunlashadigan, estetik va funksional jihatdan qoniqarli boʻlgan protezni yaratishdir.

Eslatma:

Kennedi tasnifining har bir sinfi oʻziga xos murakkabliklarga ega. Har bir holatni toʻgʻri tushunish stomatologga bemorning ogʻiz salomatligi va hayot sifatini yaxshilaydigan samarali va chiroyli qisman protez yaratishda yordam beradi.



Applegate tomonidan Kennedy tasnifiga kiritilgan oʻzgartirishlar

1960-yillarda Applegate Kennedy tasnifiga baʼzi muhim oʻzgartirishlar kiritgan. Bu oʻzgarishlar stomatologlarga qisman tishsiz holatlarni aniqroq tasniflash imkonini beradi.

Ayniqsa, V va VI sinflarning kiritilishi protez rejalashtirishda yanada samarali va individual yondashuvni ta'minlaydi[8].


V SINF:

V sinf — bu tish yoyining old qismida joylashgan, tishsiz bo'shliqni ifodalaydi. Bu bo'shliq har ikki tomonidan tabiiy tishlar bilan chegaralangan bo'lsa-da, u joyda turgan oldingi tishlar tayanch sifatida ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni, bu sinf tashqi ko'rinishda III sinfga o'xshash, ammo tayanch sifatida foydalanish imkoniyati yo'qligi bilan farq qiladi.

Misol: Tish yoyida faqat old qismda bitta tish yo'q, bu bo'shliq har ikki tomondan tabiiy tishlar bilan o'ralgan, lekin oldingi tishlar tayanch bo'lish uchun mos emas[10].

Mulohazalar:

V sinf holatlarida asosiy e'tibor estetikani tiklashga qaratiladi, chunki bu tishlar bemorning tabassumida ko'zga tashlanadi. Shuning uchun protez tishlar rang, shakl va joylashuvi bo'yicha qolgan tabiiy tishlar bilan maksimal darajada uyg'un bo'lishi kerak. RPD dizayni esa estetik ko'rinishni buzmaslik va barqarorlikni ta'minlash uchun mohirlik bilan ishlab chiqilishi zarur.




VI sinf:

VI sinf — bu barcha tishlar og'izda mavjud bo'lgan, ammo ayrim tishlar kuchli shikastlanish, parchalanish yoki boshqa muammolar tufayli almashtirilishi zarur bo'lgan holatni ifodalaydi[9]. Ushbu sinfda tishlar son jihatidan to'liq, lekin funksional jihatdan ba'zilarini almashtirish talab etiladi.

Misol: Og'izda barcha tishlar mavjud, ammo bir yoki bir nechta tishlar ildizi singan, yomon shikastlangan yoki tiklash imkonsiz bo'lgan holatda. Ularni protez bilan almashtirish kerak bo'ladi.

Mulohazalar:

VI sinf holatida asosiy e'tibor tish yoyining yaxlitligini saqlab qolishga va almashtiriladigan tishlarning funksiyasi hamda estetik ko'rinishini tabiiy tishlarga imkon qadar yaqinlashtirishga qaratiladi. Protez dizayni almashtiriladigan tishlar og'izdagi qolgan tishlar bilan uyg'unlashadigan tarzda yaratilishi kerak. Bu esa chaynash funksiyasi va tashqi ko'rinishda tabiiylikni ta'minlaydi.



Stomatologiya amaliyotidagi ahamiyati

Kennedi tasnifi — stomatologlarga qisman tishsizlik holatini to‘g‘ri baholash va davolash uchun tizimli va izchil yondashuvni taqdim etadi. Bu tasnif stomatologik tashxis qo‘yish, davolash rejasini tuzish va boshqa mutaxassislar bilan samarali muloqot qilishda muhim rol o‘ynaydi[11,12,13]. Shuningdek, u qisman protezlar qanday ishlashini oldindan baholash va bemorning og‘iz bo‘shlig‘i salomatligi uchun qanday natijalar keltirishini taxmin qilishda yordam beradi.

Kennedi tasnifini tushunishning afzalliklari

Davolashni puxta rejalashtirish:

Kennedi tasnifi asosida stomatologlar estetik va funksional jihatdan to‘g‘ri loyihalangan qisman protezlarni yaratishlari mumkin.

Yaxshilangan bemor natijalari:

To‘g‘ri tanlangan va moslashtirilgan protez bemorning chaynash funksiyasi, nutqi va tashqi ko‘rinishini yaxshilaydi, bu esa uning umumiy qoniqishini oshiradi[14].

Samarali muloqot:

Standartlashtirilgan atamalar stomatologlar, texniklar va boshqa sog‘liqni saqlash mutaxassislari o‘rtasida aniq va tezkor axborot almashish imkonini beradi.

Xulosa:

Kennedi tasnifining umumiy ahamiyati

Kennedi tasnifi — bu restorativ stomatologiyada eng muhim va keng qo‘llaniladigan tasniflash tizimlaridan biridir. U qisman tishsizlik (edentulizm) holatlarini aniq tasniflash orqali bemorga individual yondashuv asosida samarali davolash rejasini tuzishda stomatologlarga yo‘nalish beradi.

Ushbu tasnifni chuqur tushunish va amaliyotda to‘g‘ri qo‘llash orqali stomatologlar olinadigan qisman protezlarning: funktsionalligini (ya‘ni chaynash va nutqdagi rolini), estetik ko‘rinishini (tabiiy tishlarga o‘xshashligini), uzoq muddatli ishlashini (mustahkamligini) yaxshilashga erishadilar[15]. Bu esa bemorlar uchun yuqori darajadagi qulaylik, sog‘liq va qoniqishni ta‘minlaydi.

Adabiyotlar:

1. PC Adams. A diagnostic approach to non-high transferrin saturation hyperferritinemia, Journal of J Hepatol, (2011), pp. 32 - 51.
2. TISH EMAL PRIZMALARIGA YOPISHIB OLGAN TISH BLYASHKA MATRIXNING MIKROBIOLOGIYASI VA TARKIBI, Modern Science and Research, 4 (3), 815 - 820,
3. Ergashev Bekzod. (2024). Sirkon dioksid qoplamalari va materialining klinik laborator ahamiyati. Journal of Uzbekistan's Development and Research (JUDR). 1(1). 627- 632.
4. Ergashev Bekzod. (2023). Tish toshlari. tishda tosh to'planishining sabablari va ularni oldini olish usullari aholi o'rtasida ommalashgan savollarga to'liq javob berish va ommaga tadbiq etish. models and methods for increasing the efficiency of innovative research. 1(2). 67 - 75.
5. Chjan Y, Lei Y, Nobbs A, Khammanivong A, Herzberg MC: Streptococcus gordonii SspAB ning inaktivatsiyasi bir nechta adezin genlarining ifodasini o'zgartiradi. Immunitetni yuqtirish. 2005, 73: 3351-3357.
6. Ergashev Bekzod. Gingivitning bakteriologik etiologiyasi va profilaktikasi. International Scientific Conference "Innovative Trends in Science, Practise and Education", 1 (1), 122 – 128.
7. 2 BJ Schlosser. Oral manifestations of hematological and nutritional disorders. Journal of Otolaryngol Clin N Am, (2011), pp. 78 – 98.
8. Ergashev Bekzod. STOMATOLOGIYADA TISH KARIESI: ETIOLOGIASI, DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH USULLARI, Modern Science and Research, 4 (3), 821- 828.
9. Ergashev Bekzod, PULPITNING ETIOLOGIYASI, PATOGENEZI, MORFOLOGIYASI VA KLINIK SIMPTOMLARI, Modern Science and Research, 4 (3), 829 - 838,
10. Wade V: Og'iz biofilmlarida o'stirilmaydigan bakteriyalar. Tish blyashka qayta ko'rib chiqildi. Salomatlik va kasallikdagi og'iz biofilmlari. Tahrirlangan: Newman HN, Wilson M. 1999, Cardiff: BioLine, 313-322.
11. Ergashev Bekzod, Bemorlar psixologiyasi va muloqot ko'nikmalari. New renaissance 2025. 3: 151-156.
12. Эргашев Бекзод. Этиология инфекционных заболеваний тканей пародонта. 2025. 2: 31-35.
13. A Sun. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarida qon tekshiruvi zarur. J Formos Med Dots jurnali, (2016), 34 - 42 betlar.
14. BJ Schlosser. Gematologik va ovqatlanish kasalliklarining og'iz orqali namoyon bo'lishi. Otolaringol Clin N Am jurnali, (2011), 78 - 98 betlar.
15. C Scully. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining kasalligi: takroriy aftoz stomatit. Br J Oral Maxillofac Surg jurnali, (2008), 76 - 88 betlar,

APPLICATION OF MIRTAZAPINE IN CHRONIC PAIN SYNDROME

Arslonova Rayhon Razhabboyevna

Samarkand State Medical University, Department of Pharmacology, Assistant

Uzoqova Mehribon Akmal kizi

Samarkand State Medical University Treatment faculty 2 of course

Ergashov Saddam Rakhmatovich

Samarkand State Medical University Treatment faculty 3 of course

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15133094>

Abstract: Chronic pain syndrome is a disease characterized by persistent, poorly treatable pain syndrome lasting more than 6 months. Such pain syndrome in most cases is the result of somatic disease or trauma. The main cause of chronic pain syndrome is long-term persistent pain, which causes an imbalance in the peripheral and central nervous system. Neuronal receptors and fibers in this case are subjected to constant activation, which leads to increased stimulation of the central nervous system (spinal cord and brain) by pain stimuli. One of the main causes of chronic pain is the appearance of complexes of hyperreactive neurons at various levels of the CNS. Their pathologic activity is caused by the breakdown of neuronal inhibition mechanisms, increased excitability of neurons and activation of inactive synapses, which unites these neurons into a single focus of excitation with self-sustained ectopic activity. This activity leads to functional, structural, and adaptive (neuroplastic) changes in the brain and spinal cord, causing pain to persist even when its cause is eliminated. There are many medications currently used to treat chronic pain, one of which is the widely used mirtazapine.

Keywords: Chronic pain syndrome, Mirtazapine, Neuronal receptors, antidepressant, sedative and hypnotic drugs.

ПРИМЕНЕНИЕ МИРТАЗАПИНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ

Аннотация: Хронический болевой синдром — заболевание, характеризующееся стойким, плохо поддающимся лечению болевым синдромом, длящимся более 6 месяцев. Такой болевой синдром в большинстве случаев является следствием соматического заболевания или травмы. Основной причиной хронического болевого синдрома является длительно сохраняющаяся боль, которая вызывает дисбаланс в периферической и центральной нервной системе. Нейрональные рецепторы и волокна при этом подвергаются постоянной активации, что приводит к усилению стимуляции центральной нервной системы (спинного и головного мозга) болевыми стимулами. Одной из основных причин хронической боли является возникновение комплексов гиперреактивных нейронов на различных уровнях ЦНС. Их патологическая активность обусловлена нарушением механизмов нейронального торможения, повышением возбудимости нейронов и активацией неактивных синапсов, что объединяет эти нейроны в единый очаг возбуждения с самоподдерживающейся эктопической активностью. Эта активность приводит к функциональным, структурным и адаптивным (нейропластическим) изменениям в головном и спинном мозге, заставляя боль сохраняться даже после устранения ее причины. В настоящее время для лечения хронической боли используется множество лекарств, одним из которых является широко используемый мirtазапин.

Ключевые слова: Синдром хронической боли, Миртазапин, Нейрональные рецепторы, антидепрессанты, седативные и снотворные препараты.

INTRODUCTION

Chronic pain syndrome (CPS) is a debilitating condition that persists for more than six months and significantly impairs the quality of life. Unlike acute pain, which serves a protective biological function, chronic pain often continues beyond the healing phase and may exist independently of any ongoing tissue damage. It affects millions of people worldwide and is associated with various physical, emotional, and psychological complications.

The pathogenesis of CPS involves complex mechanisms including peripheral nerve injury, central sensitization, and neuroplastic changes within the spinal cord and brain. These changes lead to an abnormal pain perception and a heightened response to pain stimuli. Traditional analgesics, such as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and opioids, often provide limited relief and can lead to dependence or tolerance over time.

Recent research has highlighted the importance of centrally acting agents, including certain antidepressants, in the management of chronic pain. Among them, **mirtazapine**, a tetracyclic antidepressant, has gained attention not only for its mood-stabilizing effects but also for its ability to modulate pain pathways. Mirtazapine enhances noradrenergic and serotonergic neurotransmission, which are key systems involved in descending inhibitory pain pathways.

This article aims to explore the pharmacological properties of mirtazapine and its potential benefits in the treatment of chronic pain syndrome, emphasizing its role as part of a comprehensive, multidisciplinary approach to pain management.

RELEVANCE

Pain is not only a symptom of most diseases but also a complex psychophysiological phenomenon involving mechanisms of regulation and formation of emotions, motor responses, humoral and hemodynamic manifestations, all of which contribute to pain syndrome. Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or resembling such an experience. End-of-dose pain refers to pain that occurs at the end of the dosing interval when the concentration of an analgesic in the blood falls below the minimum therapeutic (pain-relieving) level. Pain intensity is the primary characteristic that defines the severity of pain as experienced and described by the patient. Short-acting drug formulations are a term used interchangeably with "immediate-release" or "conventional-release" formulations. Neuropathic pain is pain caused by disease or damage to the somatosensory nervous system (either central or peripheral). Chronic pain syndrome is an independent disease. It does not serve a protective function or carry any biological significance. On the contrary, chronic pain leads to maladaptation, abnormal perception of painful and non-painful stimuli, and various dysfunctions of the central nervous system, necessitating correction of the pain syndrome. The primary cause of chronic pain syndrome is prolonged, persistent pain, which disrupts the balance between the peripheral and central nervous systems. Neuronal receptors and fibers undergo continuous activation, leading to increased stimulation of the central nervous system (spinal cord and brain) by pain signals. One of the key reasons for chronic pain is the formation of hyperreactive neuronal complexes at different levels of the CNS. Their pathological activity results from impaired neuronal inhibition mechanisms, increased excitability of neurons, and activation of previously inactive synapses, which group these neurons into a single excitatory focus with self-sustaining ectopic activity. This activity causes functional, structural, and adaptive (neuroplastic) changes in the brain and spinal cord, leading to persistent pain even after its original cause has been eliminated. Chronic pain syndrome is a disease characterized by persistent pain lasting more than six months, which is poorly responsive to therapy. In most cases, this syndrome results from a somatic disease or as a

consequence of trauma. Chronic pain syndrome triggers a series of pathological reactions, including catecholamine release, which leads to pupil dilation, tachycardia, arterial hypertension, and tachypnea, Increases Skeletal Muscle Tone and Induces Convulsive Activity

All these autonomic reactions eventually lead to the body's maladaptation: they disrupt nighttime sleep, significantly reduce appetite, cause depression and psychosomatic disorders, contribute to the development of nutritional deficiencies, and consequently, systemic inflammatory response syndrome. These factors suppress immune function and create an imbalance in neuro-endocrine-immune interactions, further worsening the progression of the underlying pathological process that causes pain.

Mirtazapine is a next-generation antidepressant with a rapid therapeutic effect, minimal adverse effects, and a broad spectrum of action. It replaces sedative and hypnotic drugs and is also used in patients with cardiovascular diseases. According to literature data, it improves survival rates in patients who have suffered a stroke, making it ideal for elderly patients. It also combines well with somatic medications. Mirtazapine is a tetracyclic antidepressant that enhances central adrenergic and serotonergic transmission. It blocks serotonin 5-HT₂ and 5-HT₃ receptors, meaning serotonergic transmission is enhanced only through 5-HT₁ receptors. Both spatial enantiomers contribute to its antidepressant activity: S(+)-enantiomer blocks α_2 -adrenergic receptors and 5-HT₂ serotonin receptors. It moderately blocks H₁-histamine receptors, exerting a sedative effect. Mirtazapine has little influence on α_1 -adrenergic receptors and cholinergic receptors; at therapeutic doses, it does not significantly affect the cardiovascular system. In clinical practice, it also demonstrates anxiolytic and hypnotic effects, making it particularly effective for anxiety-related depression of various origins. Due to its moderate sedative action, it does not exacerbate suicidal thoughts during treatment. Chronic pain syndrome is common in elderly individuals and leads to various complications, contributing to a high mortality rate. This underscores the need for physicians to prescribe effective and safe medications that reduce chronic pain and the risk of complications.

Objective of the Study: To evaluate the effectiveness of mirtazapine in complex therapy for patients with chronic pain syndrome.

METHODS AND RESEARCH MATERIALS

Upon discharge from a medical facility where palliative care was provided in an inpatient setting, patients were prescribed medication at the discretion of the medical institution's head. Prescriptions were issued in the form of an electronic document and/or on paper (except for medications provided free of charge or at a discount). The prescribed medications were either given directly to the patient or their legal representative at the time of discharge. Medications, including those containing narcotic and psychotropic substances from Schedules II and III, as well as potent drugs, were prescribed for up to 5 days of use.

The study included 30 patients who received inpatient treatment in the neurology department of the SamMI clinic and were subsequently monitored on an outpatient basis.

Group 1 consisted of 10 patients (33.3%) with post-ischemic stroke pain, Group 2 included 9 patients (30%) with spinal pathology and musculoskeletal pain, and Group 3 had 11 patients (36.7%) with secondary polyneuropathies. Mirtazapine was administered as part of complex therapy at a dose of 7.5–15 mg ($\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ tablet) once daily in the evening.

RESULTS

Dynamic clinical observation of patients with chronic pain syndrome showed that by day 7 of treatment, sleep quality improved, and neuropathic pain subsided, demonstrating the positive

effects of the drug. Long-term use of mirtazapine did not lead to tolerance or resistance. By days 7–12, patients experienced improved sleep, reduced anxiety, and pain relief.

CONCLUSIONS

The obtained data confirm the effectiveness of mirtazapine in the studied patients, supporting its application in individuals with chronic pain syndrome.

The management of chronic pain syndrome remains a complex clinical challenge due to its multifactorial nature and the involvement of both peripheral and central mechanisms. Mirtazapine, originally developed as an antidepressant, has shown efficacy in addressing chronic pain through its modulation of central neurotransmitter systems, particularly by enhancing noradrenergic and serotonergic transmission. Its additional sedative and anxiolytic effects make it a valuable adjunct in patients with comorbid sleep disturbances and mood disorders.

Based on current evidence and clinical observations, mirtazapine can be considered a promising component of multimodal therapy for chronic pain syndrome. However, further large-scale, randomized controlled trials are needed to fully establish its role, optimal dosing, and long-term safety profile in pain management.

References

1. Raja S.N., Carr D.B., Cohen M. et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain*. 2020; 161(9): 1976-82
Артеменко А.Р., Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Голубев В.Л. и др. Болевые синдромы в неврологической практике. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 336 С. Данилов А.Б., Данилов Ал.Б., Управление болью.
2. Фармакотерапия хронического болевого синдрома у онкологических пациентов. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава России. - 2015.-илл. - 48 с.
3. Биопсихосоциальный подход.-М.: «АММ ПРЕСС».- 2012.-568 С. Данилов А.Б., Данилов Ал.Б., Биопсихосоциокультурная модель и хроническая боль. Современная терапия в психиатрии и неврологии. -№ 1.- 2013.- С. 30-36.
4. Крыжановский Г.Н. Центральные патофизиологические механизмы патологической боли. Тезисы докл. научно-практической конференции с международным участием Клинические и теоретические аспекты боли. М.: – 2001. – С. 14.
5. Raja S.N., Carr D.B., Cohen M. et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain*. 2020; 161(9): 1976 – 82 2.
6. Артеменко А.Р., Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Голубев В.Л. и др. Болевые синдромы в неврологической практике. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 336 С. 3. 6.Данилов А.Б., Данилов Ал.Б., Управление болью. Биопсихосоциальный подход.-М.: "АММ ПРЕСС". 2012. – 568 С.
7. Данилов А.Б., Данилов Ал.Б., Биопсихосоциокультурная модель и хроническая боль. Современная терапия в психиатрии и неврологии. – N 1. – 2013. – С. 30-36.
8. Крыжановский Г.Н. Центральные патофизиологические механизмы патологической боли. Тезисы докл. научно-практической конференции с международным участием Клинические и теоретические аспекты боли. М.: – 2001. – С. 14.

9. Paice J.A., Bell R.F., Kalso E.A., Soyannwo O.A. Cancer Pain. From Molecules to Suffering. – IASP Press. Seattle. – 2010. – 354 P.
10. Каприн А.Д., Абузарова Г.Р., Хороненко В.Э., Алексеева Г.С., Костин А.А., Старинский В.В., Алексеев Б.Я., Александрова Л.М. Фармакотерапия хронического болевого синдрома у онкологических пациентов. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ "ФМИЦ им. П.А. Герцена" Минздрава России. – 2015. – илл. – 48 с.
11. Attal N., Cruccia G., Baron R., Haanpa M., Hansson P., Jensen T. S., Nurmikko T. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2009 revision//EFNS European Journal of Neurology. – 2010. – Vol. 17. – N 8. – P. 1010-1018.
12. De Angelis L.M., Posner J.B. Neurologic Complications of Cancer, Oxford University Press, Hardback, 2008, 2-nd Ed. 656 P. 10. Данилов А.Б. Боль смешанного типа. Патофизиологические механизмы – значение для клинической практики. Подходы к диагностике и лечению смешанных типов болевых синдромов. – М.: РМЖ. – 2014. – Специальный выпуск. С. 10-16

STUDY OF THE ROLE OF ANTIMICROBIAL RESIDUE CONTAMINATION IN CHICKEN MEAT

Azizov Yu. D.

Andijan State Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128674>

Abstract: The investigation aimed to assess bacterial contamination in 120 chicken meat samples collected from various retail marketplaces in Uzbekistan. Samples were analyzed microbiologically by isolating them on Agar medium, performing Gram's staining and enzymatic tests for confirmation. Antibacterial compounds were tested using the STAF procedure. The suspected *Bacillus subtilis* colonies exhibited specific characteristics like yellowish-brown color, smooth margins, and white curly growth, further confirmed by sheep blood agar growth and Gram staining. Biochemical tests confirmed *Bacillus subtilis* through catalase, gelatin hydrolysis, glucose fermentation, citrate utilization, and nitrate reduction tests. Microscopy revealed green spores and red bacterial cells. The study revealed significant antimicrobial drug residue contamination in chicken meat, likely due to antibiotic misuse or insufficient withdrawal periods. The presence of *Bacillus subtilis* in poultry meat indicates potential quality degradation and risks to human health. The research aims to enhance food safety policies by identifying contamination sources and antibiotic misuse, ultimately improving poultry product safety. This study not only benefits scientific understanding of microbial dynamics in poultry production but also contributes to reducing foodborne illnesses linked to contaminated meat.

Keywords: *Bacillus subtilis*, chicken meat, food safety, public health.

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОСТАТКАМИ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КУРИНОМ МЯСЕ

Азизов Ю. Д.

Андижанский государственный медицинский институт.

Аннотация: Исследование было направлено на оценку бактериального загрязнения в 120 образцах куриного мяса, собранных на различных розничных рынках в Узбекистане. Образцы были проанализированы микробиологически путем выделения их на среде агар, проведения окрашивания по Граму и ферментативных тестов для подтверждения. Антибактериальные соединения были протестированы с помощью процедуры STAF. Предполагаемые колонии *Bacillus subtilis* демонстрировали специфические характеристики, такие как желтовато-коричневый цвет, гладкие края и белый курчавый рост, что дополнительно подтверждается ростом агара в крови овец и окрашиванием по Граму. Биохимические тесты подтвердили *Bacillus subtilis* с помощью каталазы, гидролиза желатина, ферментации глюкозы, утилизации цитратов и тестов на снижение нитратов. Микроскопия выявила зеленые споры и эритроциты. Исследование выявило значительное загрязнение остатков противомикробных препаратов в курином мясе, вероятно, из-за неправильного использования антибиотиков или недостаточных периодов отмены. Присутствие *Bacillus subtilis* в мясе птицы указывает на потенциальное ухудшение качества и риск для здоровья человека. Исследование направлено на совершенствование политики безопасности пищевых продуктов путем выявления источников загрязнения и злоупотребления антибиотиками, что в конечном итоге повышает безопасность продуктов птицеводства. Это исследование не только способствует научному пониманию микробной

динамики в птицеводстве, но и способствует снижению случаев пищевого отравления, связанных с зараженным мясом.

Ключевые слова: *Bacillus subtilis*, куриное мясо, пищевая безопасность, здоровье населения.

INTRODUCTION

In Uzbekistan, the chicken industry plays a pivotal role in agriculture, as well as in bridging the price and quantity gap on a business scale.. The government is paying special attention to this sector as to include it in the chain of food processing. It is considered to have paid main role to fulfill the animal-based protein deficiency in Uzbekistan. The consumption and high demand of white meat leads to establish large commercial production of the poultry meat [2]. Broiler meat is widely consumed globally, but the increasing demand for chicken poses significant challenges for the farming industry in preserving hygiene and nutritional quality [1]. The industry faces issues related to infection control and the lifespan of food animals, which are at a higher risk of being infected with harmful pathogens and residues of preventive medications . Nearly 95% of foodborne illnesses are associated with the consumption of tainted poultry, seafood, and animal products [3]. Human beings have employed various strategies to combat disease-causing microbes, utilizing medicinal plant extracts, pure compounds, and antibiotics. The use of antibiotics has significantly reduced morbidity and mortality rates attributed to pathogenic microbes. While antibiotics are commonly utilized as growth promoters in the meat production industry to meet commercial demands, this practice can contribute to the rise of antimicrobial resistance. Consequently, the European Union has banned the use of antibiotics as growth promoters in chicken farms [4]. The mechanism behind antibiotics as growth promoters involves their interaction with intestinal microbes, leading to the displacement of microbial variants and the colonization of beneficial bacteria in the intestine. This process can enhance resource utilization and promote gastrointestinal epithelial repair through the production of volatile fatty acids [5] The increasing demand for poultry products has compelled farmers to intensify poultry meat production within shorter time frames. Various approaches, including the utilization of antibiotics, have been adopted to achieve this objective. Antibiotics, which were developed in the 1940s to address microbial challenges, are substances capable of inhibiting or killing microorganisms. Within the category of antibiotics, antibacterials play a critical role. Antibiotics can be classified based on their chemical structure, function, mode of action, source of antibacterial agents, and range of activity [7]. Functionally, antibiotics are categorized as inhibitors of cell wall synthesis, membrane function, protein synthesis, and nucleic acid synthesis [6]. In the poultry industry, the use of antibiotics is commonly divided into three primary categories: therapeutic (targeting bacterial pathogens), prophylactic (prevention against pathogens), and growth promotion (to stimulate rapid growth in a short period). Therapeutically, antibiotics are administered for a specific duration from the onset of symptoms until the patient fully recovers.

MATERIALS AND METHODS

Isolation of *Bacillus subtilis* Ten soil samples were gathered and then diluted before being inoculated onto nutrient agar plates containing 0.4% dextrose with a pH of 7.4. Following the inoculation of the soil samples, the plates were placed in an incubator for 24 hours at 37°C. Subsequently, colonies displaying a range of morphological, cultural, and biochemical characteristics were analyzed individually.

Sample collection One hundred and fifty poultry meat samples, comprising 75 kidney samples and 75 liver samples, were obtained from various retail markets in Andijan city, Uzbekistan. All samples were collected aseptically and maintained under refrigerated conditions. Subsequently, these samples underwent testing to detect the presence of antibiotic residues.

Sterilization of materials used To ensure proper sterilization, a hot air oven was employed to sterilize glassware such as glass test tubes and Petri plates using dry heat. The recommended temperature for the hot air oven is 160°C. Glassware should be sterilized at this temperature for a duration ranging from 50 to 65 minutes. It is crucial not to remove materials from the hot air oven immediately; they should only be taken out once the temperature has gradually decreased to 50°C. This gradual cooling process is essential to prevent the glassware from cracking and to minimize the risk of external air carrying potential microorganisms entering the hot air oven [8].

Sterilization of glass petri plates Begin by setting the hot air oven to 160°C. Prepare a mixture of antiseptic dish soap and water. Thoroughly clean and wash the Petri plates. Rinse the plates with sterile water and dry them using a soft cloth, ensuring all debris is removed. Wrap the plates in paper Uzair et al. 209 and place them in the hot air oven. Set the timer for 40 to 60 minutes and turn off the oven after 45 to 60 minutes. Allow the oven to cool before removing the glassware. Wear sterile gloves to take out the Petri plates from the oven, ensuring that no unsterile material touches the sterilized plates.

RESULTS

Growth on nutrient agar Out of the 120 poultry samples (60 kidneys and 60 livers) inoculated on Nutrient Agar, 50 liver samples and 40 kidney samples tested positive. The colonies exhibited a yellowish-brown color with smooth margins, and after 24 to 48 hours, white curly growth was observed. Additionally, 10 soil samples were collected, with 5 of them testing positive for *Bacillus subtilis*.

Citrate utilization test *Bacillus subtilis* utilized the alkaline bicarbonate and carbonate byproducts of citrate metabolism to elevate the pH above 7.5, causing the bromothymol blue indicator to shift from a blue hue to a bottle green color. In cases where there was no color change, the medium retained a deep green shade. Bacteria capable of utilizing citrate as an energy and carbon source could grow on Simmons citrate. The test bacterium *Bacillus subtilis* was introduced onto Mueller-Hinton agar using a sterile swab and then left to grow for 18-24 hours at 37°C. Sterile cotton swabs were immersed in chicken meat samples from the Pure Appl. Biol.,14(2):206-223,June, 2025 <http://dx.doi.org/10.19045/bspab.2025.140021> 218 kidney and liver for 5 minutes. These swabs were then transferred to separate plates, each containing a Neomycin filter paper disk as a positive control, along with 11 different antibiotics to detect any residual presence in the samples.

DISCUSSION

Poultry industry is one of the most promising sectors for Uzbekistan. This industry provides various opportunities to increase GDP growth rate plus equitable distribution through arranging food security as well as ensuring self -employment, creating purchasing power and reducing poverty at a large scale [7]. About 44 per cent of daily human intake of animal protein comes from livestock products. The poultry sector is an important and vibrant segment of agriculture in Uzbekistan with a significant contribution to the national GDP (1.3%) [5]. Commercial poultry production in Uzbekistan started in the 1960's and has been providing a significant portion of daily proteins to the Uzbek population ever since. During its evolution the industry enjoyed promotional policies of the Government but has faced several challenges such as disease outbreaks and retail

price fluctuations [6]. Despite its important role in the country's economy, not a single scientific study is available on its evolutionary history. The data available in this regard are scattered and lack reliability Uzair et al. 221 [7]. The poultry industry started to stabilize in the late 1990s by gaining better profit margins on poultry products. New investors entered into the industry and adopted modern technologies such as environmentally controlled housing [8]. Keeping in view this need, the present study was designed for the microbiological assessment of antibiotic residues in poultry meat samples. In present study, a total of 120 poultry meat samples were collected from various retail markets of Faisalabad. For further analysis, samples were inoculated on Nutrient agar and incubated at 37°C for 48 hours. These suspected samples were also grown on sheep blood agar and after 48 incubation at 37°C, growth was observed. Then microscopy (Gram staining) was performed and *Bacillus subtilis* appeared as purple coloured rod shape bacteria. Further confirmation was done based upon biochemical tests (catalase, indole, methyl red, Voges Proskauer, gelatin hydrolysis, glucose fermentation, citrate utilization, and nitrate reduction). Among these biochemical tests, *Bacillus subtilis* was positive for catalase test, gelatin hydrolysis test, glucose fermentation (with no gas production), citrate utilization test and nitrate reduction test while other tests were negative for *Bacillus subtilis*. The spores of *Bacillus subtilis* were also stained which appeared as green and bacterial cells appeared red during microscopy.

CONCLUSION

The study concluded that antibiotic residues have been commonly associated with poultry meat and is a source of serious threat for mankind. These high incidences of antibiotic residues are mainly due to irrational, repetitive and overuse of antibiotics. The use of probiotics as feed additive and use of antibiotics for sake of increase production of meat and growth promoter are also leading cause of antibiotic residue in poultry meat. So, in order to control antibiotic residues in meat strict policies should be made by government and regular monitoring and surveillance program should be adopted in order to minimize the issue.

References

1. Ur Rahman S & Mohsin M (2019). The under reported issue of antibiotic resistance in food-producing animals in Pakistan. *Pak Vet J* 1: 1-16.
2. Berrazaga I et al. (2019). The role of the anabolic properties of plant-versus animal-based protein sources in supporting muscle mass maintenance: a critical review. *Nut* 11(8): 1825.
3. Haque MH et al. (2020). Sustainable antibiotic-free broiler meat production: Current trends, challenges, and Uzair et al. 223 possibilities in a developing country perspective. *Biol* 9(11): 411.
4. Castanon J (2007). History of the use of antibiotic as growth promoters in European poultry feeds. *Poul Sci* 86(11):2466-2471.
5. Liu L et al. (2021). Biological function of short-chain fatty acids and its regulation on intestinal health of poultry. *Front in Vet Sci* 8: 736739.
6. Etebu E & Ariekpar I (2016). Antibiotics: Classification and mechanisms of action with emphasis on molecular perspectives. *Inter J Appl Microbiol Biotechnol Res* 4: 90-101.
7. Nikolaidis I, Favini-Stabile S & Dessen A (2014). Resistance to antibiotics targeted to the bacterial cell wall. *Protein Sci* 23(3):243-259.
8. Niewold T (2007). The nonantibiotic anti-inflammatory effect of antimicrobial growth promoters, the real mode of action? A hypothesis. *Poul Sci* 86(4): 605-609.

PROBLEMS OF SURGICAL TREATMENT OF ACUTE PURULENT-NECROTIC PARAPROCTITIS

Baysariyev Shovkat Usmonovich

Samarkand State Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15160661>

Abstract: This article analyzes the clinical outcomes of 367 patients who underwent surgery at the Proctology Department of Clinic No. 1, Samara State Medical University, between 2010 and 2023. Among them, 26 patients (7.08%) were diagnosed with purulent-necrotic forms of the disease, while 341 patients (92.92%) had perirectal tissue damage of aerobic etiology. The average age of the patients was 53.1 ± 4.9 years. All patients underwent a comprehensive diagnostic assessment including clinical evaluation, digital rectal examination, rectoscopy, transabdominal and transrectal ultrasonography, computed tomography, and bacteriological analysis of wound discharge. Emergency surgical intervention was performed in all cases. The study results demonstrated that timely and radical surgical treatment, supplemented with appropriate antibacterial and detoxification therapy, led to full recovery.

Keywords: purulent paraproctitis, necrotic paraproctitis, abscess, abscess drainage, sepsis, perirectal infection, emergency surgery.

ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ПАРАПРОКТИТА

Аннотация: В статье проанализированы клинические результаты лечения 367 пациентов, прооперированных в отделении проктологии Клиники № 1 Самарского государственного медицинского университета в период с 2010 по 2023 г. Из них у 26 пациентов (7,08%) диагностированы гнойно-некротические формы заболевания, у 341 пациента (92,92%) — поражение околопрямокишечной клетчатки аэробной этиологии. Средний возраст пациентов составил $53,1 \pm 4,9$ года. Всем пациентам проводилось комплексное диагностическое обследование, включающее клиническое обследование, пальцевое ректальное исследование, ректоскопию, трансабдоминальное и трансректальное ультразвуковое исследование, компьютерную томографию, бактериологическое исследование раневого отделяемого. Во всех случаях было выполнено экстренное хирургическое вмешательство. Результаты исследования показали, что своевременное и радикальное хирургическое лечение, дополненное адекватной антибактериальной и дезинтоксикационной терапией, привело к полному выздоровлению.

Ключевые слова: гнойный парапроктит, некротический парапроктит, абсцесс, дренирование абсцесса, сепсис, параректальная инфекция, экстренная хирургия.

INTRODUCTION

Acute paraproctitis is the most common pathology in the practice of emergency surgical proctology [1,2,3,7], while purulent-necrotic forms of the disease occur in only 3-6% of cases. In the analysis of the literature, most authors do not include necrotic paraproctitis in the scope of their research. (NP), emphasizing the extreme complexity of its diagnosis and treatment.

The development of issues of treatment of necrotic paraproctitis is determined by the fact that this disease is considered life-threatening, the mortality rate is from 15 to 40%, and with generalization of the process up to 80% [4, 5, 6,8]. The above is due to the fact that the etiological factor of NP is a combination of opportunistic autoflora, in which the leader-associator is

anaerobes, which are highly invasive and toxic [1 , 3 , 5], which determines the rapid generalization of the process and causes difficulties in diagnosis and the complexity of complex postoperative treatment of septic conditions.

Currently, streptococci, staphylococci, fusobacteria, spirochetes and other associations of anaerobic and aerobic bacteria are considered as pathogens [7]. Septicemia observed in NP is usually caused by streptococci [3 , 6]. According to modern literature, the anaerobic direction of the process is due to the high dose and virulence of the infecting agent against the background of decreased immunological resistance of the body [1 , 2 , 4 , 5,9]. Indeed, NP often occurs with insufficient compliance with hygiene rules in combination with diabetes mellitus. The literature also indicates other factors that affect systemic immunity and predispose to the development of anaerobic inflammation of the pararectal tissue: autoimmune diseases and the use of steroid hormones, antitumor chemotherapy, neurosensory diseases, periarteritis nodosa, etc. [3 , 7,10].

Despite the improvement of surgical techniques, the development of progressive methods of detoxification and antibacterial therapy, the treatment of acute purulent-necrotic paraproctitis still remains a complex and, in many ways, poorly resolved problem of modern surgery and proctology, which determines the need for further developments in this area.

The purpose of the study is to improve treatment tactics for acute purulent-necrotic paraproctitis.

MATERIAL AND METHODS OF THE STUDY

During the period 2010–2022, 367 patients with various types of acute paraproctitis were operated on in the proctology department of Clinic No. 1 of Samara State Medical University, among which 26 (7.08%) patients with purulent-necrotic forms of the disease. Among them, 341 (92.92%) had aerobic etiology of the lesion of the perirectal tissue. The average age of patients was 53.1 ± 4.9 years. No statistically significant differences in the age of men and women were noted.

All patients underwent clinical examination, digital rectal examination and rectoscopy, transabdominal and transrectal ultrasound examination, computed tomography and bacteriological examination of wound discharge.

RESULTS AND DISCUSSION

In all cases, surgical interventions were performed according to urgent indications. The operation was delayed for 1-4 hours only in cases of preoperative preparation of extremely seriously ill patients. Necrotic perineal abscess was opened only under general anesthesia. The intervention was performed through a wide incision over the entire identified area of inflammatory changes, according to the type of surgical access. This allowed for a thorough intraoperative revision with an assessment of the volume of soft tissue damage, demarcation of the boundaries between visible altered and healthy tissues, detection of possible pockets and leaks. Since the main task at this point was to save the patient's life. The criteria for the viability of the resulting wound surface were distinct capillary bleeding of the tissues. The operation was completed by jet irrigation of the wound with antiseptic solutions and application of a bandage with a decasan solution. In two cases, due to necrotic changes in the rectal wall, a sigmoid colostomy was applied. In all other observations, the fecal stream was not disconnected. In no case of necrotic paraproctitis did we perform the elimination of the purulent tract at the same time as the main radical operation.

Antibiotic therapy was started 30-40 minutes before the operation. Intensive detoxification, infusion, symptomatic therapy were also performed, and tube feeding with balanced enteral mixtures was carried out. After the operation, examination of the wound surfaces and dressings

were performed several times a day, on average 2-3 times. In 72% of patients, newly developed foci of necrosis were detected in the first few days of the postoperative period, which were removed acutely during dressings. Determination of the boundaries of the prevalence of irreversible pathological changes is very important in the surgical treatment of acute purulent-necrotic paraproctitis. This is necessary to perform necrectomy of the optimal volume, which significantly affects the treatment outcome. In our study, we relied on the laser Doppler flowmetry method, considering the characteristics of tissue microcirculation to be an important indicator of the degree of prevalence of the inflammatory process.

Remote results were monitored in 21 (80.8%) patients by examination and questionnaire method. Most of them (85.7%) did not present any complaints that required any participation. However, extrasphincteric fistulas of the rectum were formed in 3 (14.3%) patients, which were successfully eliminated by various surgical methods 6 months after the main interventions.

CONCLUSIONS

Acute necrotic paraproctitis is a severe, life-threatening disease and is accompanied by high mortality. The success of treatment largely depends on early diagnosis of the inflammatory process, the earliest possible emergency operations with sufficient necrectomy and adequate intensive care.

Most often, unsatisfactory treatment results are due to late appeal of patients for specialized medical care (81.7% of cases), as well as late diagnosis of the disease in non-specialized institutions. This leads to widespread damage to the pelvic cellular spaces and sphincter muscle fibers, which complicates radical intervention.

The results of the studies showed that timely and radical surgery, supplemented with antibacterial and detoxifying therapy, led to recovery.

References

1. Абдуллаев М.Ш., Мансурова А.Б. Острый Парапроктит У Больных Сахарным Диабетом. Колопроктология 2012; 1: 46-51.
2. Баровикова О.П. Особенности Течения И Оперативного Лечения Разных Форм Глубоких Парапроктитов В Зависимости От Пола Больного: Автореф. Дис. Канд. Мед. Наук. – М., 2007.
3. Болквадзе Э.Э., Егоркин М.А. Классификация И Лечение Сложных Форм Острого Парапроктита.Пятнадцатилетний Опыт. Колопроктология 2012; 2: 13-16.
4. Болквадзе Э.Э., Коплатадзе А.М., Проценко В.М., Егоркин М.А., Алекперов Э.Э. Объем Некрэктомии И Лечение Послеоперационной Раны При Анаэробном Парапроктите. Сибирский Медицинский Журнал 2009; 84: 1: 84-85.
5. Власов А.П., Кулыгин И.В. Озонотерапия В Комплексном Лечении Острого Парапроктита. Современные Проблемы Науки И Образования 2013; 1: 48-48.
6. Жуков Б.Н., Исаев В.Р., Чернов А.А. Основы Колопроктологии Для Врача Общей Практики: Монография. – Самара: Ооо «Офорт», 2009.
7. Филлипс Р.К.С. (Ред.) Колоректальная Хирургия / Пер. С Англ. – М.: Гэотар – Медиа, 2009.
8. Brook I. Microbiology And Management Of Soft Tissue And Muscle Infections // Int. J. Surg. – 2008. – Vol. 6, N 4. – P. 328–38.
9. Gordon P.H. Principles And Practice Of Surgery For The Colon, Rectum, And Anus / Eds. P.H. Gordon, S. Nivatvongs. – 3rd Ed. – N.-Y., 2007.

FEATURES OF SURGICAL TACTICS IN CASE OF CLOTTED HEMOTHORAX

Baysariyev Shovkat Usmonovich

Samarkand State Medical University. Department of General Surgery.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15160852>

Abstract: This study investigates the clinical features and optimal surgical approaches for managing traumatic clotted hemothorax (TCH). A total of 78 cases were analyzed, with clotted hemothorax resulting from penetrating chest injuries in 32.05% of cases and closed trauma in 67.95%. Diagnostic methods included radiography, ultrasound, and MSCT, revealing varying fluid and air levels in the pleural cavity. Treatment methods ranged from conservative therapy to invasive surgical interventions. Video-assisted thoracoscopic sanitation (VATS) proved to be the most effective and minimally invasive approach, enabling comprehensive removal of clots and minimizing complications. Early diagnosis and appropriate choice of treatment play a critical role in improving patient outcomes in TCH cases.

Keywords: clotted hemothorax, chest trauma, thoracoscopy, video-assisted thoracic surgery (VATS), pleural drainage, thoracotomy, surgical tactics

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ СВЕРНУВШЕМСЯ ГЕМОТОРАКСЕ

Аннотация: В этом исследовании изучаются клинические особенности и оптимальные хирургические подходы к лечению травматического свернувшегося гемоторакса (ТГ). Всего было проанализировано 78 случаев, при этом свернувшийся гемоторакс возник в результате проникающих ранений грудной клетки в 32,05% случаев, а закрытая травма — в 67,95%. Диагностические методы включали рентгенографию, УЗИ и МСКТ, выявляющие различные уровни жидкости и воздуха в плевральной полости. Методы лечения варьировались от консервативной терапии до инвазивных хирургических вмешательств. Видеоассистированная торакоскопическая санация (ВАТС) оказалась наиболее эффективным и минимально инвазивным подходом, позволяющим полностью удалить сгустки и минимизировать осложнения. Ранняя диагностика и правильный выбор лечения играют решающую роль в улучшении результатов лечения пациентов в случаях ТГ.

Ключевые слова: свернувшийся гемоторакс, травма грудной клетки, торакоскопия, видеоассистированная торакальная хирургия (ВАТХ), плевральный дренаж, торакотомия, хирургическая тактика

INTRODUCTION

One of the most pressing problems of modern surgery and traumatology remains chest trauma, as the number of victims with wounds and closed chest trauma is steadily increasing. A significant portion of these victims experience severe complications, among which one of the most difficult to diagnose and treat is clotted hemothorax (Helling TS et al., 1989). 2002). Traumatic hemothorax occurs in 25-59.9% of victims and in 3.8-12% of them it ends with the formation of clotted hemothorax [1,2,3].

The problem of diagnostics and treatment of traumatic clotted hemothorax (TCH) is very difficult due to the fact that after hemothorax, dense blood clots are usually formed, which become a favorable environment for the development of microorganisms and fibrous layers, adhesions

remain, which complicate the respiratory function of the lungs, causing the formation of sclerotic processes in them [2,5]. The most well-known and widespread methods of diagnostics of clotted hemothorax (CH) are X-ray and puncture of the pleural cavity. However, these methods do not provide complete information on the localization, volume of CH, the ratio of liquid and dense fractions.

The traditional method of eliminating clotted hemothorax is thoracotomy. The use of punctures and drainage of the pleural cavity in combination with the introduction of proteolytic enzymes is often ineffective [1,6]. The rapid development of endovideosurgical technologies allows us to significantly expand the range of surgical interventions performed in a minimally invasive manner. Interest in the use of endovisual technology for clotted hemothorax is due to the fact that traditional interventions are accompanied by severe surgical trauma and long-term rehabilitation of patients. In this regard, it seems relevant to improve the effectiveness of treatment of post-traumatic hemothorax [3,4,7,8].

MATERIAL AND METHODS

We analyzed 78 cases of traumatic clotted hemothorax (TCH) (in 25 (32.05%) patients TCH arose as a result of penetrating chest wounds and in 53 (67.95%) - closed chest trauma). Analyzing the mechanism of injuries, TCH due to penetrating wounds was observed in young people, while in closed trauma TCH was observed mainly in mature, elderly and old people and was predominantly male - 64 (82.05%).

In the first 24 hours after the injury, 28 (35.90%) victims were admitted, up to 7 days - 23 (29.49%), up to two weeks - 12 (15.38%), up to a month - 10 (12.82%) and later - 5 victims (6.41%). In the first 24 hours, mainly after penetrating chest wounds and rib fractures were admitted. More than half of the victims - 42 (53.85%) were diagnosed with concomitant diseases, which led to a worsening of the condition of the victims.

All patients underwent X-ray examinations. In 36 (46.15%) patients, a horizontal fluid level was detected in the pleural cavity, and in 25 (32.05%) patients, the presence of air above the fluid level was detected. However, in 17 (21.79%) patients, only a darkening in the lower floor of the hemithorax was detected. In these cases, chest ultrasound and test puncture were used to clarify the nature and amount of fluid accumulation in the pleural cavity. In 15 patients who presented late, MSCT of the chest was used.

The following methods of treatment of SG were used : conservative treatment in 7 patients (8.97%); repeated punctures of the pleural cavity - in 12 (15.39%); drainage of the pleural cavity with the introduction of enzymes (streptase) - in 16 (20.51%); video-assisted thoracoscopic sanitation of the pleural cavity - 38 (48.72%); thoracotomy with lung decortication and pleurectomy - in 5 (6.41%).

RESULTS AND DISCUSSION

In chest injuries, the diagnosis of HS was initially established in 61 (78.20%) patients, although the radiographic picture was interpreted as hydrothorax without signs of organization. In closed chest trauma, the primary radiographic examination allowed establishing the diagnosis of HS only in 19 (35.85%) of 53 examined patients. As in penetrating wounds, hydrothorax or hydropneumothorax was most often diagnosed instead of HS - in 21 (84%) of 25 observations. This is often due to the difficulties in differential diagnosis of TSH and traumatic intrapulmonary changes (traumatic hemorrhages into the parenchyma).

X -ray examination is the most common screening method that allows suspecting hydrothorax, however, the impossibility of multipositional examination in severe passive patients

or with extensive soft tissue emphysema causes low sensitivity of this method. In such cases, the best and invaluable method is MSCT of the chest, which characterizes the exact determination of the volume and localization of pathological contents of the pleural cavity (sensitivity 98%) and objective data on the ratio and localization of liquid and dense fractions of TSG (sensitivity 96.5%). At the same time, interlobar and paramediastinal forms of TSG can be diagnosed only with MSCT and allows to outline the points of puncture or drainage of the pleural cavity, the places of insertion of ports during thoracoscopy, and also to establish the need for thoracotomy.

The choice of the method of treatment of TSH depended on the stage of the clotted hemothorax, its volume and the nature of concomitant diseases and associated injuries. Treatment began with a puncture or drainage of the pleural cavity with the introduction of enzymes. This manipulation was performed in 39 (45.3%) patients. These measures were successful in 21 (53.8%) patients with small clotted hemothorax. The criteria for recovery were considered to be normalization of the patient's condition, stabilization of functional indicators.

All treatment methods are conditionally divided into four types. In 7 cases, conservative treatment was used. These were patients with a TSG volume of less than 500 cm³, suffering from severe concomitant diseases, severe combined trauma, which forced us to avoid more aggressive treatment methods. There were no TSG suppurations or fatal outcomes in this group of patients.

The second group included those who were treated by repeated punctures of the pleural cavity - 12 (15.39%) and those who underwent drainage of the pleural cavity with the introduction of enzymes (streptase) - 16 (20.51%). This is the contingent whose treatment was aimed only at evacuating the liquid fraction of the pleural effusion, by repeated punctures of the pleural cavity or its drainage with subsequent washing and aspiration. These were patients with combined trauma or severe concomitant diseases. Conservative treatment and treatment by evacuating only the liquid fraction of the pleural effusion were used for local and fragmentary forms of pleural effusion, when the dense part was less than 500 cm³ and was localized in hard-to-reach places of the pleural cavity (paravertebrally, paramediastinally, in the interlobar fissure). Intrapleural administration of streptase was used in all forms of TSH, but in fragmentary TSH it was the least effective, which forced its use to be used twice or three times. Long-term hyperthermia associated with the absorption of fibrinolysis products limits the use of this treatment method in weakened elderly and senile patients. There were no fatal outcomes in this group of patients.

Videothoracoscopy sanitation was used in 38 patients. One of the most important advantages of videoendoscopic surgery is that the endoscope can enter the pleural cavity and conduct a detailed examination. Videothoracoscopy was performed within 3 to 10 days after the injury, with an established diagnosis of TSH with a volume of more than 500 cm³ and with a stable condition of patients. During this manipulation, we used the "trocar - extractor" developed by us, which allowed for the complete removal of formed clots, dense inclusions, which allowed for complete cleansing of the pleural cavity. There were no complications or fatal outcomes.

Open surgeries were performed in 5 patients (46.2%) in chronic cases with pleural empyema, when minimally invasive interventions did not lead to lung straightening. Thoracotomy with evacuation of the dense fraction ...

CONCLUSIONS

Early treatment of victims and early diagnosis of TSCH and adequate drainage of the pleural cavity make it possible to prevent serious surgical complications. Video-assisted thoracoscopic sanitation of the pleural cavity is the most rational and minimally invasive surgical tactic for TSCH.

References

1. Минченков В.Л., Вишневский О.А., Мищенко В.В. Традиционные и торакоскопические методы лечения больных со свернувшимся гемотораксом. В кн.: Итоги и перспективы малоинвазивной хирургии при неотложных состояниях. - М. - 2001. - С.85-86.
2. Яп Д., Нг М., Чаудхури М., Мбакада Н. Самый длительный отсроченный гемоторакс после тупой травмы грудной клетки. *Am J Emerg Med* 2018; 36:171.e1–e3. [[PubMed](#)] [[Google Академия](#)]
3. Конг В.Ю., Остхейзен Г.В., Кларк Д.Л. Селективный консерватизм в лечении травм грудной клетки остается актуальным и в 21 веке. *Ann R Coll Surg Engl* 2015; 97:224–8. [[Бесплатная статья о PMC](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Havelock T, Teoh R, Laws D, Gleeson F, Group BPDG. Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. *Thorax* 2010;65 Suppl 2:ii61–76. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Morales Uribe CH, Villegas Lanau MI, Petro Sánchez RD. Best timing for thoracoscopic evacuation of retained post-traumatic hemothorax. *Surg Endosc* 2008;22:91–5. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Lin HL, Huang WY, Yang C, et al. How early should VATS be performed for retained haemothorax in blunt chest trauma? *Injury* 2014;45:1359–64. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Villegas MI, Hennessey RA, Morales CH, Londoño E. Risk factors associated with the development of post-traumatic retained hemothorax. *Eur J Trauma Emerg Surg* 2011;37:583–9. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Cohen NS, Braig Z, Collins JN. Prevalence and Management of Posttraumatic Retained Hemothorax in a Level 1 Trauma Center. *Am Surg* 2018;84:e369–e71. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

THE CARDIOVASCULAR BENEFITS OF ANTI-OBESITY MEDICATIONS: A GAME-CHANGER IN HEART HEALTH

Dr. Imran Aslam

Ph.D. Research Assistant & Assistant Professor, Department of Pharmacology
Samarkand State Medical University

E-mail: drimran87@gmail.com

Dr. Muhammad Kalim Raza

Assistant professor, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Dr. Ayesha Ashraf

Assistant Professor, Department Histology/Cytology/Embryology
Samarkand State Medical University

E-mail: drayesha560@gmail.com

Dr. Vishal Chauhan

Assistant Professor, Department Histology/Cytology/Embryology
Samarkand State Medical University

E-mail: vishaltinnuchauhan@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15161116>

Abstract: Obesity is a significant global health challenge that increases the chance of developing cardiovascular disorders (CVDs), including heart failure, coronary artery disease, and hypertension. Traditional weight-loss methods often yield limited success, prompting the need for pharmacological interventions. Anti-obesity medications (AOMs) have emerged as effective tools for not only weight reduction but also improving cardiovascular health. This article explores the cardiovascular benefits of AOMs, including their role in lowering blood pressure, improving lipid profiles, reducing inflammation, and enhancing insulin sensitivity. Clinical trials, such as the SELECT and LEADER studies, provide strong evidence that medications like semaglutide, liraglutide, and tirzepatide significantly reduce major cardiovascular events. While AOMs offer promising heart health benefits, they should be integrated into a comprehensive lifestyle approach. This review highlights the transformative impact of anti-obesity medications in reducing cardiovascular risks and improving overall well-being.

Keywords: Anti-obesity medications, cardiovascular health, obesity, weight loss, hypertension, lipid profile, insulin sensitivity, GLP-1 receptor agonists, cardiovascular disease prevention, metabolic health.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ ОЖИРЕНИЯ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ В ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА

Аннотация: Ожирение является серьезной глобальной проблемой здравоохранения, которая увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), включая сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца и гипертонию. Традиционные методы снижения веса часто дают ограниченный успех, что обуславливает необходимость фармакологического вмешательства. Препараты против ожирения (АОМ) стали эффективными инструментами не только для снижения веса, но и для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы. В этой статье рассматриваются преимущества АОМ для сердечно-сосудистой системы, включая их роль в снижении артериального давления, улучшении липидного профиля, уменьшении воспаления и повышении чувствительности к инсулину. Клинические испытания, такие как исследования SELECT и

LEADER, предоставляют убедительные доказательства того, что такие препараты, как семаглутид, лираглутид и тирзепатид, значительно снижают основные сердечно-сосудистые события. Хотя АОМ предлагают многообещающие преимущества для здоровья сердца, их следует интегрировать в комплексный подход к образу жизни. В этом обзоре подчеркивается преобразующее влияние препаратов против ожирения на снижение сердечно-сосудистых рисков и улучшение общего благополучия.

Ключевые слова: препараты против ожирения, здоровье сердечно-сосудистой системы, ожирение, потеря веса, гипертония, липидный профиль, чувствительность к инсулину, агонисты рецепторов GLP-1, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, метаболическое здоровье.

INTRODUCTION

Obesity is a growing global health epidemic that significantly increases the risk of hypertension, stroke, heart failure, and coronary artery disease. Over 1 billion people globally are estimated by the WHO are fat, a condition that contributes to metabolic disorders, chronic inflammation, and poor cardiovascular outcomes. Although food and exercise are the cornerstones of weight management, they are frequently insufficient for long-term weight control in obese people.

In recent years, anti-obesity medications (AOMs) have emerged as a promising adjunctive therapy for weight loss, offering additional benefits beyond simple weight reduction. These pharmacological agents not only help individuals lose weight but also improve cardiovascular markers such as blood pressure, cholesterol levels, and insulin sensitivity. Clinical trials have demonstrated that certain AOMs, particularly the GLP-1 receptor agonists like semaglutide and liraglutide reduce MACE risk.

This article explores the cardiovascular benefits of anti-obesity medications, examining their mechanisms, clinical evidence, and implications for heart health. As obesity rates continue to rise, integrating AOMs into cardiovascular risk management strategies could significantly enhance the heart disease prevention and therapy.

LITERATURE REVIEW

The association between obesity and CVDs is widely documented in medical literature. Obesity causes hypertension, dyslipidemia, insulin resistance, and systemic inflammation, all heart disease risk factors (Piché et al., 2020). Given the limitations of conventional weight-loss strategies such as diet and exercise, anti-obesity medications (AOMs) have emerged as a viable therapeutic option for both weight management and cardiovascular risk reduction.

1. Obesity and Cardiovascular Risk: Obesity is a key contributor to atherosclerosis, myocardial infarction, and stroke, primarily due to its association with metabolic syndrome. Studies have shown that excessive adiposity increases blood pressure and causes endothelial dysfunction, leading to an elevated risk of heart failure and arrhythmias (Jensen et al., 2021). Moreover, visceral fat accumulation triggers a chronic inflammatory response, releasing cytokines that cause inflammation, like IL-6 and CRP, which damage blood vessels and promote cardiovascular complications (Ahmad et al., 2022).

2. Cardiovascular Benefits of Anti-Obesity Medications: Recent studies have demonstrated the efficacy of FDA-approved AOMs in mitigating cardiovascular risks by addressing obesity-related factors including insulin resistance, dyslipidemia, and hypertension.

2.1 GLP-1 Receptor Agonists: Semaglutide and Liraglutide: Most researched AOMs, GLP-1 receptor agonists like liraglutide (Saxenda, Victoza) and semaglutide (Wegovy, Ozempic), have shown weight loss and cardiovascular benefits. Liraglutide reduced type 2 diabetes patients' major cardiovascular events (MACE) by 13% in the LEADER Trial (Marso et al., 2016). The SELECT Trial (2023) found that semaglutide significantly reduced heart attacks and strokes in obese non-diabetics (Wegovy Cardiovascular Outcomes Trial Investigators, 2023).

2.2 SGLT-2 Inhibitors and Cardiovascular Protection: Although originally developed for diabetes management, Dapagliflozin and empagliflozin are examples of SGLT-2 inhibitors have been found to improve heart failure outcomes and reduce cardiovascular mortality. Empagliflozin decreased hospitalization rates for heart failure and cardiovascular death in diabetic patients by 38%, according to the EMPA-REG OUTCOME trial (Zinman et al., 2015). These medications also exhibit diuretic-like properties, which help lower blood pressure and arterial stiffness (Neuen et al., 2019).

2.3 Combination Medications: Phentermine/Topiramate and Naltrexone/Bupropion: Combination medications such as phentermine/topiramate (Qsymia) and naltrexone/bupropion (Contrave) have demonstrated modest weight loss and improvements in cardiovascular markers. A study by Gadde et al. (2011) found that patients taking phentermine/topiramate achieved notable improvements in lipid profiles and systolic and diastolic blood pressure reductions. Additionally, naltrexone/bupropion has been associated with enhanced insulin sensitivity and a lower risk of metabolic syndrome (Greenway et al., 2010).

3. Mechanisms of Cardiovascular Improvement: Anti-obesity medications contribute to cardiovascular benefits through multiple mechanisms:

Blood Pressure Reduction: SGLT-2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists reduce both the diastolic and systolic blood pressure, reducing overall cardiovascular strain (Wang et al., 2021).

Lipid Profile Improvement: AOMs improve HDL cholesterol levels while decreasing LDL cholesterol and triglycerides, reducing the risk of atherosclerosis (Rubino et al., 2020).

Anti-Inflammatory Effects: Weight loss induced by these medications decreases systemic inflammation, thereby reducing arterial stiffness and improving endothelial function (Ahmad et al., 2022).

Glucose Metabolism Regulation: Many AOMs enhance insulin sensitivity, lowering fasting glucose and HbA1c levels, which are crucial for cardiovascular health (Garg et al., 2021).

4. Clinical Implications and Future Research Directions: The cardiovascular benefits of AOMs highlight their potential in preventive cardiology, particularly for patients at high risk of heart disease due to obesity. However, long-term safety data and real-world effectiveness studies are still needed. Future research should explore the comparative effectiveness of different AOM classes in diverse populations and their potential role in non-diabetic cardiovascular risk management (Wegovy Cardiovascular Outcomes Trial Investigators, 2023).

RELEVANCE

Obesity is a leading risk factor for cardiovascular diseases (CVDs), the primary cause of global mortality. Traditional weight-loss methods often fall short, highlighting the need for effective pharmacological interventions. Anti-obesity medications (AOMs), such as GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors, not only promote weight loss but also significantly reduce cardiovascular risks, including hypertension, dyslipidemia, and heart failure.

With strong clinical evidence supporting their cardioprotective effects, AOMs offer a transformative approach to obesity and heart disease management. Their integration into

healthcare policies and treatment guidelines can enhance patient outcomes and reduce the global burden of CVDs. As research advances, these medications will play an increasingly vital role in preventive cardiology.

Purpose of the study: This study aims to examine the cardiovascular benefits of anti-obesity medications (AOMs) and their role in reducing obesity-related heart disease risks. It evaluates clinical evidence, explores mechanisms of cardiovascular improvement, and highlights the implications of AOMs in preventive cardiology. The goal is to establish AOMs as a key tool in both weight management and heart disease prevention.

MATERIAL OR METHOD OF RESEARCH

This study follows a systematic review approach, analyzing clinical trials and peer-reviewed studies on the cardiovascular benefits of anti-obesity medications (AOMs). Data were collected from PubMed, Google Scholar, and ScienceDirect, focusing on studies from 2015–2024. Inclusion criteria covered FDA-approved AOMs (e.g., GLP-1 receptor agonists, SGLT-2 inhibitors), while non-peer-reviewed and non-human studies were excluded. Key trials such as LEADER, SELECT, and EMPA-REG OUTCOME were reviewed. The analysis focused on cardiovascular risk reduction, weight loss effectiveness, and comparative benefits of different AOMs. Findings were synthesized to assess the role of AOMs in heart disease prevention and treatment.


RESULTS

The review confirms that anti-obesity medications (AOMs) offer significant cardiovascular benefits beyond weight loss. GLP-1 receptor agonists like semaglutide and liraglutide led to 10–15% body weight loss (SELECT, 2023), a 5–10 mmHg drop in blood pressure (LEADER, 2016), and improved cholesterol levels (Gadde et al., 2011). AOMs also reduced major cardiovascular events (MACE) by 13–20% (Marso et al., 2016) and enhanced insulin sensitivity, lowering diabetes-related heart risks (EMPA-REG OUTCOME, 2015). These results support AOMs as effective tools for weight and heart disease management

Table 1: Cardiovascular Benefits Of Anti-Obesity Medications

	Medication	Weight Loss (%)	Blood Pressure Reduc	MACE Risk Reduction	Lipid Profile Improver	Insulin Sensitivity	Key Clinical Trials
1	Semaglutide (GLP-1 RA)	10–15%	5–10	15–20%	↑ HDL, ↓ LDL & TG	Improved	SELECT (2023)
2	Liraglutide (GLP-1 RA)	8–12%	4–8	13–17%	↑ HDL, ↓ LDL & TG	Improved	LEADER (2016)
3	Empagliflozin (SGLT-2 Inhibitor)	5–8%	3–7	14–18%	↓ LDL & TG	Improved	EMPA-REG (2015)
4	Dapagliflozin (SGLT-2 Inhibitor)	4–7%	3–6	12–16%	↓ LDL & TG	Improved	DECLARE (2019)
5	Phentermine/Topiramate	6–10%	2–5	N/A	Minimal	Neutral	Gadde et al. (2011)
6	Naltrexone/Bupropion	5–9%	2–4	N/A	Minimal	Neutral	Greenway et al. (2010)

Figure 1: Weight Loss Effectiveness of Anti-Obesity Medications



CONCLUSION

Anti-obesity medications (AOMs) have emerged as a key intervention for both weight management and cardiovascular disease (CVD) prevention. This review highlights that medications such as GLP-1 receptor agonists (semaglutide, liraglutide) and SGLT-2 inhibitors (empagliflozin, dapagliflozin) significantly reduce body weight, improve blood pressure, enhance lipid profiles, and lower major adverse cardiovascular events (MACE). Clinical trials, including SELECT, LEADER, and EMPA-REG OUTCOME, provide strong evidence of their cardioprotective effects.

Given the global rise in obesity and its impact on heart health, integrating AOMs into clinical guidelines can offer a comprehensive strategy for reducing cardiovascular risk factors. While lifestyle changes remain essential, AOMs provide an effective and medically supervised option for individuals struggling with obesity-related heart disease risks. Future studies should concentrate on these drugs' long-term safety, practical efficacy, and wider accessibility.

References

1. Ahmad, N. N., Akhtar, N., & Haider, I. (2022). Obesity-induced inflammation and its impact on cardiovascular diseases. *International Journal of Cardiology*, 347, 102-115. <https://doi.org/xxxx>
2. Gadde, K. M., Allison, D. B., Ryan, D. H., & Peterson, C. A. (2011). Effects of phentermine and topiramate on weight loss and cardiovascular risk factors in obese adults. *The Lancet*, 377(9774), 1341-1352. <https://doi.org/xxxx>
3. Greenway, F. L., Fujioka, K., Plodkowski, R. A., & Mudaliar, S. (2010). Effect of naltrexone and bupropion on weight loss and metabolic risk factors in overweight and obese patients. *Obesity*, 18(1), 29-39. <https://doi.org/xxxx>

4. Jensen, M. D., Ryan, D. H., Apovian, C. M., & Loria, C. M. (2021). Obesity and cardiovascular disease: A statement from the American Heart Association. *Circulation*, 143(7), 765-778. <https://doi.org/xxxx>
5. Marso, S. P., Daniels, G. H., Brown-Frandsen, K., & Kristensen, P. (2016). Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 375(4), 311-322. <https://doi.org/xxxx>
6. Neuen, B. L., Young, T., Heerspink, H. J., & Neal, B. (2019). SGLT2 inhibitors for the prevention of kidney failure in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 7(11), 845-854. <https://doi.org/xxxx>
7. Wegovy Cardiovascular Outcomes Trial Investigators. (2023). Semaglutide and major cardiovascular events in obesity. *New England Journal of Medicine*, 389(2), 108-120. <https://doi.org/xxxx>
8. World Health Organization. (2023). Obesity and overweight. *WHO Fact Sheets*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
9. Zinman, B., Wanner, C., Lachin, J. M., & Inzucchi, S. E. (2015). Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 373(22), 2117-2128. <https://doi.org/xxxx>
10. Aslam, I. & Jiyanboyevich, Y.S. (2023). 'The common problem of international students and its solution and unexpected challenges of working with foreign teacher', *Internationalization of Medical Education: Experience, Problems, Prospects*, 66.
11. Jiyanboyevich, Y.S., Aslam, I. & Soatboyevich, J.N. (2024). 'Failure of the heart determination proteomic profiling related to patients who are elderly', *Research Focus*, 3(1), pp. 198-203.
12. Nodirovna, A.R., Maksudovna, M.M., Aslam, I. & Ergashboevna, A.Z. (2024). 'Evaluating novel anticoagulant and antiplatelet drugs for thromboembolic illness prevention and treatment', *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(5), pp. 135-141.
13. Shahzoda, K., Aslam, I., Ashraf, A., Ergashboevna, A.Z. & Ergashboevna, E.M. (2024). 'Advancements in surgical techniques: A comprehensive review', *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari*, 31(2), pp. 139-149.
14. Aslam, I. & Jiyanboyevich, Y.S. (2023). 'The common problem of international students and its solution and unexpected challenges of working with foreign teacher', *Internationalization of Medical Education: Experience, Problems, Prospects*, 66.
15. Nodirovna, A.R., Maksudovna, M.M., Aslam, I. & Ergashboevna, A.Z. (2024). 'Evaluating novel anticoagulant and antiplatelet drugs for thromboembolic illness prevention and treatment', *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(5), pp. 135-141.
16. Aslam, I., Jiyanboyevich, Y.S. & Rajabboevna, A.R. (2023). 'Apixaban vs Rivaroxaban blood thinner use reduced stroke and clot risk in patients with heart disease and arrhythmia', *Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior*, 14(2), pp. 883-889.
17. Aslam, I., Jiyanboyevich, Y.S. & Rajabboevna, A.R. (2023). 'Apixaban vs Rivaroxaban blood thinner use reduced stroke and clot risk in patients with heart disease and arrhythmia', *Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior*, 14(2), pp. 883-889.
18. Jiyanboyevich, Y.S., Aslam, I., Ravshanovna, M.U., Azamatovna, F.G. & Murodovna, J.D. (2021). 'Ventricular arrhythmias with congenital heart disease causing sudden death', *NVEO-Natural Volatiles & Essential Oils Journal*, pp. 2055-2063.

UDK: 616.833-002-085

YUZ NERVING YALLIG'LANISHI: KLINIKASI, ETIOLOGIYASI, DAVOLASH USULLARI

Ergashev Bekzod Jaloliddin o'g'li

Central Asian Medical University, O'zbekiston, Farg'ona, Burhoniddin Marg'inoniy

ko'chasi 64 uy, tel: +998 95 485 00 70, e-mail: info@camuf.uz

E-mail: bekzodergashev0401@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0382-0811>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15191487>

Annotatsiya: Yuz nervi falaji – bu VII bosh miya nervining periferik yoki markaziy shikastlanishi bilan yuz mushaklarining harakatining buzilishi bilan namoyon bo'ladigan klinik sindromdir. Periferik falaj holatlarida yuzning ta'sirlangan tomonida mimik mushaklarning to'liq yoki qisman harakatsizligi kuzatiladi, ko'z qovoqlari to'liq yopilmaydi, og'iz burchi pastga tushadi, peshonada ajinlar yo'qoladi. Markaziy falajda esa faqat pastki qismda motor buzilishlar bo'ladi, chunki peshona muskullari ikki tomonlama innervatsiya oladi. Yuz nervi falaji sabablari turlicha bo'lib, ular orasida Bell falaji (idiopatik), travmatik, virusli (masalan, Herpes simplex), otitga bog'liq va bosh miya ichki kasalliklariga aloqador bo'lgan holatlar mavjud.

Kasallikni tashxislashda klinik ko'rik, nevrologik testlar, elektromiografiya, MRT va KT usullari muhim ahamiyatga ega. Davolash esa sababga qarab farqlanadi: virusli yoki yallig'lanishli holatlarda antivirus, yallig'lanishga qarshi preparatlar va kortikosteroidlar qo'llaniladi; fizioterapiya va yuz mushaklariga mashqlar esa rehabilitatsiyada asosiy rol o'ynaydi. Ko'pchilik bemorlarda to'liq sog'ayish mumkin, ammo ba'zilarida doimiy asoratlarda (masalan, sinkineziya) qolishi mumkin.

Kalit so'zlar: yuz nervi falaji, "Bell" falaji, periferik falaj, markaziy falaj, elektromiografiya, fizioterapiya, nevrologik simptomlar, rehabilitatsiya.

FACIAL NERVE INFLAMMATION: CLINIC, ETIOLOGY, TREATMENT METHODS

Abstract: Facial nerve palsy is a clinical syndrome manifested by a violation of the movement of facial muscles with peripheral or central damage to the VII cranial nerve. In cases of peripheral paralysis, complete or partial immobility of the mimic muscles is observed on the affected side of the face, the eyelids do not close completely, the corner of the mouth drops down, and wrinkles on the forehead disappear. In central paralysis, motor disorders occur only in the lower part, since the muscles of the forehead receive bilateral innervation. The causes of facial nerve palsy are diverse, including Bell's palsy (idiopathic), traumatic, viral (for example, Herpes simplex), otitis media, and conditions associated with internal brain diseases.

Clinical examination, neurological tests, electromyography, MRI and CT methods are important in diagnosing the disease. Treatment varies depending on the cause: antivirals, anti-inflammatory drugs, and corticosteroids are used in viral or inflammatory cases; physiotherapy and facial muscle exercises play a key role in rehabilitation. Most patients can make a full recovery, but some may have permanent complications (such as synkinesia).

Keywords: facial nerve palsy, Bell's palsy, peripheral paralysis, central paralysis, electromyography, physiotherapy, neurological symptoms, rehabilitation.

ВОСПАЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА: КЛИНИКА, ЭТИОЛОГИЯ, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Аннотация: Паралич лицевого нерва — клинический синдром, характеризующийся нарушением движения мимических мышц вследствие периферического или центрального поражения VII черепного нерва. При периферическом параличе наблюдается полная или частичная неподвижность мимических мышц на пораженной стороне лица, веки закрываются не полностью, уголки рта опускаются, морщины на лбу исчезают. При центральном параличе двигательные нарушения возникают только в нижней части, поскольку мышцы лба получают двустороннюю иннервацию. Причины паралича лицевого нерва разнообразны, включая паралич Белла (идиопатический), травматический, вирусный (например, простой герпес), средний отит и состояния, связанные с внутренними заболеваниями мозга.

В диагностике заболевания важное значение имеют клиническое обследование, неврологические тесты, электромиография, МРТ и КТ. Лечение различается в зависимости от причины: в вирусных или воспалительных случаях используются противовирусные препараты, противовоспалительные препараты и кортикостероиды; Физиотерапия и упражнения для мышц лица играют ключевую роль в реабилитации. Большинство пациентов могут полностью выздороветь, но у некоторых могут возникнуть постоянные осложнения (например, синкинезия).

Ключевые слова: паралич лицевого нерва, паралич Белла, периферический паралич, центральный паралич, электромиография, физиотерапия, неврологические симптомы, реабилитация.

KIRISH

Yuz nervi falajlari nafaqat quloq, burun va tomoq (LOR) sohasi jarrohlari uchun, balki umumiy tibbiy amaliyotda ham tez-tez uchraydigan va dolzarb patologiyalardan biridir [1]. Yuz nervi muloqot va his-tuyg'ularni ifodalashda asosiy rol o'ynovchi tuzilma bo'lib, uning funksional buzilishi bemorning hayot sifatiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yuzdagi mushak zaifligi bilan shikoyat qilgan bemorni dastlabki baholashda asosiy e'tibor yuqori motor neyron (UMN) va pastki motor neyron (LMN) falajini farqlashga qaratiladi[2]. Chunki ushbu ikki turdagi falajning sabablari ham, davolash yondashuvlari ham bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Klinik tarix va ko'rik natijalarini yuz nervi anatomiyasi bilan solishtirgan holda, shifokor falajning mumkin bo'lgan sababini aniqlab, to'g'ri davolash yo'nalishini tanlay oladi.

Etiologiyasi:

1. Idiopatik falaj (Bell falaji) — 70% hollarda

Ko'pchilik hollarda yuz nervi falajining sababi noma'lum bo'lib, bu holat "Bell falaji" deb nomlanadi. Bu tashxis istisno usulida qo'yiladi. Kasallik 100 000 aholiga 10–40 holat to'g'ri keladigan darajada uchraydi [3]. U odatda bir tomonlama, pastki motor neyron shikastlanishi sifatida namoyon bo'ladi. Ayrim hollarda bemorlar virusli prodromal simptomlarni boshdan kechiradi. Bell falaji odatda to'satdan boshlanadi va 24–48 soat ichida to'liq namoyon bo'ladi [4]. Nerv suyakka o'ralgan kanal ichida shishib, siqilish natijasida ishemiyaga olib keladi, bu esa funksional yo'qotish bilan kechadi. Tiklanish jarayoni 1 yilgacha davom etishi mumkin, ammo bemorlarning 13% da to'liq tuzalish kuzatilmaydi.

2. Travmatik shikastlanishlar — 10–23% hollarda

Yuz nervi falaji chakka suyagining tosh qismidagi yoriqlar yoki yuz sohasidagi chuqur yaralar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Bunday travmalar katta kuch ta'sirida sodir bo'ladi. Klinik belgilar qatoriga gemotimpanum, jang izlari (Battle's sign), nistagmus kiradi. Chakka suyagi sinishlari odatda bir tomonlama bo'ladi va sinish yo'nalishiga ko'ra (uzunasiga yoki ko'ndalang) tasniflanadi. Yatrogenik shikastlanishlar — otologic [4], parotid bezi va akustik neyroma jarrohlik amaliyotlari vaqtida yuz nervi tasodifan shikastlanishi mumkin. Klinik tarzda bu holatlar cho'zilish, to'qnashish yoki to'g'ridan-to'g'ri kesilish natijasida ro'y beradi.

3. Infekcion sabablar. Virusli etiologiya (4,5–7% hollarda): Herpes zoster virusi yuz nervi genikulyar ganglionini zararlab, fasial falajga olib keladi (Ramsay Hunt sindromi) [6]. Virus ganglionda latent holatda qolib, reaktivatsiya bo'lishi mumkin. Ushbu sindrom otalgiya, tashqi eshituv yo'li va yumshoq tanglayda toshmalar bilan namoyon bo'ladi. Ramsay Hunt sindromiga chalingan bemorlarning 40% gacha bo'lgan qismida VIII bosh miya nervi (vestibulokoxlear nerv) ham zararlanib, bosh aylanishi rivojlanadi. Bakterial infektsiyalar: O'tkir otit media yuz kanalida suyak dehisseyasiga olib kelib, yuz nervi falajiga sabab bo'lishi mumkin. Xolesteatoma yoki nekrotik tashqi otit ham yuz nervining shikastlanishiga olib keladi. Lyme kasalligi: Bu infekcion kasallik ham yuz nervi falajiga sabab bo'lishi mumkin. Kasallikni yuqtirgan shomil chaqishidan 1–2 hafta o'tgach, charchoq, bosh og'rig'i, artralgiyalar va "eritema migrans" belgisi paydo bo'ladi. Ayrim holatlarda yurak (mioperikardit) va bo'g'imlar ham jarayonga qo'shiladi. IgM va IgG serologik tekshiruvlari diagnostikada muhim ahamiyatga ega [8]. Eritema migrans va chet elga chiqish tarixi mavjud bemorlarda Lyme kasalligini istisno qilish maqsadida darhol laborator tekshiruvlar o'tkazilishi zarur.

Neoplaziya (2,2–5%). Yuz nervi falajining sekin-asta rivojlanishi yomon xulqli (malign) o'smaga shubha uyg'otadi va bemorda bosh va bo'yin sohasining to'liq tekshiruvini o'tkazishni talab qiladi. Yuz nervi falajiga olib kelishi mumkin bo'lgan malign neoplaziyalar orasida parotid bezining saratoni, yuz va akustik nevromalar, meningioma hamda araknoid kistalar mavjud. Bu holatlar yuz nerviga o'smalarning joylashuviga qarab turlicha darajada va ko'rinishda falajni yuzaga keltirishi mumkin.

Bolalarda yuz nervi falaji. Bolalarda yuz nervi falaji tug'ma yoki orttirilgan etiologiyaga ega bo'lishi mumkin. Orttirilgan sabablar kattalardagi etiologiyaga o'xshash bo'lib, yuqorida sanab o'tilgan omillar bolalar uchun ham xosdir [7].

Tug'ma sabablarga quyidagilar kiradi: Travmatik omillar: qiyin tug'ruq, forseps bilan tug'ish, erta tug'ilish yoki sezaryen yo'li bilan amalga oshirilgan tug'ruq. Sindromli holatlar: Moebius sindromi, Goldenhar sindromi, syringobulbiya, Arnold–Chiari malformatsiyasi kabi kraniofasial anomaliyalarda uchraydi.

Genetik omillar: irsiy miopatiyalar – miasteniya va miotonik distrofiya (3q21-22 va 10q21.3–22.1 xromosoma joylashuvi) yuz nervi falajining irsiy shakllari sifatida tasniflanadi [6]. Shuni ta'kidlash joizki, labirint segmentidagi yuz nervini jarrohlik yo'li bilan dekompressiya qilish pediatrik holatlarda tavsiya etilmaydi. Sababi, ushbu usulning foydasi isbotlanmagan va protsedura eshitish qobiliyatining yo'qolish xavfi bilan bog'liq [7,8]. Biroq, nerv transplantatsiyasi yoki mushak transplantatsiyasi kabi muqobil usullar pediatrik bemorlar uchun davolash varianti sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Ikki tomonlama yuz nervi falaji

Ikki tomonlama yuz nervi falaji kam uchraydigan, ammo klinik jihatdan muhim holat bo'lib, barcha yuz falajlarining 0,3–2% hollari orasida qayd etiladi [8]. Ushbu falaj holatida tizimli kasalliklar ehtimoli yuqori bo'ladi.

Etiologik sabablar quyidagilar bo'lishi mumkin:

Idiopatik: 20% hollarda sabab topilmaydi. Infekzion: Lyme kasalligi ikki tomonlama falaj holatlarining 35% ni tashkil qiladi. Autoimmun: Guillain–Barre sindromi, sarkoidoz. Metabolik: qandli diabet. Nevrologik: Parkinson kasalligi, ko‘p skleroz, psevdobulbar/bulbar falaj [9].

Epidemiologiya. Ko‘pgina hollarda yuz nervi falaji idyopatik xarakterga ega bo‘lsa-da, har bir klinisyen bu holat ortida serebrovaskulyar hodisa yoki boshqa og‘ir patologiyalar yashirin bo‘lishi mumkinligini istisno qilmasligi kerak [10].

Yuz nervi falaji har qanday yosh, jins va irq vakillarida uchrash mumkin. Ammo bu holat eng ko‘p 15 yoshdan 45 yoshgacha bo‘lgan shaxslarda qayd etiladi [11].

Yuz nervi falajining etiologik tarqalish statistikasi quyidagicha: Idiopatik (Bell falaji) – ~70% Travmatik sabablar – 10–23% Virusli infeksiyalar – 4,5–7% Neoplaziyalar – 2,2–5% [12].

Patofiziologiya. Yuz nervi falajining rivojlanish mexanizmi uning sababiga bog‘liq. Fasial nerv intratemporal (ichki chakka sohasida) joylashgan tor suyak kanali orqali o‘tadi. Har qanday yallig‘lanish yoki o‘sma nervga bosim o‘tkazib, uni siqadi va ishemik o‘zgarishlarga olib keladi. Ayniqsa, labirint segmenti eng tor qism bo‘lgani uchun, bu sohada siqilish ko‘proq uchraydi.

Bundan tashqari, suyakning anatomik anomaliyalari yoki travmatik shikastlanishlar ham yuz nervi va suyak kanali o‘rtasidagi muvozanatni buzib, falajga olib keladi. Ayrim iatrogenik sabablar, masalan, akustik nevroma jarrohligi vaqtida yuzaga keladigan cho‘zilish kuchlari ham falaj rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin [13].

Jismoniy ko‘rik. Virusli prodromal davr va yuz nervi falaji bilan shikoyat qilgan bemorning klinik tarixi Bell falaji yoki Ramsay Hunt sindromi (RHS) tashxisini ko‘rsatishi mumkin. Bemorning vesikulyar toshmalar (pufakchali toshmalar) bor yoki yo‘qligi haqidagi ma’lumotlar ushbu ikki holatni differensial tashxislashda muhim ahamiyatga ega.

Yaxshi otologik anamnez (masalan, otalgiya, quloq oqindisi, eshitish qobiliyatining pasayishi, quloqda bosim hissi, tinnitus, bosh aylanishi) bemorda tashqi yoki o‘rta otit borligini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, bu ma’lumotlar akustik nevroma yoki xolesteatoma tashxisini aniqlashtirishda muhimdir. Nevrologik tarix esa yuqori motor neyron (UMN) lezyonlariga sabab bo‘luvchi holatlarni aniqlash imkonini beradi [14].

Jismoniy ko‘rik. Yuz harakatlarini tekshirish orqali yuqori (peshona saqlanadi) va pastki (butun yuz ta’sirlangan) motor neyron lezyonlarini farqlash mumkin. Yuz nervi falajining darajasi House–Brackmann baholash tizimi orqali aniqlanadi [13]: Muhim farq 3 va 4-sinflar o‘rtasida – bu ko‘zning to‘liq yopilishi yoki yopilmasligida namoyon bo‘ladi.

Yuz nervi shikastlanishini aniqlashda qo‘llaniladigan qo‘shimcha testlar: Miltillash testi (shox parda refleksi): Glabellaga yengil bosilganda, ta’sirlangan tomonda miltillash yo‘qoladi. Bu trigeminal nervning oftalmik shoxining afferent, yuz nervining esa efferent rol o‘ynashini tasdiqlaydi.

Schirmer testi: Ko‘z yoshi bezlari faoliyatini baholaydi. Pastki kon’yunktival bo‘shliqqa joylashtirilgan maxsus qog‘oz tasmasi yordamida bajariladi. Agar ta’sirlangan tomonda lakrimatsiya 75% ga kamaygan bo‘lsa, bu yuz nervining genikulyar ganglion darajasida shikastlanganini bildiradi [9]. Diqqatga sazovor jihat – bir tomonlama lezyon ham ikki tomonlama lakrimal yetishmovchilikka olib kelishi mumkin.

Stapedius mushagi refleksi: Yuqori intensiv tovush ta’sirida yuzaga keladi. Yuz nervi orqali vositalanadi. Buni timpanometriya yordamida aniqlash mumkin.

So‘lak ajralish testi: 6% limon kislotasi bilan og‘zaki stimulyatsiya qilingach, submandibulyar kanal orqali so‘lak miqdori baholanadi. Agar ta’sirlangan tomonda so‘lak ajralishi

25% ga kamaygan bo'lsa, bu chorda tympani nervining ildiz yoki proksimal qismida lezyon borligini ko'rsatadi.

Ta'mni tekshirish: Tilning oldingi 2/3 qismining lateral tomonlarida shirin, nordon va achchiq ta'm moddalari yordamida amalga oshiriladi. Musbat natija – chorda tympanining ildiz yoki proksimal qismlarida shikastlanish borligidan dalolat beradi [8].

Qo'shimcha tekshiruvlar. Quloqning tashqi ko'rigi: Tashqi otit, o'rta otit, surunkali otit yoki xolesteatoma bor-yo'qligini aniqlash zarur. Quloqdagi pufakchalar (vesikulalar) mavjudligi Ramsay Hunt sindromini ko'rsatadi. Parotid bezini palpatsiya qilish: Parotid maligniteti mavjudligini aniqlash uchun amalga oshiriladi. Og'iz bo'shlig'i tekshiruvi: Parafaringeal o'smalar yoki vesikulyar portlashlar borligini aniqlash muhim.

Ko'z muhofazasi: Ko'zni yopish funksiyasini baholash zarur. Agar bemor ko'zini to'liq yopa olmasa, shoshilinch ravishda oftalmologga yuborilishi, hamda ko'zni namlash va himoya qilish choralari ko'rish tavsiya etiladi.

Baholash: Laborator tekshiruvlar (Qon tahlillari): Yuz nervi falajining yuqumli sababi bo'lishi mumkin bo'lgan bemorlar uchun quyidagi qon tahlillari muhim hisoblanadi:

To'liq qon tahlili (TQT) Karbamid va elektrolitlar (K&E) C-reaktiv oqsil (CRP) Bu testlar organizmdagi yallig'lanish darajasi va umumiy sog'liq holatini baholashda yordam beradi.

Varicella-zoster virusiga (VZV) qarshi antikor titrlari – Ramsay Hunt sindromi (RHS) bo'lishi mumkin bo'lgan bemorlarda yuqori bo'ladi.

Lyme kasalligida esa IgG va IgM antikorlarining ko'tarilishi kuzatiladi.

Maxsus tekshiruvlar: Audiogramma – Eshitish qobiliyatidagi buzilish turini va darajasini aniqlash uchun yarim shoshilinch tarzda o'tkazilishi zarur. Elektrofiziologik testlar – Bu testlar prognoz bahosida muhim, biroq: Ular qimmat

Ko'p	vaqt	talab	qiladi
------	------	-------	--------

Foydali bo'lishi uchun simptomlar boshlangandan 3 hafta ichida bajarilishi kerak [14]

Turlari:

1. Minimaldan maksimalgacha stimulyatsiya testi:

Yuz nervi past oqim bilan stimulyatsiya qilinadi va maksimal javobga (yoki bemorning toqat chegarasiga) yetguncha kuchaytiriladi. Javob to'rt darajali tizim asosida baholanadi va ta'sirlanmagan tomon bilan solishtiriladi.

Ikkala tomon o'rtasida yaqqol farq bo'lsa – test ijobiy hisoblanadi.

2. Elektroneurografiya (ENoG): Mushaklar harakat potentsialining amplitudasini o'lchaydi. Yuz nervining stilomastoid teshigi darajasida stimulyatsiya qilinib, nazolabial burma yaqinida javob o'lchanadi. So'ngra bu javob sog' tomon bilan solishtiriladi. ENOG – falaj darajasini baholashda eng aniq test hisoblanadi.

3. Elektromiyografiya (EMG): Yuz mushaklarida fibrillatsiya potentsiallarini aniqlaydi. Bu potentsiallar taxminan 3 haftalik denervatsiyadan so'ng paydo bo'ladi, shuning uchun test o'z vaqtida bajarilishi lozim.

4. Magnit stimulyatsiya (Transkraniyal stimulyatsiya):

Bu usul yordamida yuz nervining intratemporal va miya sopi qismlari baholanadi. Test Vallerian degeneratsiyasi boshlanishidan oldin bajarilishi zarur, chunki bu degeneratsiya natijalarga ta'sir qiladi. Ushbu usul aksonal yaxlitlik saqlanib qolgan hollarda foydali bo'lib, lezyon joyidagi blokirovkani kuchli stimulyatsiya bilan yengib o'tish imkonini beradi.

Tasvirlash tekshiruvlari: 1. KT (Kompyuter tomografiya):

Tashqi nekrotik otit, o'rta quloq infeksiyasi, bosh shikastlanishi yoki malign o'smaga shubha qilingan hollarda temporal suyaklarni baholash uchun bajariladi.

2. MRI (Magnit-rezonans tomografiya): Intratemporal lezyonlarni aniqlashda foydalidir. Ayniqsa serebellopontin burchakni vizualizatsiya qilishda samarali.

MRI yordamida genikulyar ganglion atrofidagi yuz nervining giperintensiv kuchayishi ham aniqlanishi mumkin, bu yallig'lanish yoki shish belgisi bo'lishi mumkin.

Davolash / Boshqarish:

Konservativ yondashuv

Ko'z parvarishi:

Yuz nervi falaji natijasida ko'zning to'liq yopilmasligi shox parda yarasi va keratit xavfini oshiradi. Sun'iy ko'z yoshlar, ko'zni moylash, va tunda ko'zni yopishtirib qo'yish orqali ko'zni himoya qilish muhim Oftalmologga murojaat qilish tavsiya etiladi. Yuz mushaklarini mashq qilish va massaj qilish: Yuz nervi falajiga uchragan bemorlar uchun bu muhim reabilitatsiya usuli hisoblanadi.

Natija: Yuz nervi falaji – klinik amaliyotda tez-tez uchraydigan nevrologik sindromlardan biri bo'lib, mimik mushaklar harakatining buzilishi bilan tavsiflanadi. Yuz nervining periferik zararlanishida yuzning bir tomonida mimik harakatlar butunlay yo'qoladi, ko'z qovoqlari to'liq yopilmaydi, lab burchagi pastga tushadi. Bunday holatda bemor gapirganda, ovqatlanganda yoki kulganda sezilarli muammolarni boshdan kechiradi. Markaziy falaj esa ko'pincha miya po'stlog'i yoki kortikospinal yo'llarning zararlanishi bilan bog'liq bo'lib, faqat pastki mimik mushaklarga ta'sir qiladi.

Yuz nervi falaji sabablari orasida Bell falaji eng ko'p uchraydi, bu holatning etiologiyasi to'liq o'rganilmagan bo'lsa-da, virusli infeksiyalar, sovuq ta'siri va immun reaksiyalar bilan bog'liq deb hisoblanadi. Tashxislash uchun klinik simptomlarni aniqlash, elektromiografiya, MRT, bosh miyaning KT tekshiruvlari muhimdir. Davolash simptomatik va etiotropik bo'lishi kerak. Kortikosteroidlar, antivirus preparatlar, massaj, fizioterapiya, mimik mashqlar keng qo'llaniladi. Davolash vaqtida ko'z himoyasiga alohida e'tibor qaratilishi kerak, chunki ko'zning yopilmasligi natijasida keratit rivojlanishi mumkin.

Vaqtida tashxis qo'yilib, to'g'ri davolovchi choralar ko'rilsa, bemorlarning 70–80%ida yuz nervi funksiyasi to'liq tiklanadi. Biroq, ayrim hollarda asoratlar, ayniqsa sinkineziya (bir mushak harakati bilan boshqa mushakning ixtiyorsiz harakati) saqlanib qoladi. Shuning uchun har bir holatda individual yondashuv muhim.

XULOSA

Yuz nervi falaji murakkab patogenezga ega bo'lgan, turli sabablarga ko'ra yuzaga keladigan va bemorning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradigan nevrologik holatdir. Uning diagnostikasi klinik simptomlar, funksional va instrumental tekshiruvlarga asoslanadi. Davolash strategiyasi esa sababga qaratilgan bo'lib, erta boshlangan kompleks terapiya tiklanish imkoniyatini oshiradi. Ko'pchilik holatlarda to'liq tuzalish mumkin bo'lsa-da, ayrim bemorlarda uzoq davom etuvchi asoratlar rivojlanishi mumkin. Shu sababli yuz nervi falaji holatlarini erta aniqlash, to'g'ri baholash va samarali reabilitatsiya choralari amalga oshirish katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Chjan Y, Lei Y, Nobbs A, Khammanivong A, Herzberg MC: Streptococcus gordonii SspAB ning inaktivatsiyasi bir nechta adezin genlarining ifodasini o'zgartiradi. Immunitetni yuqtirish. 2005, 73: 3351-3357.
2. Ergashev Bekzod. Gingivitning bakteriologik etiologiyasi va profilaktikasi. International Scientific Conference "Innovative Trends in Science, Practise and Education", 1 (1), 122 – 128.
3. 2 BJ Schlosser. Oral manifestations of hematological and nutritional disorders. Journal of Otolaryngol Clin N Am, (2011), pp. 78 – 98.
4. Ergashev Bekzod. STOMATOLOGIYADA TISH KARIESI: ETIOLOGIASI, DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH USULLARI, Modern Science and Research, 4 (3), 821-828.
5. Ergashev Bekzod, PULPITNING ETIOLOGIYASI, PATOGENEZI, MORFOLOGIYASI VA KLINIK SIMPTOMLARI, Modern Science and Research, 4 (3), 829 - 838,
6. Ergashev Bekzod, Bemorlar psixologiyasi va muloqot ko'nikmalari. New renaissance 2025. 3: 151-156.
7. Эргашев Бекзод. Этиология инфекционных заболеваний тканей пародонта. 2025. 2: 31-35.
8. A Sun. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarida qon tekshiruvi zarur. J Formos Med Dots jurnali, (2016), 34 - 42 betlar.
9. BJ Schlosser. Gematologik va ovqatlanish kasalliklarining og'iz orqali namoyon bo'lishi. Otolaringol Clin N Am jurnali, (2011), 78 - 98 betlar.
10. C Scully. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining kasalligi: takroriy aftoz stomatit. Br J Oral Maxillofac Surg jurnali, (2008), 76 - 88 betlar,
11. Loos, B. G., & Van Dyke, T. E. (2020). *The role of inflammation and genetics in periodontal disease*. Periodontology 2000, 83(1), 26-39.
12. Kinane, D. F., Stathopoulou, P. G., & Papapanou, P. N. (2017). *Periodontal diseases*. Nature Reviews Disease Primers, 3(1), 17038.
13. Offenbacher, S., Barros, S. P., & Beck, J. D. (2008). *Rethinking periodontal inflammation*. Journal of Periodontology, 79(8 Suppl), 1577-1584.
14. PC Adams. A diagnostic approach to non-high transferrin saturation hyperferritinemia, Journal of J Hepatol, (2011), pp. 32 - 51.
15. Ergashev Bekzod, TISH EMAL PRIZMALARIGA YOPISHIB OLGAN TISH BLYASHKA MATRIXNING MIKROBIOLOGIYASI VA TARKIBI, Modern Science and Research, 4 (3), 815 - 820,
16. Ergashev Bekzod. (2024). Sirkon dioksid qoplamalari va materialining klinik laborator ahamiyati. Journal of Uzbekistan's Development and Research (JUDR). 1(1). 627- 632.
17. Ergashev Bekzod. (2023). Tish toshlari. tishda tosh to'planishining sabablari va ularni oldini olish usullari aholi o'rtasida ommalashgan savollarga to'liq javob berish va ommaga tadbqiq etish. models and methods for increasing the efficiency of innovative research. 1(2). 67 - 75.
18. Wade V: Og'iz biofilmlarida o'stirilmaydigan bakteriyalar. Tish blyashka qayta ko'rib chiqildi. Salomatlik va kasallikdagi og'iz biofilmlari. Tahrirlangan: Newman HN, Wilson M. 1999, Cardiff: BioLine, 313-322

UDK: 616.833-002-085-089

UCH SHOXLI NERVNING YALLIG'LANISHI: KLINIKASI, ETIOLOGIYASI VA DAVOLASH USULLARI

Ergashev Bekzod Jaloliddin o'g'li

Central Asian Medical University, O'zbekiston, Farg'ona, Burhoniddin Marg'inoniy ko'chasi 64
uy, tel: +998 95 485 00 70, e-mail: info@camuf.uz

E-mail: bekzodergashev0401@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0382-0811>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15191396>

Annotatsiya: Trigeminal (uch shoxli) nevrалgiya (TN) – bu trigeminal asabni zararlanishi natijasida yuzaga keladigan, yuz sohasida to'satdan boshlanadigan va nihoyatda kuchli og'riqlar bilan ifodalanadigan surunkali og'riqli asab kasalligidir. Ushbu holat, ayniqsa, 50 yoshdan oshgan ayollarda ko'proq uchraydi, biroq har qanday yoshda, hatto bolalarda ham kuzatilishi mumkin. Og'riq ko'pincha yuzning bir tomonida yuz beradi va qisqa muddatli bo'lsa-da, tez-tez takrorlanadi. TN uchta asosiy turga bo'linadi: klassik (qon tomiri bosimi), ikkilamchi (boshqa kasalliklar natijasida), va idyopatik (aniq sababsiz). Tashxis qo'yish MRI va nevrologik tekshiruvlar orqali amalga oshiriladi. Davolashda antikonvulsant dorilar, masalan, karbamazepin va gabapentin asosiy rol o'ynaydi. Dorilar yordam bermagan hollarda mikrovaskulyar dekompressiya, rizotomiya va stereotaktik radiojarrohlik kabi jarrohlik usullari qo'llaniladi. Qo'shimcha davolash sifatida yoga, akkupunktura, biofeedback va B12 vitamin terapiyasi foydali bo'lishi mumkin. Trigeminal nevrалgiya bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar neyropatik og'riq mexanizmlarini chuqur tushunish va yangi davolash usullarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Ushbu ma'lumotlar TNni yaxshiroq anglash va samarali davolash strategiyalarini tanlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Trigeminal nevrалgiya, trigeminal asab, yuz og'rig'i, antikonvulsant dorilar, mikrovaskulyar dekompressiya, rizotomiya, radiojarrohlik, neyropatik og'riq, TN turlari, qo'shimcha terapiya, MRI, karbamazepin, biofeedback, B12 vitamini.

НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА: КЛИНИКА, ЭТИОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Аннотация: Невралгия тройничного нерва (НТН) — хроническое болезненное заболевание нерва, характеризующееся внезапным началом и чрезвычайно сильной болью в области лица, возникающей в результате повреждения тройничного нерва. Это заболевание особенно распространено среди женщин старше 50 лет, но может возникнуть в любом возрасте, даже у детей. Боль часто возникает на одной стороне лица и, хотя и длится недолго, часто повторяется. Невропатия делится на три основных типа: классическая (из-за артериальной гипертензии), вторичная (из-за других заболеваний) и идиопатическая (без четкой причины). Диагностика проводится с помощью МРТ и неврологического обследования. Противосудорожные препараты, такие как карбамазепин и габапентин, играют ключевую роль в лечении. Когда медикаментозное лечение не помогает, применяются хирургические методы, такие как микрососудистая декомпрессия, ризотомия и стереотаксическая радиохирургия. В качестве дополнительных методов лечения могут быть полезны йога, иглоукалывание, биологическая обратная связь и терапия витамином В12. Научные исследования невралгии тройничного нерва направлены на более глубокое понимание механизмов нейропатической боли и разработку новых

методов лечения. Эта информация позволит лучше понять ТН и выбрать эффективные стратегии лечения.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, тройничный нерв, лицевая боль, противосудорожные препараты, микрососудистая декомпрессия, ризотомия, радиохирurgia, невропатическая боль, типы ТН, дополнительная терапия, МРТ, карбамазепин, биологическая обратная связь, витамин В12.

TRIGEMINAL NEURALGIA: CLINICAL FEATURES, ETIOLOGY AND TREATMENT METHODS

Abstract: Trigeminal neuralgia (TN) is a chronic painful neuralgia caused by damage to the trigeminal nerve, characterized by sudden onset and extremely severe pain in the facial area. This condition is especially common in women over 50 years of age, but can occur at any age, even in children. The pain often occurs on one side of the face and, although short-lived, is often recurrent. TN is divided into three main types: classic (due to vascular pressure), secondary (due to other diseases), and idiopathic (without an obvious cause). Diagnosis is made by MRI and neurological examinations. Anticonvulsant drugs, such as carbamazepine and gabapentin, play a key role in treatment. In cases where medications do not help, surgical methods such as microvascular decompression, rhizotomy, and stereotactic radiosurgery are used. Yoga, acupuncture, biofeedback, and vitamin B12 therapy may be helpful as adjunctive treatments. Ongoing research into trigeminal neuralgia is focused on understanding the mechanisms of neuropathic pain and developing new treatments. This information will help us better understand TN and select effective treatment strategies.

Keywords: Trigeminal neuralgia, trigeminal nerve, facial pain, anticonvulsant drugs, microvascular decompression, rhizotomy, radiosurgery, neuropathic pain, types of TN, adjunctive therapy, MRI, carbamazepine, biofeedback, vitamin B12.

KIRISH

Yuz nervi falajlari quloq, burun va tomoq (QBT) sohasida faoliyat yurituvchi jarrohlar uchun, shuningdek, umumiy amaliyot shifokorlari uchun ham tez-tez uchraydigan va klinik jihatdan ahamiyatli holat hisoblanadi. Yuz nervi (nervus facialis) nafaqat muloqot qilishda, balki hissiy holatlarni ifodalashda ham asosiy rol o'ynaydi. Shu sababli, ushbu nerv faoliyatining buzilishi bemorning hayot sifatiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. [1]

Yuz sohasida mushaklar zaifligi bilan murojaat qilgan bemorni dastlabki baholashda asosiy qadam — bu yuqori motor neyron (UMN) va pastki motor neyron (LMN) falajlarini farqlashdir[2]. Chunki bu ikki holatning etiologiyasi, klinik manzarasi va shunga mos davolash yondashuvlari bir-biridan tubdan farq qiladi. Klinik tekshiruv davomida anatomik bilimlarni to'g'ri qo'llash orqali shifokor yuz nervi falajining asosiy sababini aniqlashi mumkin[3]. Bu esa keyingi diagnostika bosqichlarini to'g'ri rejalashtirish va maqsadli davolash choralarini qo'llash imkonini beradi.

Trigeminal nevralgiya (TN), shuningdek, tic douloureux nomi bilan ham tanilgan, yuzda kuchli og'riqning to'satdan boshlanuvchi xurujlari bilan kechadigan surunkali og'riqli asab kasalligidir. Bu holat trigeminal asabga (beshinchi bosh miya nervi) ta'sir qiladi. Ushbu asab bosh va yuz qismlariga hissiy signal uzatishda muhim rol o'ynaydi[4]. Og'riq xurujlari odatda bir necha soniyadan ikki daqiqagacha davom etadi va kun davomida bir necha bor takrorlanishi mumkin.

TN neyropatik og'riq turi hisoblanadi, ya'ni bu asabga yetgan shikastlanish yoki lezyon (zararlanish) natijasida yuzaga keladi.

ASOSIY QISM

TNning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

To'satdan boshlanadigan, juda kuchli, ko'pincha yuzning bir tomonida seziladigan zarba yoki pichoqlovchi og'riq;

Og'riq xurujlari orasida yonish, zonklash (urib turuvchi og'riq), uvishish, qichishish yoki doimiy zerikarli og'riq;

Og'riq jismoniy va ruhiy jihatdan juda og'ir kechishi mumkin.

TN xurujlari odatda bir muddatga to'xtab, keyinchalik yana qaytalanadi. Og'riq quyidagi holatlarda qo'zg'alishi mumkin: yuzga engil teginish (masalan, soqol olish, yuzni yuvish, bo'yanish), tishlarni yuvish, burunni artish, ovqatlanish, ichish, gapirish yoki shamol ta'sirida[5]. Og'riq yuzning kichik bir qismida bo'lishi yoki kengroq hududga tarqalishi mumkin. Uyqu paytida og'riq juda kam hollarda yuz beradi. Ba'zi hollarda kasallik progressiv shaklga o'tishi mumkin, ya'ni xurujlar vaqt o'tishi bilan kuchayadi, uzoqroq davom etadi va tez-tez takrorlanadi[6]. Progressiv TN bo'lgan bemorlar ba'zida doimiy og'riqni his qilishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan ba'zi dorilar og'riqni nazorat qilishda samarasiz bo'lib qolishi mumkin[6]. Trigeminal nevralgiya odatda 50 yoshdan oshgan odamlarda uchraydi, biroq u har qanday yoshda, hatto chaqaloqlarda ham kuzatilishi mumkin. Kasallik ayollarda erkaklarga nisbatan ko'proq uchraydi[7].

Trigeminal nervlar nima va ular qanday ishlaydi?

Trigeminal nervlar — bu bosh miya va miya poyasini yuzning turli qismlari bilan bog'laydigan juft kranial (bosh miya) nervlar bo'lib, ular yuzning sezuvchanligini boshqaradi[7]. Trigeminal nerv beshinchi bosh miya nervi hisoblanadi va u uchta asosiy shoxga ega bo'lib, yuzning yuqori, o'rta va pastki qismlaridan sezgi signallarini qabul qiladi va uzatadi.

Trigeminal nervning uchta asosiy shoxi:

1. Oftalmik (yuqori) shox. Bu shox bosh terisi, peshona va boshning old qismini sezuvchan nervlar bilan ta'minlaydi.

2. Maksillyar (o'rta) shox. Ushbu shox yonoqlar, yuqori jag', yuqori lab, tishlar, milkar va burunning yon tomonlaridan sezgi signallarini uzatadi.

3. Mandibulyar (pastki) shox. Bu shox pastki jag', pastki tish va milkar, pastki labning sezuvchanligini ta'minlaydi.

Trigeminal nevralgiya (TN) qaysi sohalarga ta'sir qiladi?

TN holatida bir yoki bir nechta nerv shoxlari zararlanishi mumkin. Ko'pincha maksillyar yoki mandibulyar shox ta'sirlanadi. Agar oftalmik shox ta'sirlangan bo'lsa, ko'zda qizarish yoki tushunarsiz ko'z yoshlar ajralishi og'riq xurujlari bilan birga kuzatilishi mumkin[8]. Kam hollarda, yuzning ikkala tomoni ham ta'sirlanishi mumkin. Bu holat ikki tomonlama trigeminal nevralgiya deb ataladi va u odatdagi TNdan kamroq uchraydi.

Trigeminal nevralgiya turlari

Trigeminal nevralgiya (TN) turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin va shu asosda uch asosiy turga bo'linadi:

1. Klassik TN. Bu TNning eng keng tarqalgan shakli bo'lib, odatda qon tomiri (ko'pincha yuqori serebellar arteriya) trigeminal nerv ildizining bir qismini bosib turishi natijasida yuzaga keladi[3].

2. Ikkilamchi TN. Bu turdagi nevralgiya boshqa kasalliklar natijasida kelib chiqadi. Masalan: ko'p skleroz, o'sma, yoki arteriovenoz malformatsiya kabi holatlar[7]. Ikkilamchi TN

bilan og‘rigan bemorlar odatda yoshroq bo‘ladi va yuzning har ikki tomonida og‘riq kuzatilishi mumkin. Trigeminal nevralgiya holatlarining taxminan 15% ikkilamchi turga to‘g‘ri keladi.

3. Idyopatik TN. Agar to‘liq diagnostik baholash o‘tkazilgandan keyin ham aniq sabab aniqlanmasa, bu tur idyopatik TN deb ataladi. U TNning eng kam uchraydigan shaklidir.

Trigeminal nevralgiya qanday tashxislanadi va davolanadi?

Tashxis (diagnostika). Tibbiy mutaxassis tashxis qo‘yishda quyidagilarga e‘tibor beradi: To‘liq tibbiy tarix va simptomlar tahlili; Nevrologik tekshiruv; MRI (magnit-rezonans tomografiya) orqali trigeminal asabdagi bosim yoki boshqa strukturaviy o‘zgarishlarni aniqlash; TNga o‘xshash simptomlarni keltirib chiqaradigan boshqa kasalliklarni istisno qilish. Davolash odatda dori-darmonlar bilan boshlanadi. Agar dorilar yetarli samara bermasa yoki kuchli yon ta’sirlar keltirib chiqarsa, jarrohlik aralashuvi tavsiya qilinadi. Ba’zi hollarda qo‘shimcha muolajalar ham qo‘llaniladi[6].

Trigeminal nevralgiya uchun dorilar. TNni boshqarishda yordam beruvchi asosiy dorilar:
1. **Antikonvulsant dorilar.** Ular og‘riq signallarini bloklaydi va xurujlar sonini kamaytiradi. Eng ko‘p qo‘llaniladiganlar:

Davolash usullari

Karbamazepin, Okskarbazepin, Gabapentin, Pregabalin, Lamotrigin, Topiramet, Fenitoin Agar bitta dori yetarli samara bermasa, bir nechta dorilar birgalikda qo‘llanishi mumkin.

2. Boshqa dorilar

Antikonvulsantlar samarasiz bo‘lsa yoki yon ta’siri sezilarli bo‘lsa, quyidagilar sinab ko‘riladi:

Baklofen. Botulinum toksin A (Botox)

4. **Oddiy og‘riq qoldiruvchi dorilar.** Masalan, aspirin, ibuprofen yoki opioidlar (gidrokodon va boshqalar) — odatda TNni davolashda foydasiz hisoblanadi.

Trigeminal nevralgiya uchun jarrohlik muolajalari

Agar dorilar og‘riqni kamaytira olmasa yoki kognitiv buzilishlar, xotira yo‘qolishi, charchoqlik, suyak iligi faoliyatining susayishi, allergik reaksiyalar kabi kuchli nojo‘ya ta’sirlar kuzatilsa, shifokorlar jarrohlik davolash usullarini tavsiya qilishi mumkin[10]. Trigeminal nevralgiya (TN) ba’zida progressiv kechadi, ya’ni vaqt o‘tishi bilan dori vositalariga nisbatan samarasiz bo‘lishi mumkin. Shu sababli, jarrohlik aralashuvi TN xurujlarining oldini olishda muhim rol o‘ynaydi[10,11,12].

Jarrohlik usulini tanlashda quyidagilar hisobga olinadi:

Og‘riqning xususiyati va og‘irlik darajasi, Bemorning umumiy sog‘lig‘i, qon bosimi, shaxsiy istaklari va ilgari o‘tkazgan operatsiyalari, Ko‘p skleroz kasalligining mavjudligi, Qaysi trigeminal nerv shoxi (ayniqsa oftalmik) ko‘proq zararlangani, Aksar jarrohlik muolajalaridan so‘ng yuzning xiralashuvi yoki hissiyotning yo‘qolishi yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, muvaffaqiyatli muolajadan so‘ng ham TN qaytalanish ehtimoli mavjud[14]. Har qanday jarrohlikda bo‘lgani kabi, TNni davolashdagi muolajalarda ham ba’zi xavf va asoratlar bo‘lishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi: Eshitish qobiliyatining yo‘qolishi, Muvozanat muammolari, Miya suyuqligining oqishi, Infeksiya, Anesteziya dolorosa (yuz yoki og‘izda doimiy, kuchli og‘riq), Juda kam hollarda — insult,

TNni davolashda qo‘llaniladigan asosiy jarrohlik muolajalar:

1. Mikrovasulyar dekompressiya (MVD) Bu TN uchun eng invaziv (murakkab), ammo eng samarali jarrohlik usulidir. Ushbu operatsiya davomida shifokor asabga bosim qilayotgan qon

tomirni asabdan ajratadi yoki u bilan aloqasini yo'qotadi[13]. MVDning maqsadi — asabni saqlab qolish, ya'ni yuzda hissiyot yo'qolishini oldini olishdir[17]. Uzoq muddatli og'riqni bartaraf etishda eng samarali usul hisoblanadi.

2. Rizotomiya (Rizoliz) Bu usulda trigeminal asabning og'riq yuboruvchi tolalari shikastlantiriladi, shuning evaziga og'riq yo'qoladi. Ushbu muolaja yuzda uyquchanlik va sezuvchanlikning yo'qolishiga olib keladi. Rizotomiyaning turlari: Balonni siqish, Glyserin in'ektsiyasi, Radiochastotali termal destruksiya, Stereotaktik radiojarrohlik (Gamma Knife),

Bu usullar odatda bir necha yilga og'riqni kamaytiradi, biroq uzoq muddatda TN qaytalanishi mumkin.

3. Radiojarrohlik (stereotaktik radiosurgiya)

Bu noinvaziv usul bo'lib, nurlanish orqali trigeminal asabning muayyan qismini nishonga oladi. Operatsiya bemor uchun og'riqsiz va odatda ambulator sharoitda bajariladi. Radiojarrohlikdan so'ng og'riqni yo'qotish bir necha hafta yoki oygacha vaqt olishi mumkin.

Trigeminal nevralgiya uchun qo'shimcha davolash usullari

Ba'zi bemorlar trigeminal nevralgiyani faqat dori vositalari bilan emas, balki qo'shimcha (muqobil yoki yordamchi) terapiyalar yordamida boshqarishni afzal ko'rishadi[16]. Bu yondashuvlar, odatda, dori-darmonlar bilan birgalikda qo'llaniladi va ularning samaradorligi bemorga qarab har xil bo'lishi mumkin.

Quyidagi usullar qo'shimcha davolash yondashuvlari sifatida qo'llaniladi:

Kam ta'sirli jismoniy mashqlar – mushaklarni bo'shashtirish va qon aylanishini yaxshilash orqali og'riqni kamaytirishi mumkin.

Yoga – nafas nazorati va tanani bo'shashtirish orqali stressni kamaytirishga yordam beradi.

Ijodiy vizualizatsiya (tasavvur terapiyasi) – ijobiy tasvirlarni ongda jonlantirish orqali og'riq sezgisini kamaytirish mumkin.

Aromaterapiya – ba'zi efir moylari (masalan, lavanda yoki yalpiz) orqali tinchlantiruvchi ta'sirga erishish mumkin.

Meditatsiya – ongni markazlashtirish orqali ruhiy holatni barqarorlashtiradi va og'riqqa bo'lgan sezuvchanlikni kamaytiradi.

Akkupunktura – muayyan nuqtalarga igna kiritish orqali og'riq yo'llariga ta'sir ko'rsatadi[14].

Chiropraktik davolash (asosan yuqori umurtqa pog'onasi uchun) – orqa miya va asab tizimini muvozanatlashtirish orqali simptomlarni kamaytirishi mumkin.

Biofeedback terapiyasi – bemorni o'zining yurak urishi, mushak tarangligi va boshqa biologik jarayonlarini nazorat qilishga o'rgatadi.

Vitamin terapiyasi – ayniqsa B guruhi vitaminlari (masalan, B12) asab salomatligi uchun foydali hisoblanadi[15].

Oziqlantirish terapiyasi – ratsionni muvozanatlashtirish orqali umumiy salomatlikni yaxshilash va yallig'lanishni kamaytirish mumkin.

Trigeminal nevralgiya bo'yicha so'nggi ilmiy tadqiqotlar

AQSh Milliy Sog'liqni Saqlash Instituti (NIH) tarkibidagi Neyrologik Kasalliklarni O'rganish Instituti (NINDS) TN va boshqa surunkali og'riqlar bo'yicha turli ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlaydi[17,18]. Ushbu tadqiqotlar trigeminal asabga ta'sir qiluvchi biologik mexanizmlar, yangi tashxis usullari va innovatsion davolash yondashuvlarini o'rganishga qaratilgan[9].

NINDS tomonidan olib borilayotgan izlanishlar quyidagilarga yo'naltirilgan: Shikastlanishga javoban trigeminal asabda yuz beradigan o'zgarishlarni aniqlash, Neyropatik og'riqni tushunish va samarali boshqarish usullarini ishlab chiqish, Opioid bo'lmagan (giyohvand moddalarsiz) davolash yondashuvlari, masalan, immunomodulyator terapiyalarni tadqiq qilish. Immunoterapiya organizmning immun javobini tartibga solish orqali og'riqni kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, Milliy Stomatologiya va Kraniofasiyal Tadqiqotlar Instituti (NIDCR) ham trigeminal nevralgiya va nevropatik og'riqlar bo'yicha tadqiqotlarni moliyalashtirib kelmoqda[3].

TN va yuz og'rig'i bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar haqida yanada kengroq ma'lumot olish uchun NIH RePORTER ma'lumotlar bazasidan foydalanish mumkin. Bu platforma orqali olib borilgan tadqiqotlar, ularning natijalari va ilmiy maqolalari bilan tanishish imkoniyati mavjud.

NATIJA

Trigeminal nevralgiya (TN) — yuzdagi sezuvchanlikni ta'minlovchi trigeminal asabning zararlanishi natijasida yuzaga keladigan og'riqli holat bo'lib, bemorlar hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. TNning eng muhim klinik belgisi bu — yuzning bir tomonida to'satdan boshlanadigan, pichoqlovchi yoki elektr toki singari og'riqdir. Ushbu og'riq ko'pincha soqol olish, tish yuvish, gapirish, ovqatlanish yoki hatto shamol ta'sirida paydo bo'ladi. Og'riq xurujlari qisqa davom etadi, ammo kun davomida bir necha marta takrorlanadi.

Anatomik jihatdan trigeminal asab uchta shoxga ega bo'lib — oftalmik, maksillyar va mandibulyar — ular yuzning har xil qismlariga sezuvchanlikni ta'minlaydi. TN ko'pincha maksillyar va mandibulyar shoxlarga ta'sir qiladi.

Klinik jihatdan TN uch turga bo'linadi: klassik TN qon tomir bosimi natijasida yuzaga keladi; ikkilamchi TN — ko'p skleroz yoki o'smalar natijasi; idyopatik TN esa sababi aniqlanmagan holatdir. Tashxis MRI va nevrologik tekshiruvlar orqali aniqlanadi, boshqa kasalliklar istisno qilinadi. Davolash bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Dastlabki bosqichda antikonvulsant dorilar, ayniqsa karbamazepin va okskarbazepin, og'riqni kamaytirishga xizmat qiladi. Agar dori-darmonlar samarasiz bo'lsa yoki kuchli yon ta'sirlar bo'lsa, jarrohlik usullari — mikrovasкуляр dekompressiya (MVD), rizotomiya va stereotaktik radiojarrohlik (Gamma Knife) tavsiya etiladi. MVD asabni bosayotgan qon tomirdan ajratib, og'riqni bartaraf etishga qaratilgan. Rizotomiya esa og'riq yuboruvchi asab tolalarini shikastlash orqali bajariladi.

Qo'shimcha davolash usullari (yoga, meditatsiya, akkupunktura, aromaterapiya, biofeedback, vitamin terapiyasi) TN simptomlarini kamaytirishda yordam berishi mumkin, ayniqsa psixologik jihatdan bemorni yengillashtiradi. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, neyropatik og'riqning rivojlanish mexanizmlarini aniqlash va samarali, opioid bo'lmagan davolash usullarini ishlab chiqish TNni davolashda muhim bosqich hisoblanadi. TN bo'yicha so'nggi izlanishlar asosan immunomodulyator terapiya va yangi dori vositalari ustida olib borilmoqda.

Shu bilan birga, TNning qaytalanish ehtimoli saqlanib qoladi, bu esa uzoq muddatli monitoring va dori-darmonlarni qayta baholash zaruratini tug'diradi.

XULOSA

Trigeminal nevralgiya — murakkab klinik manzaraga ega, og'riqli va hayot sifatini jiddiy pasaytiradigan nevrologik kasallikdir. Uning asosiy sababi trigeminal asabning shikastlanishi yoki siqilishi bo'lib, bu holat yuzning bir tomonida to'satdan boshlanuvchi kuchli og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. TN ko'proq 50 yoshdan oshgan ayollarda uchraydi, ammo istalgan yoshda

rivojlanishi mumkin. Uchta asosiy turi mavjud: klassik, ikkilamchi va idyopatik. Klassik shakl qon tomiri asabni siqqanida yuzaga keladi, ikkilamchi esa boshqa kasalliklar bilan bog'liq bo'ladi.

Diagnoz qo'yish uchun chuqur klinik tarix, nevrologik tekshiruv va MRI muhim ahamiyatga ega.

Davolash strategiyasi antikonvulsant dorilar bilan boshlanib, agar kerak bo'lsa, jarrohlik aralashuvlar bilan davom ettiriladi. Mikrovaskulyar dekompressiya va rizotomiya kabi muolajalar bemorlarning uzoq muddatli holatini yaxshilashi mumkin. Qo'shimcha yondashuvlar esa og'riqni nazorat qilish va psixologik bardoshlilikni oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ilmiy izlanishlar TNni chuqur o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, yangi tashxis vositalari va davolash usullarini ishlab chiqishga qaratilgan. Bu holatni samarali davolash uchun ko'p qirrali va individual yondashuv zarur. Trigeminal nevralgiya nafaqat nevrologlar, balki umumiy shifokorlar, otorinolaringologlar va psixologlar tomonidan ham kompleks baholanishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Pc Adams. A Diagnostic Approach To Non-High Transferrin Saturation Hyperferritinemia, Journal Of J Hepatol, (2011), Pp. 32 - 51.
2. Ergashev Bekzod, Tish Emal Prizmalariga Yopishib Olgan Tish Blyashka Matrixning Mikrobiologiyasi Va Tarkibi, Modern Science And Research, 4 (3), 815 - 820,
3. Ergashev Bekzod. (2024). Sirkon Dioksid Qoplamalari Va Materialining Klinik Laborator Ahamiyati. Journal Of Uzbekistan's Development And Research (Judr). 1(1). 627- 632.
4. Ergashev Bekzod. (2023). Tish Toshilari. Tishda Tosh To'planishining Sabablari Va Ularni Oldini Olish Usullari Aholi O'rtasida Ommalashgan Savollarga To'liq Javob Berish Va Ommaga Tadbiq Etish. Models And Methods For Increasing The Efficiency Of Innovative Research. 1(2). 67 - 75.
5. Chjan Y, Lei Y, Nobbs A, Khammanivong A, Herzberg Mc: Streptococcus Gordonii Sspab Ning Inaktivatsiyasi Bir Nechta Adezin Genlarining Ifodasini O'zgartiradi. Immunitetni Yuqtirish. 2005, 73: 3351-3357.
6. Ergashev Bekzod. Gingivitning Bakteriologik Etiologiyasi Va Profilaktikasi. International Scientific Conference "Innovative Trends In Science, Practise And Education", 1 (1), 122 – 128.
7. 2 Bj Schlosser. Oral Manifestations Of Hematological And Nutritional Disorders. Journal Of Otolaryngol Clin N Am, (2011), Pp. 78 – 98.
8. Ergashev Bekzod. Stomatologiyada Tish Kariesi: Etiologiasi, Diagnostika Va Davolash Usullari, Modern Science And Research, 4 (3), 821-828.
9. Ergashev Bekzod, Pulpitning Etiologiyasi, Patogenezi, Morfologiyasi Va Klinik Simptomlari, Modern Science And Research, 4 (3), 829 - 838,
10. Wade V: Og'iz Biofilmlarida O'stirilmaydigan Bakteriyalar. Tish Blyashka Qayta Ko'rib Chiqildi. Salomatlik Va Kasallikdagi Og'iz Biofilmlari. Tahrirlangan: Newman Hn, Wilson M. 1999, Cardiff: Bioline, 313-322.
11. Ergashev Bekzod, Bemorlar Psixologiyasi Va Muloqot Ko'nikmalari. New Renaissance 2025. 3: 151-156.
12. Эргашев Бекзод. Этиология Инфекционных Заболеваний Тканей Пародонта. 2025. 2: 31-35.
13. A Sun. Og'iz Bo'shlig'i Shilliq Qavati Kasalliklarida Qon Tekshiruvi Zarur. J Formos Med Dots Jurnali, (2016), 34 - 42 Betlar.

14. Bj Schlosser. Gematologik Va Ovqatlanish Kasalliklarining Og'iz Orqali Namoyon Bo'lishi. Otolaringol Clin N Am Jurnali, (2011), 78 - 98 Betlar.
15. C Scully. Og'iz Bo'shlig'i Shilliq Qavatining Kasalligi: Takroriy Aftoz Stomatit. Br J Oral Maxillofac Surg Jurnali, (2008), 76 - 88 Betlar,
16. Loos, B. G., & Van Dyke, T. E. (2020). *The Role Of Inflammation And Genetics In Periodontal Disease*. Periodontology 2000, 83(1), 26-39.
17. Kinane, D. F., Stathopoulou, P. G., & Papapanou, P. N. (2017). *Periodontal Diseases*. Nature Reviews Disease Primers, 3(1), 17038.
18. Offenbacher, S., Barros, S. P., & Beck, J. D. (2008). *Rethinking Periodontal Inflammation*. Journal Of Periodontology, 79(8 Suppl), 1577-1584.

PROPHYLAXIS EFFICACY OF THE PREPARATION BASED ON “FAGODENT” AND “TRAUMEL S” IN DENTAL IMPLANTOLOGY

Ismatov Farrukh Aslidinovich

PhD, assistant teacher of the department of Oral surgery and dental implantology, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

E-mail: farruxismatov87@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6424-0489>

Bekmurodov Lukmon Rustamovich

PhD, assistant teacher of the department of Oral surgery and dental implantology, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Ibodov Ulmas Ergash ugli

Master's student of the department of Oral surgery and dental implantology, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15133608>

Abstract: This article studies the prophylactic efficacy of the preparations “Fagodent” and “Traumel S” in dental implantology. These preparations are mainly used to reduce inflammation, infection and pain after the implantation procedure, as well as to accelerate the recovery of injured tissues. “Fagodent” is characterized by its plant-based antibacterial and anti-inflammatory effect, while “Traumel S” supports the immune system through a number of its properties and accelerates recovery. The article shows the clinical efficacy of both preparations and analyzes how their combined use helps in the successful implementation of the implantation procedure.

Keywords: implant, peri-implant tissues, mucositis, inflammation, bone resorption, oral hygiene, gingivitis.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ «ФАГОДЕНТ» И «ТРАУМЕЛЬ С» В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ

Аннотация: В статье рассматривается профилактическая эффективность препаратов «Фагодент» и «Траумель С» в дентальной имплантологии. Эти препараты в основном используются для уменьшения воспаления, инфекции и боли, возникающих после процедуры имплантации, а также для ускорения восстановления поврежденных тканей. «Фагодент» характеризуется антибактериальным и противовоспалительным действием на растительной основе, а «Траумель С» поддерживает иммунную систему и ускоряет выздоровление благодаря ряду свойств. В статье демонстрируется клиническая эффективность обоих препаратов и анализируется, как их совместное применение способствует успешному процессу имплантации.

Ключевые слова: имплантат, периимплантные ткани, мукозит, воспаление, резорбция костной ткани, гигиена полости рта, гингивит.

INTRODUCTION

In the field of dental implantology, in order to ensure high efficiency in tooth restoration, the implantation process must be successfully carried out. However, it is important to maintain the health of patients and prevent complications after surgery. To achieve this, it is necessary to use various drugs and tools, facilitate the post-surgical recovery period, prevent infections and reduce inflammation.

This article analyzes the preventive effectiveness of the drugs "Fagodent" and "Traumeel S" in dental implantology. "Fagodent" is a biologically active drug based on plant extracts, and its antibacterial and anti-inflammatory effects help reduce complications that occur after the implantation procedure. "Traumeel S" has a number of properties, including reducing swelling and pain, and accelerating recovery after the surgical procedure by strengthening the immune system.

It is known that complications such as infection and inflammation during dental implantation can slow down the patient's recovery process and negatively affect the success of the implantation. Therefore, the use of "Fagodent" and "Traumeel S" drugs can be effective not only in reducing complications, but also in improving the overall health of the patient. The article reviews in detail the clinical efficacy of these drugs, their combined use, and their role in the implantation process.

THE MAIN PART

The drug "Traumeel S" based on phagocytes has a prophylactic value in relation to inflammatory complications of the peri-implant gingiva. (Table 1).

Thus, in the op group, with the use of Traumeel S gel at home and at the end of annual professional hygiene, peri-implantitis did not develop, and in the kP group, with conventional observation, after three years, peri-implantitis developed in one case (1.8%).

Mucositis developed in both groups, but was more pronounced in the control group. When using Traumeel S gel at 1, 2, 3 years of follow-up, mucositis was detected in 2, 2 and 3 implants (2.2%, 2.2%, 3.4%). In the control group, mucositis developed more often: 1, 2, 3 years - 4, 3, 5 implants (7.2%, 5.4%, 8.9%) (Fig. 2). The difference between the number of mucositis in the main and control groups at 1, 2, 3 years of follow-up was 69.4%, 38.9%, 61.8%.

Before the start of orthopedic treatment on implants, the oral hygiene index (vagP-u) in general was 2.0 ± 0.2 points in the main and control groups; after the end of prosthetics (against the background of professional hygiene before prosthetics) games-u were 1.7 ± 0.3 and 1.6 ± 0.3 ; a year later, during the control examination, it was up to 1.9 ± 0.1 in the main group, 2.1 ± 0.2 in the control group; after 2 years, hygiene was 2.1 ± 0.2 and 2.3 ± 0.3 in the main and control groups; after three years, 2.3 ± 0.3 and 2.5 ± 0.3 , respectively. The difference in the indicator for years 1, 2 and 3 is 13.6%, 8.7%, 8.0%.




The gingivitis index of the IGIM was worse in the control group after 1, 2, 3 years, since in this group it corresponded to 1.3 ± 0.3 , 1.5 ± 0.2 , 1.5 ± 0.2 , and when using Traumeel s gel, the main one was 1.0 ± 0.1 , 0.9 ± 0.1 , 1.0 ± 0.2 , which is less than in the KP group by 25.4%, 41.4%, 33.3%. The gingivitis index of the IGIM was not determined before and after the completion of prosthetics in the main and control groups, after 1, 2, 3 years its values when using Traumeel s gel were 0.1 ± 0.1 , 0.2 ± 0.1 , 0.3 ± 0.2 ; in the control group, respectively, 0.2 ± 0.1 , 0.4 ± 0.2 , 0.4 ± 0.2 . Between the OP and KP groups, the values were 1, 2, 3 the difference during the annual follow-up was 50.0%, 50.0%, 25.0%.

The Mulleman index was not determined before and after orthopedic treatment, and during the 1st, 2nd, and 3rd year of follow-up it did not exceed $0.1-0.2 \pm 0.1$ in the main group of preventive follow-up and increased from 0.1 ± 0.1 in the first year of follow-up to 0.3 ± 0.1 in the second year and to 0.4 ± 0.1 in the third year. The difference during follow-up was 0.0%, 33.3%, 50.0%, respectively (Fig. 28,29).

Dynamics of clinical and index indicators of peri-implant tissues during prophylactic use of Traumeel s gel (op and KP groups)

Indicators	1 year		2 year		3 year	
	oP	KP	oP	KP	oP	kp
development of mucositis, %	2,2	7,2	2,2	5,4	3,4	8,9
development of peri-implantitis, %	0	0	0	0	0	1,8
development of bone resorption, %	0	0	0	0	0	1,8
vagP-u	1,9	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5
Igim	1,0	1,3	0,9	1,5	1,0	1,5
VaG	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4
Mulleman Index	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4

1-tab. Dynamics of the patient's X-ray picture H (after the completion of prosthetics and after 3 years with prophylactic use of Traumeel s gel.



1-fig. Difference between oral hygiene and peri-implant dental condition index assessment after 1, 2, 3 years in the main (op) and control (CP) groups.

New cases of mucositis were detected in the groups with the initial presence of mucositis over the three years: in the olm group, 0, 1 and 2 cases were monitored for 1, 2 and 3 years, respectively, which corresponds to 0%, 2.1% and 4.3% of the observations in this group. In the control group, the increase in the number of mucositis cases during the specified time period occurred in the amount of 1, 2, 2 cases (in the KLM group 2.9%, 5.8%, 5.8%). The difference in the development of new cases of olm and KLM mucositis during the reference periods of monitoring is 100.0%, 63.8% and 25.9%.

In the group with the initial presence of mucositis for 1, 2, 3 years, the therapeutic use of Traumeel s gel was accompanied by a relapse of inflammation in 2, 3 and 3 cases (4.3%, 6.4%, 6.4%, respectively), and in the CIM group the recurrence rate was 14.3%, 11.4% and 17.1% (5, 4, 6 cases). The difference in the control period between the Olm and KLM groups was 69.9%, 43.9%, 62.6%, respectively (Tables 2, 3).

Indicators	LM/ KLM			P / KLP		
	1 year	2 year	3 year	1 year	2 year	3 year
development of mucositis, %	0/2,9	2,1/5,8	4,3/5,8	0/6,1	3,2/3,0	0/3,0 periimpla ntit
development, %	0/5,7	2,1/8,6	4,3/11,4	0/0	0/0 0/0	0/6, 1
relapse of chronic inflammation, %	4,3/14,3	6,4/11,4	6,4/17,1	5,1/9,1	2,6/9,1	5,1/12,1
development of bone resorption, %	2,1/8,6	7,0/14,3	8,5/20,0	10,3/15,2	18,0/24,2	25,6/27,3
average time to relieve inflammation	3,6/4,2 day			5,9/7,3		

2-tab. Dynamics of clinical indicators of peri-implant tissues when using Traumeel s gel for the treatment of mucositis (olm and KLM groups) and peri-implantitis (ol P and Cl p groups)

Comparison of inflammatory complications and recurrence rates of inflammation in the main (olm) and control (KLM) groups in the presence of initial mucositis. The development of peri-implantitis in the main group occurred in 1 implant after 2 years, and in 2 implants after 3 years (2.1% and 4.3%, respectively); in the control group, mucositis progressed to peri-implantitis in 2, 3, 4 implants after 1, 2, 3 years (5.7%, 8.6%, respectively). 11.4%), compared to the KLM group, 100.0%, 75.6% and 62.3%.

The occurrence of bone resorption is more frequent than inflammatory manifestations: during the control period of 1, 2, 3 years, in the olm group, b resorption for the implant zone was recorded in implants 1, 3, 4, and in the CIM group - in 3, 5, 7, which is 2.1%, 7.0%, 8.5% and 8.6%, respectively.% , 14.3%, 20.0%; in the KLM group, the increased frequency of detection of resorption was 75.6%, 51.0% and 57.5%.

When using Traumeel s gel for the treatment of mucositis, the average duration of peri-implant gum recession was 3.6 ± 0.7 days, compared to 4.2 ± 1.0 days in the control group, which is 14.3% longer.

Mucositis progression relapse XP. Progression. Resorptions, periimplantitis inflammation bone inflammation. tk. □ 1 year EZ 2 years and 3 years

The difference between the initial presence of mucositis and the rate of inflammatory complications and recurrence of inflammation in the main (olm) and control (KLM) groups after 1, 2, 3 years.

In the Olm and KLM groups, the hygiene index was on average unsatisfactory before vagR-u treatment - 2.8 ± 0.3 ; after professional hygiene and treatment of mucositis, hygiene improved in the KLM group by 1.7 ± 0.2 and in the Olm group by 1.2 ± 0.2 due to the use of Fagodent gel (difference 29.4%). After 1, 2, and 3 years of playing, it gradually deteriorated: 1.7 ± 0.3 , 1.8 ± 0.3 , 2.0 ± 0.2 in the OLM group and 2.2 ± 0.4 , 2.4 ± 0.3 , 2.5 ± 0.4 in the KLM group, respectively (difference between groups 29.4%, 22.7%, 25.0%, 20.0%).

CONCLUSION

This article studies the prophylactic efficacy of the drugs "Fagodent" and "Traumel S" in dental implantology. Both drugs are used as effective means to accelerate the patient's recovery, prevent infections and reduce inflammation in the period after the implantation procedure. "Fagodent" has antibacterial, anti-inflammatory and tissue regeneration properties based on plant extracts, while "Traumel S" with its homeopathic composition strengthens the immune system, reduces swelling and pain, and facilitates the postoperative period.

The combined use of these drugs can increase the success of the implantation procedure and shorten the patient's recovery period. Clinical studies and practical experience show that the drugs "Fagodent" and "Traumel S" are highly effective in dental implantology, play an important role in reducing complications for patients and improving overall health.

Thus, the drugs "Fagodent" and "Traumel S" are recommended as effective means of increasing the preventive effectiveness of the dental implantation process, their use helps to make the implantation procedure more successful and safer for patients.

List of references:

1. Шодиев, С. С., Исмаев, Ф. А., Нарзиева, Д. Б., Тухтамишев, Н. О., & Ахмедов, Б. С. (2019). Эффективность Применения Отвара Аниса При Лечении Периимплантитов. Достижения Науки И Образования, (11 (52)), 99-103.
2. Исмаев, Ф. А., Мустафоев, А. А., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Анализ Эффективности Нестероидных Противовоспалительных Препаратов При Излечении Верхнечелюстного Альвеолита. Theory And Analytical Aspects Of Recent Research, 1(12), 49-57.
3. Исмаев, Ф. А., Шодиев, С. С., & Мусурманов, Ф. И. (2020). Анализ Изучения Стоматологического И Общего Здоровья Студентов Вузов Города Самарканда. Биомедицина Ва Амалиёт Журнали, (6), 34-39.
4. Хасанова, Л. Э., & Исмаев, Ф. А. (2020). Комплексная Социально-Гигиеническая Характеристика Условий, Образа Жизни И Здоровья Студентов. Преимущества Обследования Студенческой Молодежи. Проблемы Биологии И Медицины, 1, 286-293.
5. Ismatov, F. A. (2022). Abdullaev Tz Methods Of Application Of Single-Stage Dental Implants For Different Degrees Of Alveolar Atrophy. Web Of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(8), 636-643.

6. Aslidinovich, I. F., & Abdurasulovich, M. A. (2022). Structure Of Single-Stage Dental Implants For Varying Degrees Of Alveolar Atrophy. *World Bulletin Of Public Health*, 10, 156-159.
7. Ismatov, F. A. (2020). Comparative Tender Characteristics Of Student Dental Health Indexes. *Academicia: An International Multidisciplinary Research*, (10), 11.
8. Ismatov, F. A. (2023). Evaluation Of The Efficacy Of Alendronic Acid In Dental Implantation (Literature Review). *American Journal Of Pediatric Medicine And Health Sciences* (2993-2149), 1(7), 199-202.
9. Aslidinovich, I. F. (2023). Assessment Of The Effectiveness Of Alendronic Acid In Dental Implants. *Central Asian Journal Of Medical And Natural Science*, 4(3), 1186-1188.
10. Khasanova, L. E., & Ismatov, F. A. (2022). Indicators Of Oral Health At Students Of The City Of Samarkand. *Applied Information Aspects Of Medicine (Prikladnye Informacionnye Aspekty Mediciny)*, 25(4), 13-19.
11. Ismatov, F. A., & Mustafoev, A. A. (2022). Drug Treatment With Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs Jaw Alveolitis. *Frontline Medical Sciences And Pharmaceutical Journal*, 2(03), 88-94.
12. Хасанов, Х. Ш., Исмаев, Ф. А., & Мардонова, Н. П. (2022). Применение "Prf" В Качестве Остеопластического Материала При Одонтогенных Кистах Челюстных Костей. *Вестник Магистратуры*, (2-1 (125)), 13-14.
13. Хасанова, Л., & Исмаев, Ф. (2021). Результаты Комплексного Стоматологического Обследования У Студентов Высших Учебных Заведений. *Медицина И Инновации*, 1(1), 108-112.
14. Ismatov, F. A., & Emilievna, K. L. (2020). Criteria For Evaluating Student Dental Health Index In Accordance With The «8020» Program Methodology. *The American Journal Of Medical Sciences And Pharmaceutical Research*, 2(11), 99-105.
15. Zafarovich, A. T., & Aslidinovich, I. F. (2022). Use Of Single-Stage Dental Implants For Varying Degrees Of Alveolar Atrophy. *Central Asian Journal Of Medical And Natural Science*, 3(3), 782-786.
16. Ibragimov, D. D., Ismatov, F. A., & Narzikulov, F. A. (2022). Results Of Complex Treatment With Eludril Antiseptic Solution. *Central Asian Journal Of Medical And Natural Science*, 3(3), 689-690.
17. Ismatov, F. A., Kizi Mardonova, N. P., & Hasanov, K. S. (2022). Morphological Experiments To Improve The Effectiveness Of Postoperative Rehabilitation Of Cysts In Maxillary Bones With "Prf" Osteoplastic Material. *World Bulletin Of Social Sciences*, 7, 32-34.
18. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Assessment Of Risk Factors Influencing Dental Health In Higher Education Students. *Interconf*, 721-732.
19. Ismatov, F. A., & Mustafoev, A. A. (2022). Evaluation Of The Effectiveness Of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs In The Treatment Of Maxillary Alveolitis. *The American Journal Of Medical Sciences And Pharmaceutical Research*, 4(03), 29-34.
20. Гаффаров, У. Б., Шодиев, С. С., & Исмаев, Ф. А. (2018). Влияние Препарата «Холисал Гель» На Послеоперационное Течение У Пациентов После Удаления Ретинированных Третьих Моляров. *ББК 56.6 С 56 Современные Достижения Стоматологии: Сборник*, 37.
21. Ismatov, A. F. Formation Of Socio-Cultural Competence Of Future Foreign Language Teachers During The Educational Process Of Higher Education.
22. Ismatov, A. F. The Use Of Interactive Technologies In Teaching English To Part-Time Students.

23. Хасанова, Л. Э., Исмаев, Ф. А., Ибрагимов, Д. Д., & Гаффаров, У. Б. Олий Таълим Муассасалари Талабаларининг Стоматологик Ҳолатининг Ўзига Хос Хусусиятлари. Междисциплинарный Подход По Заболеваниям Органов Головы И Шеи, 182.
24. Ismatov, F. A., Kizi Mardonova, N. P., & Hasanov, K. S. (2022). Morphological Experiments To Improve The Effectiveness Of Postoperative Rehabilitation Of Cysts In Maxillary Bones With "Prf" Osteoplastic Material. *World Bulletin Of Social Sciences*, 7, 32-34.
25. Хасанова, Л. Э., & Исмаев, Ф. А. (2024). Особенности Стоматологического Статуса У Студентов Высших Учебных Заведений. *Multidisciplinary Journal Of Science And Technology*, 4(4), 97-105.
26. Фаррух, И. С. М. А. Т. О. В., Жумаев, О., Каримов, Х., & Шавкиддин, И. С. О. М. О. В. (2024). Важность И Безопасность Антрезорбционных Препаратов Для Успешного Проведения Стоматологической Имплантологии У Пациентов. *Samarali Ta'lim Va Barqaror Innovatsiyalar Jurnali*, 2(3), 374-386.
27. Alimjanovich, R. J., Mukhamatisakovich, I. S., Isamiddinovich, K. A., & Asliddinovich, I. F. (2023). Basics Of Predicting Facial Sox Injuries In Athletes And Clinical-Immunological Prevention. *Novateur Publications*, (12), 1-121.
28. Исмаев, С. Ш., Угли, Т. Х., & Асроров, М. Ю. (2019). Современное Состояние Отбелки Хлопкового Масла. *Экономика И Социум*, (1-1 (56)), 535-537.
29. Ismatov, A. F. Formation Of Socio-Cultural Competence Of Future Foreign Language Teachers During The Educational Process Of Higher Education.
30. Ismatov, A. F. The Use Of Interactive Technologies In Teaching English To Part-Time Students.
31. Ismatov , F., & Umarova , Y. (2024). Some Discussions Regarding The Macrostructure And Osteointegration Of The Jaws During Dental Implantation. *Conference Of Natural And Applied Sciences In Scientific Innovative Research*, 1(4), 76–82. Retrieved From <https://Universalpublishings.Com/Index.Php/Cnassir/Article/View/53855>
32. Исмаев Фаррух Аслидинович, & Умарова Юлдуз Аслидиновна. (2024). Некоторые Комментарии К Метаболизму Костной Ткани И Ее Фармакологическим Свойствам. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi*, 2(4), 250–258. Retrieved From <https://Universalpublishings.Com/Index.Php/Gumanitar/Article/View/5350>
33. Исмаев, Ф. (2024). Основных Стоматологических Заболеваний, Методы И Программы Профилактики У Лиц Молодого Возраста. *Journal Of Science-Innovative Research In Uzbekistan*, 2(8), 17–21. Retrieved From <https://Universalpublishings.Com/Index.Php/Jsiru/Article/View/6878>
34. Исмаев Фаррух Аслидинович. (2024). Состояние И Методы Обследования Стоматологического Здоровья, Формирование Групп И Методы Профилактики. *Scientific Journal Of Applied And Medical Sciences*, 3(8), 19–24. Retrieved From <https://Sciencebox.Uz/Index.Php/Amaltibbiyot/Article/View/11645>
35. Ismatov, F. (2024). Some Problems Of Organizing Dental Care For Youth And Its Importance. *Multidisciplinary Journal Of Science And Technology*, 4(8), 26–30. Retrieved From <https://Mjstjournal.Com/Index.Php/Mjst/Article/View/1792>
36. Ismatov Farrukh Asliddinovich. (2024). Dental Health Of Youth In The World At The Current Stage. *American Journal Of Pediatric Medicine And Health Sciences* (2993-2149), 2(8), 18–22. Retrieved From <https://Grnjournal.Us/Index.Php/Ajpmhs/Article/View/5612>

TACTICS OF MODERN MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN SURGICAL TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS

Seliyan Harihara Sudhan, Yunusova Guzal Fayzullaevna

Samarkand State Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15160927>

Abstract: Minimally invasive interventions are more effective than open surgery in the treatment of aseptic severe acute pancreatitis. This was shown by analysing data obtained from the treatment of 182 patients with severe acute pancreatitis. The reduction in the incidence of mortality was 6.2% and 17.2%, respectively. Since the mortality rate was 19.8% in infected pancreonecrosis, the use of minimally invasive procedures was preferred over open surgery.

Keywords: Severe acute pancreatitis, surgical approach, minimally invasive interventions.

ТАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ МИНИИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Селиан Харихара Судхан, Юнусова Гузал Файзуллаевна.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: При лечении асептического тяжелого острого панкреатита миниинвазивные вмешательства эффективнее, чем открытые операции. Это было показано анализом данных, полученных из лечения 182 пациентов с тяжелым острым панкреатитом. Снижение частоты смертности составило 6,2% и 17,2% соответственно. Поскольку частота смертности составила 19,8% при инфицированном панкреонекрозе, использование миниинвазивных процедур было предпочтительнее, чем открытые операции.

Ключевые слова. Тяжелый острый панкреатит, хирургическая тактика, миниинвазивные вмешательства.

RELEVANCE

Acute pancreatitis ranks third among urgent surgical diseases, with mortality in severe forms reaching 30% and up to 80% with the development of purulent-septic complications. This makes it an urgent problem to improve the diagnosis and treatment of this condition. However, there are disagreements regarding which surgeries are best performed at different stages of the disease. Aseptic enzymatic damage to the pancreas and the development of severe acute pancreatitis leaves an ambiguous question about the choice between open and minimally invasive approaches. In the late phase of acute pancreatitis, purulent-septic complications develop in 30-50% of cases and are accompanied by a high mortality rate of up to 80%. This shows the importance of developing an ideal surgical strategy. However, there is no clear decision yet on which surgeries are preferable for patients with such complications. The choice between minimally invasive and open methods is an important issue, since each method has its own advantages and disadvantages. Although open surgeries may provide more effective debridement of the purulent-septic focus, minimally invasive procedures are less invasive. Thus, the question of the reasonable choice of treatment method at different stages of acute pancreatitis remains unresolved. This emphasizes the need for additional research in this area.

PURPOSE OF THE STUDY

Improving treatment outcomes in patients with severe acute pancreatitis by improving surgical strategies using minimally invasive technologies.

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH

The study revealed interesting things about 182 patients with severe acute pancreatitis in the Samarkand branch of the RNCM from 2018 to 2023. The study included both men and women aged 57.1% and 42.9%, respectively, the average age of patients was 51.6 years. In 51.1% of cases of severe acute pancreatitis, the cause was the alimentary factor and alcohol abuse, and in 42.9% of cases, the cause was impaired pancreatic secretion outflow and intraductal hypertension caused by gallstone disease, damage to the extrahepatic bile ducts. In 6% of patients, the cause of acute pancreatitis remains unknown. After analyzing clinical and laboratory data, ultrasound, computed tomography (CT) and diagnostic laparoscopy results, 182 patients were diagnosed with severe acute pancreatitis. The 2012 Atlanta classification was used to classify the disease by severity. The Balthazar-Ranso pancreatitis severity index was used on CT to assess the extent of primary pancreatic necrosis. About two-thirds of patients (65.9%) had small focal pancreatic necrosis. Large focal and subtotal necrosis were observed in 34.1%. According to the study, 48.9% of patients had one area of retroperitoneal tissue affected, while 51.1% of patients had two or three areas affected. Most patients with severe acute pancreatitis (40.7%) underwent minimally invasive surgery, while 37.4% underwent open surgery. Aseptic pancreatic necrosis was recorded in 107 patients, or 58.2% of all patients. Severe acute pancreatitis was detected in 75 patients (41.2%). Clinical, instrumental and laboratory signs such as persistent hyperthermia and leukocytosis, detection of gas bubbles on ultrasound and CT, and positive results of culture of discharge from abdominal drainage or aspirate during percutaneous puncture served as criteria for determining infection. Patients with severe acute pancreatitis were divided into two groups: group A consisted of 107 people with aseptic necrosis of the pancreas, and group B consisted of 75 people with infected necrosis of the pancreas. Group A was further divided into three groups: A1 used only conservative treatment, A2 performed open operations and A3 used minimally invasive ones. In addition, group B was divided into two subgroups. Subgroup B1 included minimally invasive operations, and subgroup B2 included open operations. In 17.7% of patients with aseptic pancreatic necrosis (Group A), there was enzymatic peritonitis, and in 8.4% of patients there was serous-fibrous peritonitis.

In the group of patients with infected pancreatic necrosis (Group B), erosive bleeding (13.3%), intestinal fistula formation (14.6%), and a combination of erosive bleeding and intestinal fistula formation (9.3%) were observed. In addition, 32% of patients had retroperitoneal phlegmon, and 17.3% had serous-fibrous peritonitis. Instrumental diagnostic methods included ultrasound, computed tomography, EGDFS, diagnostic laparoscopy, diagnostic puncture and drainage of the abdominal cavity and/or retroperitoneal space.

Complex conservative therapy administered to 182 patients with TOP included the following components:

- infusion therapy for rehydration and detoxification, at a rate of 40 ml per 1 kg of patient weight with forced diuresis;
- analgesia, non-narcotic analgesics (NSAIDs, antispasmodics)
- epidural blockade of 6-10 ml of 2% lidocaine was performed in 140 (76.9%) patients, the pain syndrome was relieved 15-20 minutes after the injection, if necessary, the epidural blockade was repeated after 24-48 hours;

- the use of antisecretory drugs in all patients included in the study (proton pump inhibitors Omeprazole were used in 106 (58.2%) patients, H2-histamine blockers Cimetidine were used in 76 (41.8%) patients;

- antibacterial therapy was used in all patients included in the study, Cefoperazone and Amoxicillin were used for the treatment and prevention of infection in patients with aseptic necrosis of the pancreas (group A) and with infected necrosis of the pancreas (group B).

RESEARCH RESULTS

Of the 142 patients with severe acute pancreatitis (SAP), 51.4% underwent minimally invasive surgery, and 48.6% underwent open surgery. For the treatment of aseptic SAP in 16.4% of patients, abdominal drainage and videolaparoscopic sanitation were used.

Opening of the pancreas was performed through one or both lateral approaches in case of extensive aseptic necrosis of the pancreas with signs of peritoneal protrusion. In case of fluid accumulation in the omental bursa, it was drained through the gastrocolic ligament. As the volume of fluid released from the abdominal cavity decreased, the drains were removed one by one over three days. The drainage from the omental bursa was usually removed 7–10 days after the operation.

In three cases (4.8%) of patients with severe acute pancreatitis (SAP), fluid collections were found in the retroperitoneal region or omental bursa. In these cases, percutaneous punctures were performed using ultrasound navigation. These procedures were not only useful for treatment, but were also used to diagnose suspicious pancreatic necrosis.

Various types of open surgeries were performed to treat 35 patients (19.2%) with aseptic necrosis of the pancreas. This included wide midline laparotomy with abdominal drainage in 19 patients who had signs of decompensated duodenal obstruction or ruptured pseudocyst. Minilaparotomy with drainage of the abdominal cavity and omental bursa was used in 21 patients with enzymatic peritonitis. In two patients suffering from decompensated duodenal obstruction due to the formation of paraduodenal infiltrate, an anterior-colic gastroenteroanastomosis with an interintestinal anastomosis according to Brown was performed. After opening the omental bursa, abdominization of the pancreas was performed in twelve patients. This was followed by drainage of the abdominal cavity and omental bursa, with special emphasis on rupturing the developing pseudocyst. After open surgery for the treatment of aseptic necrosis of the pancreas (ANP), the surgical wound was closed. Treatment of infected pancreatic necrosis (group B) included minimally invasive interventions such as percutaneous drainage of the omental bursa under ultrasound guidance for the treatment of pancreatic abscess or acute infected fluid collection. Fistulography, computed tomography, and ultrasound were used to determine the effectiveness of drainage and to detect residual cavities. For the treatment of purulent-septic forms of PNP, open surgery using minilaparotomy, lumbotomy, and wide midline laparotomy were the main treatment method in 18.7% of patients.

Lumbotomy was performed with small incisions of 4-5 cm in length in cases where focal necrosis of the pancreas was limited to two anatomical areas of the retroperitoneal tissue. With wide midline laparotomy or lumbotomy, two types of drainage were used. The first was called "open" and involved the use of gauze swabs and double-lumen drains of 11 mm in diameter to drain the unclosed surgical wound. The second was called "closed" and involved drainage of the retroperitoneal tissue and abdominal cavity while the omental bursa was intact. The "closed" drainage method was used for the operation only three weeks or more after the onset of the disease, provided that sequestra had completed forming in the pancreatic necrosis focus and an exhaustive

necrosequesrectomy had been performed. After double-lumen drains were installed in the area of the necrosis focus, the surgical wound was completely closed. In the early stages of the disease (7-14 days after the onset of acute pancreatitis), when the destructive areas of the pancreas were not yet completely sequestered, the method of "open" drainage was used to avoid purulent-septic complications of severe acute pancreatitis (SAP). This usually required small laparotomies to open the omental bursa and remove necrotic tissue. Then an omentobursostomy or retroperitoneostomy had to be made. Necrosequesrectomy was performed using double-lumen drains and latex-gauze tampons. Thus, when planning subsequent operations and in cases of serious damage to the pancreas and retroperitoneal region, the use of "open" drainage was justified. Repeated debridement operations included replacement of gauze swabs, lavage of cavities, removal of necrotic tissue, management and correction of drains and assessment of drainage efficiency. On average, one patient with focal infected pancreatic necrosis underwent two to three debridement operations, and if the necrosis spreads, three to five operations. After complete necrosequesrectomy and formation of granulations in the wound, complete closure of the surgical wound was performed, switching to a closed type of drainage. Patients with infected pancreatic necrosis (group B) had the highest mortality rate, amounting to 14.8% of all studied groups. Subgroup B2, which underwent open surgical interventions, showed the highest mortality rate (26.5%) in this group. In patients of group A with aseptic necrosis of the pancreas, the mortality rate was 9.3%, and in patients of group A2 with open surgeries, the mortality rate was 17.1%. Based on the above data, the highest number of deaths occurred in subgroup B2, where open interventions were performed, due to complications of PRP, such as erosive bleeding and retroperitoneal phlegmon. However, the mortality rate in subgroup B1 (19.5%), where minimally invasive interventions were used, was statistically significantly lower. In groups A and B, there were statistically significant differences in the duration of treatment in the operating room and the time of hospital stay.

Comparison of patients in subgroup A2 with aseptic pancreatic necrosis and patients in subgroup B2 with infected pancreatic necrosis showed no statistically significant differences in the duration of treatment in the operating room and the length of hospital stay ($p > 0.05$). In addition, no statistically significant differences were found between subgroups A3 with aseptic pancreatic necrosis and subgroup B1 with infected pancreatic necrosis ($p < 0.05$). However, in subgroup A3, where minimally invasive interventions were used, the duration of treatment in the operating room and hospital stay were statistically significantly shorter than in subgroup B2. Comparison of mortality showed statistically significant differences between subgroups A2, in which open surgeries were performed for aseptic pancreatic necrosis (16.3%), and subgroup B2, in which open surgeries were also performed for infected pancreatic necrosis ($p < 0.05$). The mortality rate in subgroup B2 was 25.8%, which is significantly higher than in subgroup A2, where it was 17.2%. In subgroup B1, infected pancreatic necrosis was treated using minimally invasive procedures, and the mortality rate was 26.5%. This was significantly higher than in subgroup A3, where the same methods were used to treat aseptic pancreatic necrosis, and the mortality rate was 6.2%.

CONCLUSIONS

1. Minimally invasive interventions are widely used in the treatment of severe acute pancreatitis in the enzymatic phase, in addition to conservative therapy. The choice of surgical tactics depends on the type and severity of the underlying pathological process. Minimally invasive

surgeries are preferable for drainage of the abdominal cavity at the early stage of enzymatic peritonitis.

2. Open surgeries should be considered only in case of serious complications that cannot be controlled by minor invasive procedures at the initial stage of severe acute pancreatitis. In case of purulent-septic complications, open surgeries are preferable to completely cleanse the inflammation site.

3. In the treatment of patients with aseptic severe acute pancreatitis, the use of minimally invasive procedures is accompanied by a lower mortality rate of 6.2% compared to open surgeries, which reach 17.2%. In cases of infected pancreatic necrosis, minimally invasive interventions are also preferable, since the mortality rate is 19.8%, which is lower than with open surgeries, where this figure was 26.5%.

Literature.

1. C. Bassi et al. "Laparoscopic vs. Open Surgery for Acute Pancreatitis: The Importance of Choosing the Right Patients." *Journal of Gastrointestinal Surgery, vol. 13, no. 12, 2019, pp. 2327-2333.
2. P. S. García et al. "Minimally Invasive Approaches for Severe Acute Pancreatitis: A Systematic Review of the Literature." *HPB Surgery*, vol. 2016
3. C. G. Derveniz et al. "Acute Pancreatitis: An Up- date on Management." *Canadian Journal of Gastro- enterology*, vol. 17, no. 6, 2020, pp. 377-384.
4. M. R. Marangos et al. "Laparoscopic Treatment of Severe Acute Pancreatitis: Results of a Prospective Study." *Surgical Endoscopy*, vol. 20, no. 5, 2006, pp. 713-716.
5. Tukhtabaevich K. S. et al. Diagnostic and prognostic efficacy of laparoscopy in pancreatic necrosis //journal of healthcare and life-science research. – 2024. – T. 3. – №. 6. – С. 222-225.
6. Холиев О. О., Хужабаев С. Т. Влияние лапароскопии на прогнозирование тяжести и лечение острого панкреатита с ферментативным перитонитом //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 18. – С. 99-100.
7. Tukhtabayevich K. S. et al. Вопросы этиопатогенеза острого панкреатита (обзор литературы) //journal of biomedicine and practice. – 2024. – Т. 9. – №. 1.

DORIVOR O'SIMLIKLARNING LOTINCHA NOMLARI VA ULARNING AHAMIYATI

Xayitov Muhammad Farxodivich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti Pediatriya 125-guruh

E-mail: [Normurodova Sohiba Mallayevna](mailto:Normurodova.Sohiba.Mallayevna)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15191546>

Annatsiya: Dorivor o'simliklar inson salomatligi uchun muhim manba hisoblanadi. Ularning lotincha nomlari va biologik tasnifi ularni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar dorivor o'simliklarning tibbiyotdagi o'rnini va ahamiyatini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. O'simliklar insoniyat tarixida va zamonaviy tibbiyotda o'z o'rnini saqlab qolmoqda va ularning foydalari kelajakda ham davom etishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: Aloe barbadensis miller, Panax ginseng, Lavandula angustifolia, Thymus vulgaris - timyan, respirator kasalliklarni davolashda yordam beradi.

Valeriana officinalis - oddiy valeriana, Mentha piperita - yalpiz, Matricaria chamomilla - dorivor romashka.

ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ.

Аннотация: Лекарственные растения являются важным источником пользы для здоровья человека. В их изучении важное значение имеют их латинские названия и биологическая классификация. Информация, представленная в этой статье, поможет вам лучше понять роль и значение лекарственных растений в медицине. Растения продолжают занимать важное место в истории человечества и современной медицине, и ожидается, что их полезные свойства сохранятся и в будущем.

Ключевые слова: Aloe barbadensis miller, Panax ginseng, Lavandula angustifolia, Thymus vulgaris - чабрец, помогает при лечении заболеваний дыхательных путей.

Valeriana officinalis — валериана лекарственная, Mentha piperita — мята перечная, Matricaria chamomilla — ромашка лекарственная.

LATIN NAMES OF MEDICINAL PLANTS AND THEIR IMPORTANCE

Abstract: Medicinal plants are an important source for human health. Their Latin names and biological classification are important in their study. The information presented in this article will help to better understand the role and importance of medicinal plants in medicine. Plants have retained their place in human history and modern medicine, and their benefits are expected to continue in the future.

Keywords: Aloe barbadensis miller, Panax ginseng, Lavandula angustifolia, Thymus vulgaris - thyme, helps in the treatment of respiratory diseases.

Valeriana officinalis - ordinary valerian, Mentha piperita - peppermint, Matricaria chamomilla - medicinal chamomile.

KIRISH

Dorivor o'simliklar insoniyat tarixida muhim o'rin tutib kelgan. Ular qadimdan turli kasalliklarni davolashda, immunitetni mustahkamlashda va organizmni sog'lom saqlashda ishlatilgan. Bugungi kunda farmakologiya va tibbiyot sohalarida dorivor o'simliklarning ilmiy

o'rganilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'simliklarning xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan qabul qilingan lotincha nomlari ularning aniq tasniflanishiga, dorivor xususiyatlarini chuqur o'rganishga va tibbiyotda qo'llashga yordam beradi.

Dorivor o'simliklarning lotincha nomlanishi va tasnifi

Dorivor O'simliklarning Lotincha Nomlari

Dorivor o'simliklar inson salomatligi va tibbiyotda muhim rol o'ynaydi. Ular asrlar davomida turli kasalliklarni davolashda, sog'liqni saqlashda va umumiy farovonlikni oshirishda qo'llanib kelinmoqda. Ushbu maqolada dorivor o'simliklarning lotincha nomlari, ularning xususiyatlari va tibbiy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beriladi. Maqola o'simliklarning biologik tasnifi, ularning tarixi va zamonaviy tibbiyotdagi o'rni haqida ham ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Dorivor O'simliklar va Ularning Tarixi

Dorivor o'simliklar insoniyat tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ular qadim zamonlardan beri turli kasalliklarni davolashda ishlatilgan. Misol uchun, qadimgi Misrda, Xitoyda va Hindistonda dorivor o'simliklar tibbiyotda keng qo'llanilgan. Ularning ko'plab xususiyatlari va foydalari haqida ma'lumotlar qadimiy yozuvlarda saqlanib qolgan.

O'simliklarning Biologik Tasnifi

Dorivor o'simliklar biologik tasnifga ko'ra turli oilalarga va turlarga bo'linadi. Har bir o'simlikning o'ziga xos xususiyatlari va foydalari mavjud. Masalan, quyidagi dorivor o'simliklar keng tarqalgan:

- **Aloe vera** (*Aloe barbadensis miller*) - terini davolash va yallig'lanishni kamaytirish uchun ishlatiladi.
- **Ginseng** (*Panax ginseng*) - energiya va immunitetni oshirishda yordam beradi.
- **Lavanda** (*Lavandula angustifolia*) - stressni kamaytirish va uyquni yaxshilashda qo'llaniladi.

Dorivor O'simliklarning Lotincha Nomlari

Dorivor o'simliklarning lotincha nomlari ularning ilmiy tasnifida muhim ahamiyatga ega. Har bir o'simlikning lotincha nomi uning turini va oilasini aniqlashda yordam beradi. Quyida ba'zi mashhur dorivor o'simliklarning lotincha nomlari keltirilgan:

1. **Echinacea purpurea** - immunitetni oshirishda yordam beruvchi o'simlik.
2. **Mentha piperita** - hazm qilishni yaxshilash va bosh og'rig'ini kamaytirish uchun ishlatiladi.
3. **Curcuma longa** - kurkuma, yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega.
4. **Thymus vulgaris** - timyan, respirator kasalliklarni davolashda yordam beradi.
5. **Rosmarinus officinalis** - rozmarin, xotirani yaxshilashda va stressni kamaytirishda qo'llaniladi.

Dorivor O'simliklarning Tibbiy Ahamiyati

Dorivor o'simliklar tibbiyotda keng qo'llaniladi. Ular tabiiy dori vositalari sifatida ishlatiladi va ko'plab kasalliklarni davolashda yordam beradi. O'simliklar tarkibida mavjud bo'lgan faol moddalar ularning dorivor xususiyatlarini belgilaydi. Masalan, kurkuma tarkibidagi kurkumin moddasi yallig'lanishga qarshi kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy Tibbiyotda O'simliklar

Zamonaviy tibbiyotda dorivor o'simliklar ko'plab dori vositalarining asosini tashkil etadi. Ular sintetik dori vositalariga muqobil sifatida ishlatiladi. O'simliklardan olingan ekstraktlar va ularning faol moddalarini o'rganish orqali yangi dori vositalari ishlab chiqilmoqda. Shuningdek,

o'simliklar asosida tayyorlangan preparatlar ko'plab klinik tadqiqotlarda muvaffaqiyatli natijalar ko'rsatmoqda.

Har bir dorivor o'simlikning lotincha nomi mavjud bo'lib, u xalqaro ilmiy nomenklatura qoidalariga ko'ra belgilanadi. Lotincha nom ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi o'simlikning jinsi (genus), ikkinchi qismi esa turi (species)ni bildiradi. Masalan, **Valeriana officinalis** - oddiy valeriana, **Mentha piperita** - yalpiz, **Matricaria chamomilla** - dorivor romashka.

Dorivor o'simliklar quyidagi asosiy sinflarga bo'linadi:

Alkaloidlar saqlovchi o'simliklar (Papaver somniferum - ko'knor, Atropa belladonna - belladonna)

Glikozidlar saqlovchi o'simliklar (Digitalis purpurea - binafsha foxglove, Convallaria majalis - konvalariya)

Flavonoidlar saqlovchi o'simliklar (Crataegus monogyna - bir urug'li do'lana, Ginkgo biloba - ginkgo)

Efirot yog'li o'simliklar (Lavandula angustifolia - lavanda, Rosmarinus officinalis - bibariya)

Vitaminlarga boy o'simliklar (Hippophae rhamnoides - qushqo'nmas, Rosa canina - itguli)

Dorivor o'simliklarning dorivor xususiyatlari

Dorivor o'simliklarning biologik faol moddalari inson organizmiga turlicha ta'sir qiladi. Quyida ayrim muhim o'simliklarning dorivor xususiyatlari bayon etiladi:

1. **Valeriana officinalis** (Valeriana) - Tinchlantiruvchi va uyquni yaxshilovchi ta'sirga ega.
2. **Mentha piperita** (Yalpiz) - Hazm qilish tizimini yaxshilaydi, spazmlarni kamaytiradi.
3. **Matricaria chamomilla** (Dorivor romashka) - Yallig'lanishga qarshi va tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.
4. **Ginkgo biloba** (Ginkgo) - Miya qon aylanishini yaxshilaydi, xotirani mustahkamlaydi.
5. **Crataegus monogyna** (Do'lana) - Yurak-qon tomir tizimini mustahkamlashda ishlatiladi.
6. **Digitalis purpurea** (Foxglove) - Yurak kasalliklarida ishlatiladigan glikozidlarni o'z ichiga oladi.

Dorivor o'simliklarning zamonaviy tibbiyotdagi o'rni. Hozirgi zamonaviy farmakologiya dorivor o'simliklarning aktiv moddalari asosida ko'plab dorilarni ishlab chiqmoqda. Masalan: **Aspirin** - Salix alba (oq tol) po'stlog'idan olinadigan salitsilat kislota asosida ishlab chiqarilgan. **Atropin** - Atropa belladonna o'simligidan olinadi va oftalmologiyada hamda yurak faoliyatida qo'llanadi. **Digoksin** - Digitalis purpurea o'simligidan olinib, yurak kasalliklarini davolashda ishlatiladi.

Zamonaviy tibbiyotda eng samarali dori manbaini tanlang



XULOSA

Dorivor o'simliklar qadim zamonlardan beri insoniyat hayotida muhim o'rin egallab kelgan. Ularning lotincha nomlanishi ilmiy tasniflash va tadqiqot jarayonlarini osonlashtiradi. Zamonaviy farmatsevtika ushbu o'simliklardan olingan moddalar asosida turli dorilar ishlab chiqarib, ularni tibbiyotda keng qo'llamoqda. Kelajakda ham dorivor o'simliklarning yangi tibbiy xususiyatlarini o'rganish va ulardan samarali foydalanish davom etishi muqarrar.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Farmakopeyasi. - Toshkent: O'zbekiston Nashriyoti, 2020.
2. Who Monographs On Selected Medicinal Plants, Volume 1-4. - Geneva: World Health Organization, 2002-2009.
3. Yakubov A.A., Shukurov B.T. "Dorivor O'simliklar Va Ularning Farmakologik Ta'siri". - Toshkent: Fan, 2018.
4. Trease And Evans Pharmacognosy. - Elsevier, 2019.
5. European Medicines Agency (Ema) Monographs On Herbal Substances. - www.ema.europa.eu
6. Normurodova, Sokhiba. "The Social And Cultural Importance Of The Latin Language And Its Present And Historical Landscape." Центральноазиатский Журнал Академических Исследований 2.5 (2024): 51-55.4.
7. Normurodova, S. M., & Yorova, S. K. (2023). Nemis Tili Frazologik Birikmalari Va Tilning Lug'at Boyligi. Science And Education, 4(2), 1672-1675.
8. Yorova, S., Aytmuratova, P., Esanova, M., & Normurodova, S. (2023). Phraseological Units In The Medical Field Of English And Uzbek Cultures. Development And Innovations In Science, 2(2), 10-13.
9. Sohiba, N., & Perkhan, A. (2023). The Role Of Latin Terms In Medicine. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 8.036, 12(10), 1-3.
10. Zafar, M., & Sohiba, N. (2023). Kundalik Turmushda Keng Qo'llanilishda Bo'lgan Suyuqliklarni Ifodalovchi Dori Shakllari Haqida Chet El Ilmiy Nashrlaridan Olingan Fikrlar.
11. Mallaevna, Normurodova Sokhiba, And Ayesha Khalid. "Topic Chemical Terminology Of Salts." International Conference On Multidisciplinary Science. Vol. 1. No. 5. 2023.
12. Mallaevna N. S., Khalid A. Topic Chemical Terminology Of Salts //International Conference On Multidisciplinary Science. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 226-229.
13. Mallaevna, N. S., & Chopra, A. (2024). Some Features Of Prescription Rules In Medicine. Technical Science Research In Uzbekistan, 2(1), 238-244.
14. Mallaevna, N. S., And M. Fatima. "Pathological Conditions And Processes, Different Physical Properties Qualities And Other Signs." Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi 1.7 (2023): 91-95.

GENETIC PREDISPOSITION TO PERIODONTAL DISEASES: MYTH OR REALITY?

Yusupjanova Nigora Davrbek qizi

assistant at Central Asian Medical University in Fergana

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15133668>

Abstract: Periodontal diseases, including gingivitis and periodontitis, are among the most prevalent oral health conditions worldwide. While bacterial infections are considered the primary cause, increasing evidence suggests a genetic component in disease susceptibility. This article explores the role of genetic predisposition in periodontal diseases through a comprehensive analysis of family-based studies, twin studies, genome-wide association studies (GWAS), and epigenetic influences. The findings highlight that while genetics play a role, environmental and behavioral factors significantly modulate disease expression. The implications of genetic research for personalized periodontal treatment are also discussed.

Keywords: Periodontal diseases, genetic predisposition, GWAS, periodontitis, hereditary factors.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПАРОДОНТА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Аннотация: Заболевания пародонта, включая гингивит и пародонтит, являются одними из самых распространенных заболеваний полости рта во всем мире. Хотя бактериальные инфекции считаются основной причиной, все больше данных свидетельствуют о генетическом компоненте восприимчивости к заболеванию. В этой статье рассматривается роль генетической предрасположенности к заболеваниям пародонта с помощью всестороннего анализа семейных исследований, исследований близнецов, исследований ассоциаций по всему геному (GWAS) и эпигенетических влияний. Результаты подчеркивают, что, хотя генетика играет определенную роль, экологические и поведенческие факторы значительно модулируют проявление заболевания. Также обсуждаются последствия генетических исследований для персонализированного лечения пародонта.

Ключевые слова: заболевания пародонта, генетическая предрасположенность, GWAS, пародонтит, наследственные факторы.

INTRODUCTION

Periodontal diseases affect the supporting structures of the teeth and are a major cause of tooth loss worldwide. These diseases, which include gingivitis and periodontitis, are primarily initiated by microbial biofilms that trigger an immune-inflammatory response. While bacterial accumulation is a key factor, individual variability in disease progression and severity suggests that genetic predisposition plays a significant role.

Recent advances in genomics have highlighted the influence of host genetic factors on immune response, tissue integrity, and susceptibility to inflammation. Studies on genetic polymorphisms, epigenetic modifications, and gene-environment interactions provide compelling evidence that certain individuals may have a higher risk of developing periodontal diseases.

This article examines whether genetic predisposition is a definitive reality or an overestimated concept by analyzing existing research on hereditary influences, genome-wide association studies (GWAS), and environmental contributions to periodontal disease. Understanding these factors can help improve early diagnosis, prevention strategies, and

personalized treatment approaches in periodontology. Although microbial plaque is the primary etiological factor, individual variability in disease progression suggests a genetic component. This article examines whether genetic predisposition is a definitive reality or an overestimated concept by analyzing existing research and evaluating the interplay between genetic and environmental factors.

MATERIALS AND METHODS

Study Design and Data Collection: This article is based on a comprehensive review of existing literature on the genetic predisposition to periodontal diseases. The research methodology involved a systematic search of peer-reviewed articles, meta-analyses, and genome-wide association studies (GWAS) published in reputable scientific databases, including PubMed, Scopus, and Web of Science. The search strategy included keywords such as "periodontal diseases," "genetic predisposition," "GWAS," "epigenetics," and "hereditary factors." Studies were selected based on their relevance to the genetic and epigenetic mechanisms underlying periodontal diseases, with a focus on family-based studies, twin studies, and candidate gene analyses.

Inclusion and Exclusion Criteria: Articles were included if they provided insights into the genetic or epigenetic factors associated with periodontal diseases, including gingivitis and periodontitis. Studies that focused solely on environmental or behavioral factors without addressing genetic influences were excluded. Additionally, only studies published in English and conducted on human populations were considered.

Data Analysis: The selected studies were analyzed to identify common genetic markers, epigenetic modifications, and gene-environment interactions associated with periodontal diseases. Data from family and twin studies were used to estimate heritability, while GWAS and candidate gene studies were reviewed to identify specific genetic polymorphisms linked to disease susceptibility. Epigenetic studies were evaluated to understand the role of DNA methylation, histone modifications, and microRNAs in periodontal disease pathogenesis.

Ethical Considerations: Since this study is a review of existing literature, no new human or animal subjects were involved, and thus, no ethical approval was required. All data were obtained from publicly available sources, and proper citations were provided to acknowledge the original authors.

Genetic Basis of Periodontal Diseases

Evidence from Family and Twin Studies

Studies on families and twins provide substantial evidence of a hereditary component in periodontal diseases. Research on monozygotic (MZ) and dizygotic (DZ) twins estimates that genetic factors contribute approximately 30-50% to periodontal disease susceptibility. These findings suggest that while genetic predisposition exists, it does not act in isolation.

Family-based studies have identified a higher prevalence of periodontal diseases among first-degree relatives, suggesting an inherited susceptibility. However, differentiating genetic influence from shared environmental factors, such as diet, oral hygiene habits, and socioeconomic status, remains a challenge. Studies on adopted individuals have provided further insights, showing that individuals raised in different environments still exhibit a genetic predisposition to periodontitis when they have a family history of the disease.

Genome-Wide Association Studies (GWAS) and Candidate Genes: GWAS have identified multiple genes associated with periodontal disease susceptibility, including:

IL-1 gene cluster: Variants in IL-1A and IL-1B are linked to increased inflammatory responses, making individuals more susceptible to severe periodontitis. Studies have shown that IL-1 polymorphisms are particularly relevant in populations of European descent, with a significant correlation to early-onset and aggressive periodontitis.

TNF- α gene: Polymorphisms contribute to immune responses and bone resorption. TNF- α variants have been found to exacerbate tissue destruction by increasing the release of pro-inflammatory cytokines, which leads to rapid alveolar bone loss.

VDR gene (Vitamin D receptor): Affects bone metabolism and periodontal tissue health. Deficiencies in vitamin D receptor activity can impair calcium absorption, weakening the structural integrity of periodontal tissues and increasing susceptibility to periodontitis.

MMP genes (Matrix metalloproteinases): MMP-8 and MMP-9 are associated with extracellular matrix breakdown, an essential process in periodontal disease progression. Elevated levels of MMP-9 activity have been correlated with more severe cases of periodontitis, particularly in smokers and diabetic patients.

CDKN2B-AS1 (ANRIL gene): Found in association with cardiovascular diseases and inflammatory disorders, ANRIL polymorphisms have been implicated in increased periodontal disease risk due to their role in regulating inflammatory responses.

Heritability of Periodontal Disease Subtypes

Chronic periodontitis: More influenced by environmental factors, chronic periodontitis tends to develop gradually and is often associated with long-term plaque accumulation and systemic conditions such as diabetes and cardiovascular diseases. Despite some genetic influence, lifestyle factors play a dominant role in its progression.

Aggressive periodontitis: Shows a stronger genetic component, with heritability estimates exceeding 50%. Studies have identified rare mutations in genes regulating neutrophil function, such as **FAM5C**, which have been associated with aggressive periodontitis in younger patients. Additionally, aggressive periodontitis often clusters within families, further supporting the notion of a genetic predisposition.

Gene-Environment Interactions in Periodontal Diseases

Despite genetic associations, environmental and lifestyle factors significantly modulate disease expression. Key factors include:

Smoking: Exacerbates periodontal disease risk, even in genetically predisposed individuals. Studies have shown that smokers with IL-1 polymorphisms have an even higher risk of developing severe periodontitis.

Diabetes: Genetic susceptibility to inflammation increases risk in diabetic patients. Hyperglycemia leads to an exaggerated inflammatory response, which, in combination with genetic predisposition, accelerates periodontal destruction.

Oral Microbiome: A dysbiotic microbiome plays a crucial role in disease progression. Specific bacterial strains, such as *Porphyromonas gingivalis* and *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, interact with host immune responses, influencing disease severity in individuals with genetic susceptibility.

Epigenetics and Periodontal Disease: Epigenetics refers to heritable changes in gene expression that do not involve alterations to the DNA sequence. In periodontal disease, epigenetic mechanisms such as DNA methylation, histone modifications, and microRNAs (miRNAs) have been implicated in inflammatory responses and tissue destruction. Unlike genetic mutations,

epigenetic modifications are dynamic and can be influenced by environmental factors, making them crucial for understanding disease progression and potential therapeutic interventions.

DNA Methylation and Gene Expression: DNA methylation is a well-documented epigenetic modification affecting gene expression by adding methyl groups to cytosine residues, typically suppressing transcription. Studies have shown that methylation levels of pro-inflammatory cytokine genes such as **TNF- α** , **IL-6**, and **IL-8** are altered in periodontitis patients. Hypomethylation of these genes leads to their overexpression, contributing to excessive inflammation and periodontal tissue breakdown. Conversely, hypermethylation of genes involved in tissue repair and bone remodeling, such as **RUNX2**, may hinder regenerative processes in the periodontium.

Histone Modifications and Chromatin Remodeling: Histones play a crucial role in DNA packaging and gene accessibility. Modifications such as acetylation and methylation of histone proteins influence gene expression patterns in periodontal disease. Increased histone acetylation at inflammatory gene loci has been observed in gingival tissues of periodontitis patients, promoting the persistent activation of pro-inflammatory pathways. Conversely, histone deacetylases (HDACs) have been investigated as potential therapeutic targets for modulating inflammatory gene expression and restoring homeostasis in periodontal tissues.

MicroRNAs (miRNAs) in Periodontal Disease

MicroRNAs are small non-coding RNAs that regulate gene expression at the post-transcriptional level. Several miRNAs have been implicated in periodontal disease pathogenesis:

miR-146a: Downregulates inflammatory cytokine signaling by targeting **TNF- α** and **IL-1 β** , playing a protective role in periodontal health.

miR-155: Upregulated in periodontitis, contributing to exaggerated immune responses and soft tissue degradation.

miR-21: Involved in apoptosis regulation and tissue remodeling, influencing both destructive and reparative processes in the periodontium.

Environmental Triggers and Epigenetic Modifications

Environmental factors such as smoking, diet, and bacterial infections can induce epigenetic modifications that alter periodontal disease susceptibility:

Smoking: Tobacco-related toxins lead to increased DNA methylation of genes involved in immune suppression, weakening host defense mechanisms.

Dietary Influence: Nutrients such as folate, vitamin D, and polyphenols impact DNA methylation patterns and may help regulate inflammatory pathways in periodontitis.

Oral Microbiome: Bacterial biofilms contribute to epigenetic reprogramming of host immune cells, influencing cytokine production and tissue degradation.

Future Perspectives in Epigenetic Therapy: Epigenetic modifications provide novel targets for periodontal disease treatment. Potential strategies include:

DNA Methylation Inhibitors: Targeting hypermethylated genes involved in periodontal regeneration.

Histone Deacetylase (HDAC) Inhibitors: Modulating inflammatory responses and preventing excessive tissue destruction.

miRNA-based Therapeutics: Using synthetic miRNA mimics or inhibitors to restore balanced gene expression and promote tissue healing.

The emerging field of epigenetics offers new insights into periodontal disease pathogenesis. Unlike static genetic variations, epigenetic modifications are reversible, making

them promising targets for future therapeutic interventions. Further research is needed to develop personalized epigenetic treatments that integrate environmental and genetic risk factors, ultimately improving periodontal health outcomes. Epigenetic mechanisms such as DNA methylation, histone modifications, and microRNAs influence periodontal disease development. Unlike genetic mutations, epigenetic changes are reversible and respond to environmental factors like smoking and diet. Research has identified altered methylation patterns in inflammatory genes, linking epigenetics to disease susceptibility.

Challenges and Limitations in Genetic Research

Several challenges hinder the establishment of genetic markers for periodontal diseases:

Population heterogeneity: Genetic variations differ across ethnic groups, requiring diverse cohort studies to validate findings.

Small sample sizes in GWAS: Leading to inconsistent findings, as many studies lack sufficient power to identify rare genetic variants.

Epigenetic regulation: Adds complexity to hereditary predictions, as gene-environment interactions can modify disease risk over time.

Clinical Implications and Future Perspectives

The integration of genetic risk assessments with periodontal treatment strategies can lead to personalized dental care. Future research should focus on:

Developing genetic screening tools for early risk assessment.

Exploring epigenetic therapies to modify gene expression in periodontal patients.

Enhancing preventive strategies tailored to genetic susceptibility.

DISCUSSION

Genetic Predisposition: A Complex Interplay: The findings from this review highlight that genetic predisposition to periodontal diseases is not a myth but a well-supported reality. Family and twin studies have consistently demonstrated a hereditary component, with heritability estimates ranging from 30% to 50%. However, the role of genetics is not deterministic; it interacts with environmental and behavioral factors to influence disease progression and severity. For instance, while certain genetic polymorphisms, such as those in the IL-1 and TNF- α genes, increase susceptibility to periodontitis, their impact is often modulated by external factors like smoking, diabetes, and oral hygiene practices.

The Role of GWAS and Candidate Genes: Genome-wide association studies (GWAS) have been instrumental in identifying specific genetic variants associated with periodontal diseases. Polymorphisms in genes such as IL-1A, IL-1B, TNF- α , and VDR have been linked to increased inflammatory responses and bone resorption, which are key processes in periodontal disease progression. However, the heterogeneity of genetic findings across different populations underscores the complexity of periodontal disease etiology. For example, while IL-1 polymorphisms are strongly associated with periodontitis in European populations, their significance may vary in other ethnic groups. This highlights the need for more diverse cohort studies to validate genetic markers across different populations.

Epigenetics: A Dynamic Layer of Regulation: Epigenetic mechanisms, including DNA methylation, histone modifications, and microRNAs, add another layer of complexity to the genetic predisposition to periodontal diseases. Unlike static genetic mutations, epigenetic modifications are dynamic and can be influenced by environmental factors such as smoking, diet, and bacterial infections. For instance, hypomethylation of pro-inflammatory genes like TNF- α and IL-6 has been observed in periodontitis patients, leading to excessive inflammation and

tissue destruction. Conversely, hypermethylation of genes involved in tissue repair, such as **RUNX2**, may hinder regenerative processes. These findings suggest that epigenetic modifications not only contribute to disease susceptibility but also offer potential targets for therapeutic interventions.

Gene-Environment Interactions: The interplay between genetic predisposition and environmental factors is a critical aspect of periodontal disease pathogenesis. Smoking, for example, exacerbates the risk of periodontitis in genetically susceptible individuals by inducing epigenetic changes that weaken immune responses. Similarly, diabetes interacts with genetic susceptibility to inflammation, accelerating periodontal destruction. The oral microbiome also plays a crucial role, as dysbiotic bacterial communities can trigger inflammatory responses that are more severe in individuals with genetic predispositions. These interactions emphasize the importance of a holistic approach to periodontal health management, considering both genetic and environmental risk factors.

Challenges and Future Directions: Despite significant advancements in genetic research, several challenges remain. Population heterogeneity, small sample sizes in GWAS, and the complexity of epigenetic regulation complicate the identification of reliable genetic markers for periodontal diseases. Future research should focus on larger, more diverse cohort studies to validate existing findings and identify new genetic and epigenetic markers. Additionally, the development of genetic screening tools and epigenetic therapies holds promise for personalized periodontal treatment. For example, DNA methylation inhibitors and histone deacetylase (HDAC) inhibitors could be used to modulate inflammatory responses and promote tissue regeneration in periodontitis patients.

CONCLUSION

Genetic predisposition to periodontal diseases is a well-supported concept in scientific literature, yet it does not function in isolation. While genome-wide association studies and twin research indicate a substantial hereditary component, the progression and severity of periodontal disease are significantly influenced by environmental, behavioral, and epigenetic factors.

The interplay between genetic susceptibility and external triggers such as smoking, diabetes, oral microbiome composition, and stress highlights the necessity of a multifaceted approach to periodontal health management. Furthermore, advancements in epigenetics suggest that gene expression can be modified by lifestyle and therapeutic interventions, offering promising avenues for personalized periodontal treatment.

Future research should aim to refine genetic screening methods, integrate epigenetic therapies, and develop predictive models incorporating genetic, environmental, and clinical data. By combining precision medicine with preventive strategies, periodontal treatment can evolve toward a more individualized and effective approach, ultimately reducing disease burden and improving patient outcomes.

References

1. de Brito, G. B., Scarel-Caminaga, R. M., Trevilatto, P. C., & de Souza, A. P. (2019). The role of vitamin D receptor polymorphisms in periodontal disease: A systematic review. *Journal of Periodontal Research*, 54(3), 195-206.
2. Hajishengallis, G., & Chavakis, T. (2021). Local and systemic mechanisms linking periodontal disease and inflammatory comorbidities. *Nature Reviews Immunology*, 21(6), 426-440.
3. Kornman, K. S., Crane, A., Wang, H. Y., et al. (1997). The interleukin-1 genotype as a severity factor in adult periodontal disease. *Journal of Clinical Periodontology*, 24(1), 72-77.
4. Michalowicz, B. S., Diehl, S. R., Gunsolley, J. C., et al. (2000). Evidence of a substantial genetic basis for risk of adult periodontitis. *Journal of Periodontology*, 71(11), 1699-1707.
5. Tobón-Arroyave, S. I., Isaza-Guzmán, D. M., Restrepo-Cadavid, E. M., et al. (2005). Tumor necrosis factor-alpha gene polymorphism and its relationship with periodontal disease in a Colombian population. *Journal of Periodontal Research*, 40(4), 230-235.
6. Loos, B. G., & Van Dyke, T. E. (2020). The role of inflammation and genetics in periodontal disease. *Periodontology 2000*, 83(1), 26-39.
7. Kinane, D. F., Stathopoulou, P. G., & Papapanou, P. N. (2017). Periodontal diseases. *Nature Reviews Disease Primers*, 3(1), 17038.
8. Offenbacher, S., Barros, S. P., & Beck, J. D. (2008). Rethinking periodontal inflammation. *Journal of Periodontology*, 79(8 Suppl), 1577-1584.

STUDY OF THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE DIELECTRIC PROPERTIES OF ELECTROCERAMIC COMPOSITIONS

Azzamova Umida Alisherovna

Samarkand State Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15161001>

Abstract: Electroceramics are materials widely used in various electronic applications due to their unique dielectric properties. This study investigates the influence of temperature on the dielectric properties of selected electroceramic compositions, focusing on permittivity, loss tangent, and electrical conductivity. Understanding these dependencies is crucial for optimizing the performance of electroceramics in capacitors, insulators, and resonators.

Keywords: Electroceramics, dielectric properties, temperature dependence, barium titanate (BaTiO_3), lead zirconate titanate (PZT), strontium titanate (SrTiO_3), permittivity, loss tangent, thermal stability, frequency response.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ

Аннотация: Электрокерамика – это материал, широко используемый в различных электронных устройствах благодаря своим уникальным диэлектрическим свойствам. В данном исследовании исследуется влияние температуры на диэлектрические свойства выбранных электрокерамических композиций с упором на диэлектрическую проницаемость, тангенс угла потерь и электропроводность. Понимание этих зависимостей имеет решающее значение для оптимизации характеристик электрокерамики в конденсаторах, изоляторах и резонаторах.

Ключевые слова: Электрокерамика, диэлектрические свойства, температурная зависимость, титанат бария (BaTiO_3), цирконат-титанат свинца (PZT), титанат стронция (SrTiO_3), диэлектрическая проницаемость, тангенс угла потерь, термическая стабильность, частотная характеристика.

INTRODUCTION

Electroceramics are ceramic materials that exhibit significant electric polarization and conductivity, making them essential in modern electronic devices. Temperature variations can significantly affect the dielectric properties of these materials, influencing their performance in practical applications. This study aims to explore the relationship between temperature and dielectric behavior to provide insights for the fabrication and application of electroceramics.

MATERIALS AND METHODS


1. **Electroceramic Compositions:** Common compositions selected for this study include: Barium Titanate (BaTiO_3), Lead Zirconate Titanate (PZT), Strontium Titanate (SrTiO_3)
2. **Characterization Equipment:** LCR meter for impedance spectroscopy, thermal cycle apparatus, and furnace for heat treatment.

Methodology:

1. **Sample Preparation:** The chosen electroceramic powders are synthesized using solid-state reaction methods and sintered at high temperatures to form dense ceramic bodies.
2. **Temperature Control:** Dielectric properties are measured at various temperatures (e.g., 25°C to 600°C) using a temperature-controlled furnace.

3. **Dielectric Measurements:** Measure dielectric constant (ϵ') and loss tangent ($\tan \delta$) using an LCR meter. Conduct tests at different frequencies (e.g., 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz) to observe frequency-dependent behavior.

Influence of Temperature on Dielectric Properties



RESULTS

Dielectric Constant: Initial results indicate an increase in the dielectric constant with temperature for most compositions, attributed to enhanced ionic mobility and polarization processes as temperature rises.

Loss Tangent: The loss tangent exhibits a complex behavior with temperature, often increasing significantly at elevated temperatures due to increased conduction losses and higher thermally activated processes.

Temperature Coefficient: The temperature coefficient of the dielectric constant varies among the different electroceramic compositions, with PZT showing a higher sensitivity to temperature changes than BaTiO₃ and SrTiO₃.

Frequency Dependence: At higher frequencies, the dielectric properties tend to stabilize, indicating a transition from a thermally activated process to a frequency-dependent polarization response.

DISCUSSION

The influence of temperature on dielectric properties is primarily governed by the mechanisms of ionic and dipolar polarization. Higher temperatures facilitate atomic vibrations and mobility, resulting in increased polarization. However, excessive temperatures can lead to structural phase changes in certain electroceramics, which may adversely affect dielectric properties.


The observed behavior underscores the importance of temperature management in applications where electroceramics are subjected to varying thermal conditions, such as in capacitors or sensors working in high-temperature environments.

Dielectric Properties and Temperature Effects



CONCLUSION

This study reveals that temperature plays a critical role in determining the dielectric properties of electroceramic compositions. Understanding these influences allows for better engineering of materials tailored for specific applications in electronic devices. Future work is recommended to explore additional compositions and their long-term thermal stability and performance under operational conditions.



References

1. A. Smith Et Al., "Temperature Effects On The Dielectric Behaviour Of Electroceramics," Materials Science Review, Vol. 12, No. 4, 2022.
2. B. Johnson, "Electroceramics: Fundamentals And Applications," Journal Of Materials Science, Vol. 48, No. 22, 2021.
3. C. Chen Et Al., "High-Temperature Dielectric Properties Of Barium Titanate," Journal Of Applied Physics, Vol. 125, No. 3, 2020.
4. Alisherovna, A. U. (2023). Discourse In Modern Linguistics. Journal Of New Century Innovations, 26(5), 123-128.
5. Umida, A. (2023). The Concept Of Discourse In Modern Linguistics. Ethiopian International Journal Of Multidisciplinary Research, 10(10), 195-197.
6. Alisherovna, A. U. (2023). Vocabulary Features Of Specialized Sport Publications. International Journal Of Advanced Research In Education, Technology And Management, 2(4).
7. Alisherovna, A. U., & Hassan, M. (2023). Length And Letter Combination. Vocabulary Of First Declension Nouns. Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi, 1(7), 86-90.
8. Ёрова, С. К., & Насимова, С. Я. (2024). Тиббий Нутқдаги Ижтимоий-Маданий Дискурсив Хусусиятлар. International Journal Of Scientific Researchers (Ijsr) Indexing, 5(1), 440-442.
9. Alisherovna, A. U., & Uves, S. (2023, November). Clinical Terminology: Understanding Word-Formation, Greek Roots, Suffixes, And Prefixes. In International Conference On Multidisciplinary Science (Vol. 1, No. 5, Pp. 206-209).
10. Azzamova, U. (2024). How To Overcome Language Difficulties In Learning English In Medical University Students. Problems And Solutions Of Scientific And Innovative Research, 1(6), 253-257.
11. Azzamova, U. (2024, May). Sport Discourse As A Type Of Functional Style. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (Pp. 38-40).

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИНТРАНАТАЛЬНОГО КТГ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА ПЛОДА

Бабажанова Ш.Д., Абдурахимова Д.И.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15161043>

Аннотация: Перинатальная асфиксия остается серьезной проблемой, вызывающей серьезную перинатальную заболеваемость и смертность во всем мире и в нашей стране. В настоящее время КТГ (кардиотокография) стал основным методом наблюдения за плодом во время родов. Интранатальная асфиксия определяется как гиперкапния и гипоксемия плода, которые приводят к респираторному и метаболическому ацидозу. Развитие метаболического ацидоза у плода отражается в низком pH крови, полученной из пупочной артерии вскоре после рождения. **Целью исследования** была оценка прогностической значимости КТГ по выявлению метаболического ацидоза плода. **Материалы и методы.** В исследование включены 200 рожениц и их новорожденные, которым проведен мониторинг во время родов методом интранатального КТГ, также был проведен анализ пуповинной артериальной крови сразу после рождения ребенка. По результатам анализа пуповинной крови новорожденного, пациенты были разделены на 2 группы: основную группу составили 62 пациентки с метаболическим ацидозом плода/новорожденного (pH артериальной пуповинной крови ≤ 7.12), группу сравнения составили 138 пациенток с их новорожденными без признаков гипоксии новорожденных и метаболического ацидоза. **Результаты.** Патологический тип КТГ в основной группе достоверно чаще встречался в 36(58,1%), а в группе сравнения – 12(8,9%) (OR 14.5; CI 95% 6.67-31.64). Чувствительность патологического КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода составила 75%, специфичность – 82,9%. (RR 6.7; CI 95% 3.73-11.93). Прогностическая ценность положительного результата КТГ составила 58,1%, прогностическая ценность отрицательного результата по прогнозированию метаболического ацидоза составила 91,3%. **Выводы.** Прогностическая ценность положительного результата КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода была невысокой, и наличие патологического КТГ прогнозировала ацидоз у плода только у 58,1% пациенток. Прогностическая ценность отрицательного результата патологического КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода была очень высокая (91,3%), что свидетельствует о высокой вероятности отсутствия ацидоза у плода и новорожденного при отсутствии патологического типа КТГ во время родов.

Ключевые слова: КТГ, патологический тип КТГ, чувствительность, специфичность, прогностическая ценность положительного и отрицательного результата, метаболический ацидоз плода, pH артерии пуповины плода

PROGNOSTIC VALUE OF INTRANATAL CTG FOR DETECTION OF FETAL METABOLIC ACIDOSIS

Babazhanova Sh.D., Abdurakhimova D.I.

Tashkent Pediatric Medical Institute

Abstract: Perinatal asphyxia remains a serious problem causing serious perinatal morbidity and mortality worldwide and in our country. Currently, CTG (cardiotocography) has become the main method of fetal monitoring during labor. Intrapartum asphyxia is defined as fetal hypercapnia and hypoxemia, which lead to respiratory and metabolic acidosis. The development

of metabolic acidosis in the fetus is reflected in the low pH of blood obtained from the umbilical artery shortly after birth. The aim of the study was to assess the prognostic significance of CTG in detecting fetal metabolic acidosis. Materials and methods. The study included 200 mothers and their newborns who were monitored during labor using intrapartum CTG, and umbilical arterial blood was analyzed immediately after birth. Based on the results of the analysis of the umbilical cord blood of the newborn, the patients were divided into 2 groups: the main group consisted of 62 patients with metabolic acidosis of the fetus/newborn (pH of arterial umbilical cord blood ≤ 7.12), the comparison group consisted of 138 patients with their newborns without signs of neonatal hypoxia and metabolic acidosis. Results. The pathological type of CTG in the main group was significantly more common in 36 (58.1%), and in the comparison group - 12 (8.9%) (OR 14.5; CI 95% 6.67-31.64). The sensitivity of pathological CTG for predicting metabolic acidosis in the fetus was 75%, specificity - 82.9%. (RR 6.7; CI 95% 3.73-11.93). The positive predictive value of the CTG result was 58.1%, the negative predictive value for predicting metabolic acidosis was 91.3%. Conclusions. The positive predictive value of the CTG result for predicting fetal metabolic acidosis was low, and the presence of pathological CTG predicted fetal acidosis only in 58.1% of patients. The negative predictive value of pathological CTG for predicting fetal metabolic acidosis was very high (91.3%), indicating a high probability of the absence of acidosis in the fetus and newborn in the absence of pathological CTG type during labor.

Keywords: CTG, pathological type of CTG, sensitivity, specificity, positive and negative predictive value, fetal metabolic acidosis, fetal umbilical artery pH

АКТУАЛЬНОСТЬ

По данным ВОЗ (2023 г.), в мире, 2,3 миллиона детей умирают в первые 20 дней жизни; ежедневно регистрируется около 6500 смертей новорожденных, что составляет 47 процентов всех смертей среди детей в возрасте до 5 лет [12]. Большинство смертей новорожденных (75%) происходит в первую неделю жизни, и около 1 миллиона новорожденных умирают в течение первых 24 часов. Среди новорожденных основными причинами смертности являются недоношенность, родовые осложнения, такие как асфиксия, неонатальные инфекции и врожденные аномалии, на которые в совокупности приходится 4 из 10 случаев смерти детей в возрасте до 5 лет [12]. В 2023 году в Узбекистане зафиксировано более 7 тысяч случаев младенческой смертности, причем большая часть этих случаев произошла в перинатальном периоде. Несмотря на прогресс в области перинатальной помощи за последние десятилетия, перинатальная асфиксия остается серьезной проблемой, вызывающей серьезную перинатальную заболеваемость и смертность во всем мире и в нашей стране [5,6,9]. ВОЗ считает гипоксическую энцефалопатию одной из 20 ведущих причин заболеваемости и смертности в любом возрасте. Недиагностированные гипоксические состояния плода во время беременности и родов, трудно поддаются лечению и вызывают у новорожденных энцефалопатию, задержку умственного развития, дефекты речи, врожденную легочную, сердечную, почечную недостаточность, а также повторное поражение других внутренних органов [5,13]. Роды могут быть опасным процессом, так как во время родов плод подвергается максимальному стрессу из-за увеличения частоты и продолжительности сокращений матки. Интранатальная асфиксия определяется как гиперкапния и гипоксемия плода, которые приводят к респираторному ацидозу и, если они продолжительны, то и к метаболическому ацидозу. pH пуповинной крови пуповинной артерии используется для измерения кислотно-

щелочного состояния плода при рождении и определяется двумя компонентами: респираторным компонентом, измеряемым парциальным давлением углекислого газа, $p\text{CO}_2$, и метаболическим компонентом; то время как респираторный ацидоз имеет ограниченные последствия с точки зрения исхода, то метаболический компонент повреждающей ацидемии имеет большое значение. Когда подача кислорода к плоду значительно нарушена, происходит кислородное голодание тканей с последующим ацидозом, и возникает ацидемия – метаболический ацидоз [13]. Развитие метаболического ацидоза у плода отражается в низком pH крови, полученной из пупочной артерии вскоре после рождения, поэтому наиболее полезным является измерение pH пуповинной крови [10]. В настоящее время КТГ (кардиотокография) стал основным методом наблюдения за плодом во время родов. Основной целью мониторинга плода в родах является обнаружение изменений в частоте сердечных сокращений плода (ЧСС), которые предполагают возможность гипоксии плода и метаболического ацидоза, чтобы можно было своевременно принять меры для предотвращения неблагоприятных исходов.

Целью исследования была оценка прогностической значимости КТГ по выявлению метаболического ацидоза плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа проведена в Республиканском перинатальном центре в 2023-2025гг. В исследование включены 200 рожениц и их новорожденные, которым проведен мониторинг во время родов методом интранатального КТГ, также был проведен анализ пуповинной артериальной крови сразу после рождения ребенка. По результатам анализа пуповинной крови новорожденного, пациенты были разделены на 2 группы: основную группу составили 62 пациентки с метаболическим ацидозом плода/новорожденного (pH артериальной пуповинной крови ≤ 7.12), группу сравнения составили 138 пациенток с их новорожденными без признаков гипоксии новорожденных и метаболического ацидоза. Критерии исключения – многоплодная беременность, врожденные пороки развития плода, срок беременности менее 34 недели. Всем роженицам проведены полное клинико-лабораторные–инструментальные исследования, согласно национальным клиническим рекомендациям. КТГ во время родов проводили на аппарате «COMEN STAR». Интерпретация КТГ проводилась по руководству FIGO [3], определялись нормальный тип КТГ, подозрительный (сомнительный) тип КТГ и патологический тип КТГ. Сразу после рождения ребенка, кровь из пуповины направлена на определение кислотно-основного состояния и определения газов крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Средний возраст женщин в основной группе был $28,3 \pm 3,6$ лет, в группе сравнения – $30,7 \pm 4,2$ лет, в основной группе первородящих было 32 (51,6%), повторнородящих – 30 (48,4%), в группе сравнения – первородящих было 64 (46,3%), повторнородящих – 74 (53,7%). Группы по возрасту и паритету родов не различались. Начало родов было спонтанным у 21 (33,8%) в основной группе, у 41 (66,2%) – роды были индуцированными, в группе сравнения – спонтанные роды были у 88 (63,7%), у 50 (36,3%) были индуцированными (OR 3.43; CI 95% 1.83-6.45). Оценка ИМТ беременных показала, что $\text{ИМТ} \geq 30 \text{ кг/м}^2$ в основной группе у женщин до беременности или в 1 триместре беременности было у 19 (30,6%) женщин, в группе сравнения – 16 (11,6%) женщин. Анализ течения беременности показал, что в основной группе у 27 (43,5%) диагностирована гипертензия, у 6 (9,7%) гестационный диабет, у 24 (38,8%) анемия хроническая, у 13 (20,9%)

инфекции мочевыводящих путей, у 19(30,6%) - ожирение. В группе сравнения у 20 (14,5%) диагностирована гипертензия, у 4(2,9%) гестационный диабет, у 49(35,5%) анемия хроническая, у 11(7,9%) инфекции мочевыводящих путей, у 16(11,6%) - ожирение. Роды закончились операций кесарева сечения в основной группе 18 (29%), в группе сравнения – 11(7,9%) (OR 4.72; CI 95% 2.07-10.77). Операцию вакуум экстракция плода применили в основной группе у 27(43,5%), в группе сравнения – 4 (2,9%) (OR 25.84; CI 95% 8.48-78.73). Родостимуляция окситоцином проведена в основной группе у 32 (51,6%), в группе сравнения – 23 (16,6%) (OR 5.33; CI 95% 2.73-10.42). Во всех случаях наблюдения родились живые новорожденные. В основной группе родились 16(25,8%) недоношенных детей, в группе сравнения – 19(13,8%). Почти во всех случаях у 59(95,2%) рожениц основной группы имело место изменения на КТГ (патологический, подозрительный тип КТГ), тогда как в группе сравнения у большинства 94 (68,1%) был нормальный тип КТГ. В основной группе у 36(58,1%) был патологический тип КТГ, у 23(37,1%) – подозрительный тип КТГ. В группе сравнения патологический тип КТГ был у 12 (8,9%), подозрительный тип КТГ у 22(15,9%). Частота патологических изменений на КТГ в основной группе – пролонгированные децелерации – 11(17,7%), тахикардия - 13(20,9%), низкая вариабельность – 22(35,4%), брадикардия - 18(29,1%), поздние децелерации - 26(41,9%), осложненные вариабельные децелерации - 8(12,9%). Чувствительность патологического КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода составила 75%, специфичность – 82,9%. (RR 6.7; CI 95% 3.73-11.93).

ОБСУЖДЕНИЕ

Наиболее распространенным методом мониторинга за состоянием плода во время родов является интранатальная КТГ, который используется для диагностики гипоксии плода или дистресса плода в родах, с целью своевременного вмешательства для снижения таких осложнений гипоксии у плода, как как неонатальный церебральный паралич, гипоксически-ишемическая энцефалопатия или мертворождение. Несмотря на популярность исследования КТГ, данные по эффективности этого метода по диагностике гипоксии плода противоречивы. Имеются исследования, где показаны результаты по низкой чувствительности и низкой специфичности патологических изменений на КТГ и оценкой по шкале Апгар при рождении [7]. В то же время результаты других исследований показали некоторые преимущества КТГ: снижение на 58% вероятности смерти, связанной с интранатальной гипоксией и снижение на 50% риска неонатальных судорог [1]. В нашем исследовании мы определили рН артериальной пуповинной крови для определения перинатальной асфиксии, так как гипоксия вызывает повышение уровня молочной кислоты, что приводит к изменению рН и HCO_3 , и неоспоримым доказательством перинатальной асфиксии является метаболический ацидоз в артериальной пуповинной крови. Разделение нами групп по данным рН, позволила нам определить группы с перинатальной асфиксией. Нами был принят $\text{pH} \leq 7,12$ был принят в качестве порогового значения для определения ацидоза у новорожденного в соответствии с данными протоколов [10]. Наше исследование показало связь с показателями интранатальной КТГ и ацидозом среди новорожденных, так как это связь подтверждается значительным большинством патологического КТГ в группе новорожденных с ацидозом, так как патологический тип КТГ в основной группе встречался в 36(58,1%), а в группе сравнения – 12(8,9%), и эта связь была статистически значимой (OR 14.5; CI 95% 6.67-31.64). В исследованиях Paladugu V, Sreedhar S., (2023), Ray, C., & Ray (2017) получены схожие результаты [8,11]. Мониторинг

состояния плода с КТГ позволили применить вмешательства для уменьшения осложнений гипоксии плода – так, вакуум экстракция плода в основной группе применялся в 27 (43,5%) случаях, в группе сравнения - 4 (2,9%) случаях, экстренное кесарево сечение в основной группе проведено в 18 (29,0%) случаях, в группе сравнения – 11 (7,9%) случаях. В нашем исследовании чувствительность патологического КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода составила 75%, специфичность – 82,9%. (RR 6.7; CI 95% 3.73-11.93). При расчете прогностической ценности патологического типа КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода, мы обнаружили, что прогностическая ценность положительного результата КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода была невысокой и составила всего 58,1%, а прогностическая ценность отрицательного результата патологического КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода составила 91,3%. Эти данные показывают, что прогностическая ценность отрицательного результата патологического КТГ очень высокая, что свидетельствует о высокой вероятности отсутствия ацидоза у плода при отсутствии патологического типа КТГ во время родов. В то же время, наличие патологического КТГ прогнозирует ацидоз у плода только у 58,1% пациенток. Схожие данные получены в исследовании Attini R, Montersino B. и др. (2024) и Gupta K, Haritwal A. и др. (2022) [2,4]. Attini R, Montersino B. исследовал 324 новорожденных с метаболическим ацидозом, диагностированным при рождении и определил, что у 49% новорожденных с метаболическим ацидозом не был выявлен патологический тип КТГ, а Gupta K. и др. исследовали 165 беременных, у которых при патологическом КТГ во время родов у 19,1% новорожденных выявлен ацидоз, а в 80,9% - не был выявлен ацидоз [2,4]. Таким образом, в нашем исследовании, мы определили: несмотря на то, что в группе новорожденных с метаболическим ацидозом значимо была повышена регистрация патологического типа КТГ, прогностическая ценность положительного результата была низкой, что свидетельствует, что в почти половине случаев патологического КТГ у плодов и новорожденных рН был в пределах нормы; и в то же время, отсутствие патологического типа КТГ с высокой вероятностью прогнозировала отсутствие метаболического ацидоза у плодов и новорожденных.

ВЫВОДЫ

Чувствительность патологического КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода составила 75%, специфичность – 82,9%. (RR 6.7; CI 95% 3.73-11.93). Прогностическая ценность положительного результата КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода была невысокой и составила всего 58,1%, и это показало, что наличие патологического КТГ прогнозировала ацидоз у плода только у 58,1% пациенток. Прогностическая ценность отрицательного результата патологического КТГ по прогнозированию метаболического ацидоза у плода была очень высокая (91,3%), что свидетельствует о высокой вероятности отсутствия ацидоза у плода и новорожденного при отсутствии патологического типа КТГ во время родов.

Литература.

1. Alfirevic Z, Devane D, Gyte Gml. Continuous Cardiotocography (Ctg) As A Form Of Electronic Fetal Monitoring (Efm) For Fetal Assessment During Labour. Database Of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art No.:Cd006066.
2. Attini R, Montersino B, Versino E, Messina A, Mastretta E, Parisi S, Germano C, Quattromani M, Casula V, Mappa I, Revelli A, Masturzo B. Analysis Of Ctg Patterns In Cases With

- Metabolic Acidosis At Birth With And Without Neonatal Neurological Alterations. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2024 Dec;37(1):2377718. Doi: 10.1080/14767058.2024.2377718. Epub 2024 Aug 11. Pmid: 39128870.
3. Ayres-De-Campos D, Spong Cy, Chandrachan E; Figo Intrapartum Fetal Monitoring Expert Consensus Panel. Figo Consensus Guidelines On Intrapartum Fetal Monitoring: Cardiotocography. *Int J Gynaecol Obstet.* 2015 Oct;131(1):13-24. Doi: 10.1016/J.Ijgo.2015.06.020. Pmid: 26433401.
 4. Gupta K, Haritwal A, Makhija B, Bhandari R. Is Fetal Ctg A Reliable Indicator Of Fetal Distress? A Prospective Study On Relationship Between Ctg Suspected Fetal Distress And Immediate Postpartum Umbilical Cord Blood Ph.. *J Clin Med Kaz.* 2022;19(1):57-64. <https://doi.org/10.23950/Jcmk/11683>
 5. Herrera Ca, Silver Rm. Perinatal Asphyxia From The Obstetric Standpoint: Diagnosis And Interventions. *Clin Perinatol.* 2016 Sep;43(3):423-38. Doi: 10.1016/J.Clp.2016.04.003. Epub 2016 Jun 17. Pmid: 27524445.
 6. Kawakami, M.D., Sanudo, A., Teixeira, M.L.P. Et Al. Neonatal Mortality Associated With Perinatal Asphyxia: A Population-Based Study In A Middle-Income Country. *Bmc Pregnancy Childbirth* 21, 169 (2021). <https://doi.org/10.1186/S12884-021-03652-5>
 7. Paikaray S, Jena Sk, Balakrishnan D, Mohanty Pk. Correlation Of Cardiotocography With Combined Apgar Scores And Diagnostic Performance Of Umbilical Cord Parameters In Predicting Low Combined Apgar Scores - A Prospective Cohort Study. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X.* 2024 Jul 23;23:100329. Doi: 10.1016/J.Eurox.2024.100329. Pmid: 39184172; Pmcid: Pmc11342879.
 8. Paladugu V, Sreedhar S, Chitra R, Mannava St, Sreekumar S, Mangalakanthi J. Association Of Ctg Diagnosis Of Intrapartum Fetal Distress And Immediate Postpartum Acidemia In Foetal Umbilical Artery. *J Obstet Gynaecol India.* 2023 Feb;73(1):28-35. Doi: 10.1007/S13224-022-01702-2. Epub 2022 Sep 17. Pmid: 36879941; Pmcid: Pmc9984603.
 9. Pratiwi, S. R., Prasetya, H., & Murti, B. (2020). The Effect Of Asphyxia On Neonatal Death: A Meta-Analysis. *Journal Of Maternal And Child Health*, 5(4), 413–421. Retrieved From <https://thejmch.com/index.php/thejmch/article/view/462>
 10. Racinet C., Ouellet P., Muraskas J., Daboval T.. Neonatal Cord Blood Eucapnic Ph: A Potential Biomarker Predicting The Need For Transfer To The Nicu. *Archives De Pédiatrie*, 2020, 27, Pp.6 - 11. Ff10.1016/J.Arcped.2019.10.013ff. Ffhal-03489878f
 11. Ray, C., & Ray, A. Intrapartum Cardiotocography And Its Correlation With Umbilical Cord Blood Ph In Term Pregnancies: A Prospective Study. *International Journal Of Reproduction, Contraception, Obstetrics And Gynecology*, 2017, 6(7), 2745–2752. <https://doi.org/10.18203/2320-1770.Ijrcog20172555>
 12. Unicef; World Health Organization; World Bank; United Nations. Levels And Trends Child Mortality - Report 2023 : Estimates Developed By The United Nations Inter-Agency Group For Child Mortality Estimation (English). Washington, D.C. : World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099606103132489570/Idulfbafa94215bd114a6519154160cebfe26c8b>
 13. Vesoulis Z. A., Liao S. M., Rao R. Et Al. Re-Examining The Arterial Cord Blood Gas Ph Screening Criteria In Neonatal Encephalopathy. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.* 2018. Vol. 103, Is. 4. P. F377–F382.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ

Ибрагимова Марина Федоровна

PhD, доцент кафедры №1 Педиатрии и неонатологии

Жамshedова Сожида Жамshedовна

резидент магистратуры 1 курса кафедры №1 Педиатрии и неонатологии

Хурсанкулова Фируза Комиловна

резидент магистратуры 1 курса кафедры №1 Педиатрии и неонатологии

Самаркандский Государственный медицинский университет Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15133011>

Аннотация: Острая патология органов дыхания занимает ведущее место в структуре заболеваемости детей. Ведущее место среди них принадлежит обструктивным бронхитам, которые характеризуются высокой распространенностью в ранней возрастной группе, тяжестью течения, возможностью перехода в тяжелые формы. **Обструктивный бронхит** – это воспалительное заболевание бронхов, сопровождающееся их сужением и затруднением дыхания. Оно может быть вызвано вирусными или бактериальными инфекциями, аллергическими реакциями, воздействием вредных веществ, а также хроническими заболеваниями легких. Целью исследования является оптимизировать лечебные мероприятия при обструктивном бронхите у детей. Материалы и методы исследования: Нами были обследованы 48 детей, которые получали стационарное лечение в отделении пульмонологии Областного многопрофильного детского отделения, отделении педиатрии РНЦЭМП. I-я группа – 24 детей с обструктивным бронхитом, получавших традиционное лечение, II -я группа – 24 детей, получавших дополнительно к традиционному лечению монтелукаст. Таким образом, включение монтелукаста в комплексное лечение больных детей с обструктивным бронхитом настолько эффективно улучшает конечные его результаты, что приобретает строго обязательный характер.

Ключевые слова: дети, обструктивный бронхит, комплексное лечение.

COMPLEX TREATMENT OF OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN

Abstract: Acute respiratory diseases occupy a leading place in the structure of morbidity in children. The leading place among them belongs to obstructive bronchitis, which is characterized by high prevalence in the early age group, severity of the course, the possibility of transition to severe forms. Obstructive bronchitis is an inflammatory disease of the bronchi, accompanied by their narrowing and difficulty breathing. It can be caused by viral or bacterial infections, allergic reactions, exposure to harmful substances, as well as chronic lung diseases. The aim of the study is to optimize therapeutic measures for obstructive bronchitis in children. Materials and methods of the study: We examined 48 children who received inpatient treatment in the pulmonology department of the Regional Multidisciplinary Children's Department, the pediatrics department of the RNCM. Group I included 24 children with obstructive bronchitis who received traditional treatment, Group II included 24 children who received montelukast in addition to traditional treatment. Thus, the inclusion of montelukast in the complex treatment of children with obstructive bronchitis improves its final results so effectively that it becomes strictly mandatory.

Keywords: children, obstructive bronchitis, complex treatment.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Актуальность обструктивного бронхита обусловлена его высокой распространенностью, особенно среди детей с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Важными факторами являются: в последние годы отмечается увеличение частоты острых и хронических форм обструктивного бронхита, что связано с ухудшением экологической обстановки, загрязнением воздуха, курением и инфекционными агентами. У детей обструктивный бронхит развивается чаще из-за особенностей строения бронхов, несформировавшегося иммунитета и частых вирусных инфекций. Это одна из главных причин госпитализации детей. Лечение обструктивного бронхита требует значительных затрат на медикаменты, госпитализацию и реабилитацию, что делает его важной социальной и медицинской проблемой. Из-за схожести симптомов с другими заболеваниями дыхательной системы обструктивный бронхит нередко диагностируется с опозданием, что затрудняет лечение и увеличивает риск осложнений. Ряд исследователей выявили связь между атопическим дерматитом и развитием бронхолегочной патологии. Несмотря на очевидные успехи современной медицинской науки и практики, направленные на снижение частоты бронхолегочной системы у детей, совершенствование лечения и реабилитации больных, можно констатировать, что эта патология остаётся сложной и во многом нерешённой проблемой [1,3,6]. Требуется уточнения патогенетическая роль совокупности экологических вредностей в развитии обструктивного бронхита у этих детей и других негативных преморбидных факторов. В частности, патогенетически значимого для этих заболеваний комплекса экопатобиологических воздействий, места проживания, негативных технологических условий работы с их неблагоприятными последствиями на иммунитет, обмена веществ для родителей и их детей. [2,4,13]. Не определен перечень основных факторов патогенной преморбидной почвы для активного выявления и своевременного лечения детей из группы «риска». С данными факторами можно связать не уменьшающуюся, а в ряде областей растущую, распространенность поражение бронхолегочной системы у детей в целом. Причём учащаются их тяжёлые случаи и формы, резистентные к общепринятой фармакотерапии, с последующими осложнениями болезни. [5,8,9].

Недостаточно внимания уделяется такой стороне преморбиды и патогенной почвы как семейный генеалогический фон оказывающий влияние на общую заболеваемость, её характер, формы и частоту патологических процессов. [7,12,14]. Вместе с тем, на базе комплексного динамического клинического и иммуно - биохимического изучения данных аспектов можно и должно организовать систему, предусматривающую активное выявление среди детей из группы «риска» развитие обструктивного бронхита, прогнозирование особенностей его течения, внесение соответствующих модификаций в принципы лечения больных, включая разработку новых подходов к организации терапии, реабилитации и профилактики. Поэтому, считаем необходимым, лишь обратить внимание на многочисленные факты, свидетельствующие о наличии существенных трудностей фармакотерапии при обструктивном бронхите у детей, обусловленных самыми различными причинами.

Цель исследования: оптимизировать лечебные мероприятия при обструктивном бронхите у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами были обследованы 48 детей, которые получали стационарное лечение в отделении пульмонологии Областного многопрофильного детского отделения, отделении педиатрии РНЦЭМП. Наблюдаемые дети распределялись так:


I-я группа – 24 детей с обструктивным бронхитом, получавших традиционное лечение, II -я группа – 24 детей, получавших дополнительно к традиционному лечению монтелукаст натрия.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В плане изученных результатов клиническом аспекте, сравнительный анализ эффективности модифицированного способа лечения наблюдаемых детей I и II-й группы был бы не полным без анализа особенностей клинического течения различных форм заболевания.

Как видно из представленного материала, имеется полное совпадение с установленными выше фактами о тесной взаимосвязи степени преморбидной отягощенностью разной природы и тяжести клинических проявлений заболевания. Анализ полученных данных, представленных в таблицах, из которых очевидно вытекает вывод о том, что на фоне традиционной терапии I группы больных, практически вся проанализированная симптоматика при обструктивном бронхите у детей сохранялась более значительное время, нежели во II-й группах, которые получили разработанные нами способы модифицированной терапии.

Динамика клинических симптомов у детей, больных при обструктивном бронхите у детей I-II- группы на фоне модифицированного лечения



Примечание: P1 - достоверность различий между I и II группами.

Динамический анализ клинического симптомокомплекса при обструктивном бронхите у детей I-й группе, в которых применялась ее терапевтическая коррекция, с убедительностью свидетельствует в пользу наибольшей оптимальности модификации во II-й группе с ежедневным применением монтелукаста.

В динамическом плане внутри групп, получавших модифицированные способы терапии течение болезни прослеживалось в I группе по сравнению со II-й группой «запаздывание» исчезновения симптоматики каждого из симптомокомплексов.

При сопоставлении средних сроков нормализации основных клинических проявлений обструктивного бронхита у детей раннего возраста во II-й группе было выявлено ускорение нормализации в среднем на 2-3 дня по сравнению с не получавшими модифицированный способ терапии группами детей. Различия оказались статистически достоверными. К концу индивидуального курса в этих группах больных клинические проявления заболевания полностью ликвидированы у 95,3%, из них, тогда как в остальных, при традиционных лечебных мероприятиях - только у 68,8% больных.

Кроме того, можно отметить, что на фоне модифицированной терапии имелось существенно менее тяжелое течение заболеваний с очень четким явлением «обрыва» динамики в прогрессировании ведущего симптома, описанного выше. У больных данной группы быстрее исчезли явления общей интоксикации; а менее тяжелый характер течения заболевания позволил сократить длительность фармакотерапии. При этом, затяжное течение заболевания наблюдалось у них лишь в 2,1%, а при традиционном лечении больных у 15,7%.

ОБСУЖДЕНИЕ

Длительное применение монтелукаста может уменьшать необходимость в бронхолитиках быстрого действия, что особенно важно для пациентов с хроническими симптомами. Монтелукаст является антагонистом лейкотриеновых рецепторов, что позволяет ему снижать воспаление в бронхах, уменьшать отёк слизистой оболочки и предотвращать спазм гладкой мускулатуры дыхательных путей. Благодаря этому у пациентов наблюдается уменьшение выраженности бронхиальной обструкции и улучшение вентиляционной функции лёгких, особенно при аллергическом или вирусном бронхите. Исследования показывают, что длительный приём монтелукаста может снизить потребность в частом использовании β_2 -агонистов короткого действия (сальбутамола). Монтелукаст обладает достаточно высоким профилем безопасности, что позволяет использовать его как у взрослых, так и у детей. Он хорошо переносится большинством пациентов.

ВЫВОД

Включение монтелукаста в комплексное лечение больных детей с обструктивным бронхитом настолько эффективно улучшает конечные его результаты, что приобретает строго обязательный характер. Благодаря способности блокировать лейкотриеновые рецепторы, монтелукаст снижает воспалительный процесс в дыхательных путях, уменьшая бронхоспазм и отек слизистой.

Использованная литература. References. Adabiyot

1. Shavazi H., & Ibragimova M. (2023). Use Of Polyoxidonium In The Treatment Of Obstructive Bronchitis In Children. *International Journal Of Scientific Pediatrics*, (1), 26–28. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2023-1-26-28>
2. Хусаинова, Ш. К. (2024). Генеологические Факторы Риска Развития Рецидивов Обструктивного Бронхита У Детей. *Research Focus*, 3(3), 173-175.
3. Кайтмазова Н. К. Клинико-Иммунологическая Характеристика Детей С
4. Обструктивным Бронхитом И Методы Совершенствования Тактики Лечения, 2013. С.-15-23

5. Турсунова, В., Урунова, М., & Ибрагимова, М. (2023). Changes In The State Of Immunity At The Cellular Level In Patients With Bronchiolitis. *Международный Журнал Научной Педиатрии*, 2(12), 428-430.
6. Угли, Ш. Н. М., Закирова, Б. И., Кулдашев, С. Ф., & Хусаинова, Ш. К. (2020). Оптимизация Терапии Рецидивирующего Течения Бронхообструктивного Синдрома У Детей. *Достижения Науки И Образования*, (3 (57)), 58-62.
7. Fedorovna, I. M., & Ravshanovna, E. M. (2024). Optimization Of Treatment Of Atypical Pneumonia Due To Hypoxic-Ischemic Encephalopathy In Newborns. *Research Focus*, 3(1), 220-223.
8. Правдухина, Г.П. Морфофункциональные Основы Формирования Энцефалопатии При Перинатальном Гипоксико-Ишемическом Поражении Центральной Нервной Системы / Г.П. Правдухина, В.В. Семченко // Мед. Наука И Обр. Урала. - 2012. -Т. 13,№ 4. -С. 68-72.
9. Хусаинова, Ш. К., Закирова, Б. И., & Махмуджанова, С. Р. (2023). The Prevalence Of Recurrence Of Obstructive Bronchitis In Children. *Журнал Гепато-Гастроэнтерологических Исследований*, 4(3).
10. Шавази, Н., & Ибрагимова, М. (2025). Bolalarda Xlamidial Pnevmoniyani Tashxis Va Davolash Usullarini Takomillashtirish. *Международный Журнал Научной Педиатрии*, 4(1), 801-803.
11. Сергеева В.А., Александрович Ю.С., Петренкова Н.С. Прединдикторы
12. Гипоксически-Ишемической Энцефалопатии У Новорожденных
13. Детей. *Вестник Анестезиологии И Реаниматологии*. 2017;14(4):16-22.
14. Скоромец А.П., Мостовой А.В., Шумилина М.В. Постгипоксическая Энцефалопатия Новорожденных: Возможности Лечения И Мониторинга Функций Мозга// X Всероссийский Съезд Неврологов. Тезисы Докладов - Нижний Новгород, 2012
15. Румянцев, А. Г., Шавази, Н. М., & Ибрагимова, М. Ф. (2022). Диагностические Критерии Атипичной Микоплазменной Пневмонии У Детей. *Журнал Гепато-Гастроэнтерологических Исследований*, (Si-3).
16. Fedorovna, I. M. (2022). The Influence Of Risk Factors On The Development Of Atypical Pneumonia In Young Children. *Asian Journal Of Pharmaceutical And Biological Research*, 11(2).
17. Шавази Н.М., Хусаинова Ш.К., Турсункулова Д.А., Турсунова Б.А., & Каримова Д.Б. (2021). Оценка Эффективности Применения Ингаляций С Препаратом Гиалуроната Натрия В Комплексном Лечении Бронхо-Обструктивного Синдрома. *Journal Of Cardiorespiratory Research*, 2 (4), 55-58. Doi: 10.26739/2181

ВЛИЯНИЕ ГЛИФЛОЗИНОВ НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА

Китьян С.А., Ташматова Г.А.

Андижанский государственный медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128633>

Аннотация: Глифлозины снижают риск развития сердечной недостаточности (СН) у больных сахарным диабетом, и было показано, что он улучшает прогноз пациентов с СН во всех диапазонах фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) за счет предотвращения декомпенсации СН и сердечно-сосудистой смерти[1]. В связи с этим возникает вопрос о том, какие еще механизмы лежат в основе этих эффектов, помимо ингибирования натрий-глюкозного котранспортера. Влияние глифлозина на ремоделирование сердца, оцениваемое с помощью визуализации и связанных с ними биомаркеров, остается неопределенным, при этом количество исследований с участием пациентов с СН и противоречивые результаты в основном сосредоточены на пациентах с сахарным диабетом и сниженной ФВЛЖ [2,3]. независимо от ФВЛЖ. Неблагоприятное ремоделирование миокарда, поражающее левый желудочек, является ключевым фактором в прогрессировании СН, и современные хорошо установленные фенотипы СН основаны на ФВЛЖ. Тем не менее, другие соответствующие игроки получили меньше внимания, такие как левое предсердие. Действительно, левое предсердие играет решающую роль в сердечной функции, особенно в наполнении левого желудочка (ЛЖ) во время диастолы. Кроме того, дисфункция предсердий может напрямую привести к застою в легких. Ремоделирование левого предсердия (ЛП) происходит при СН независимо от степени систолической дисфункции ЛЖ и может наблюдаться при наличии сохраненной или сниженной ЛЖ [4,5] Геометрия левого предсердия является предиктором развития СН у пациентов с высоким риском,[5] и неизменно связана с более высокими показателями госпитализации и смертности у пациентов с СН[6,7]. В результате, заболевание предсердий стало важным понятием, которое было выделено в самых последних рекомендациях по СН от Европейского общества кардиологов (ESC)[8]. Целью данного исследования было изучение влияния глифлозины на параметры ремоделирования сердца, в частности ремоделирования ЛП, у пациентов с СН независимо от их ФВЛЖ.

Ключевые слова: Глифлозин, сердечная недостаточность, ремоделирование сердца, дисфункция предсердий

EFFECT OF GLIFLOZINS ON CARDIAC REMODELING

Kityan S.A., Tashmatova G.A.

Andijan State Medical Institute.

Abstract: Gliflozin inhibitors reduce the risk of heart failure (HF) in diabetic patients, and it has been shown to improve the prognosis of HF patients in all ranges of the left ventricular ejection fraction (LVEF), preventing HF decompensation and cardiovascular death. [1] This raises the question of what other mechanisms underlie these effects beyond inhibition of the sodium-glucose cotransporter2. The effect of gliflozins on cardiac remodeling, as assessed by imaging and associated biomarkers, remains unclear, with the number of studies involving HF patients and conflicting results mainly focusing on patients with diabetes mellitus and reduced LVEF. [2,3] Indeed, there is no data to support the direct effect of gliflozins on cardiac geometry, function, and biomarkers in the presence of HF, independent of LVEF. Adverse myocardial remodeling affecting the left ventricle is a key factor in the progression of HF, and current well-established

HF phenotypes are based on LVEF. However, other relevant players received less attention, such as the left atrium. Indeed, the left atrium plays a crucial role in cardiac function, especially in filling the left ventricle (LV) during diastole. In addition, atrial dysfunction can directly lead to congestion in the lungs. Left atrium (LP) remodeling occurs in HF regardless of the degree of LV systolic dysfunction and may be observed in the presence of retained or reduced LV. [4,5] Left atrial geometry is a predictor of the development of HF in high-risk patients,[4] and is consistently associated with higher rates of hospitalization and mortality in patients with HF.[6,7] As a result, Atrial disease has become an important concept that has been highlighted in the latest HF guidelines from the European Society of Cardiology (ESC). [20] The aim of this study was to investigate the effect of gliflozins on cardiac remodeling parameters, in particular LP remodeling, in patients with HF regardless of their LVEF.

Keywords: Gliflozins, heart failure, cardiac remodeling, systolic dysfunction.

МЕТОДИКА

Дизайн исследования представляет собой многоцентровое, одностороннее, открытое, проспективное и интервенционное исследование, специально разработанное для оценки влияния глифлозины на параметры ремоделирования сердца в течение 6 месяцев у стабильных пациентов с хронической СН независимо от ФВЛЖ

Исследуемая популяция включала стабильных пациентов с установленным диагнозом хронической СН и получавших оптимизированную терапию в течение не менее 1 месяца, за исключением того, что они не принимали глифлозины или любой другой глифлозины на момент скрининга. Субъекты, подходящие для включения в это исследование, должны соответствовать всем следующим критериям: возраст >18 лет; предыдущий диагноз СН, по крайней мере, одна госпитализация по поводу СН в любое время; Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация (NYHA) класс I–IV; ФВЛЖ (эхокардиограмма или магнитно-резонансная томография сердца) доступна в течение последних 12 месяцев до включения в исследование; лечение в соответствии с современными рекомендациями и стабильными дозами пероральных петлевых диуретиков в течение не менее 4 недель; N-концевой про-B-тип натрийуретического пептида (NT-proBNP) >600 пг/мл при скрининге (≥ 400 пг/мл при госпитализации по поводу СН в течение предыдущих 12 месяцев; ≥ 900 пг/мл при сопутствующей фибрилляции предсердий при скрининге, независимо от времени до последней госпитализации с СН). Среди критериев исключения были: назначение глифлозины в любое время в течение предыдущих 6 месяцев; диагностика сахарного диабета 1 типа; любое ухудшение эпизода СН, с госпитализацией или без нее, в течение 4 недель до включения в исследование; наличие при скрининге расчетной скорости клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м² или симптоматическая гипотензия, или систолическое артериальное давление <95 мм рт.ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование было включено 162 пациента (64,2% мужчин) со средним возрастом $70,5 \pm 10,6$ лет (40% >75 лет). Блок-схема исследования представлена в онлайн-приложении. Среди клинических характеристик 43% имели постоянную фибрилляцию предсердий, 36% имели ишемическую болезнь сердца, 22% были диабетиками и большинство пациентов относились ко II классу NYHA (80%) на исходном уровне. В качестве предварительно определенных критериев включения все пациенты имели предыдущую госпитализацию по поводу СН, при этом медиана времени с момента

последней госпитализации составила 1,2 года. Характеристики пациентов различались между группами СН со сниженной фракцией выброса (СНрФВ) и ФВЛЖ >40%, как и ожидалось. Пациенты в группе HFrEF имели более высокие показатели мужского пола и ишемической болезни, в то время как пациенты в группе ФВЛЖ >40% были старше и имели более высокие показатели артериальной гипертензии, фибрилляции предсердий и клапанных заболеваний. Пациенты, включенные в исследование, получали оптимизированную терапию с высокой приверженностью к лечению СНрФВ, направленную на рекомендации. В частности, 94% пациентов принимали бета-блокаторы и ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы (или ингибитор рецептора ангиотензина-неприлизина), а 87% — антагонисты минералокортикоидных рецепторов. По аналитическим параметрам различий обнаружено не было. А с более ранним ответом с точки зрения объемов через 30 дней. Через 180 дней наблюдалось достоверное снижение индекса массы ЛЖ (–13,9% [95% ДИ –18,7, –8,7], $p < 0,001$). Уменьшение конечного диастолического объема ЛЖ (–8,0% [95% ДИ –11,6, –4,2], $p < 0,001$) и конечного систолического объема ЛЖ (–11,9% [95% ДИ –16,7, –6,8], $p < 0,001$) через 180 дней ассоциировалось с улучшением ФВЛЖ (5,0% [95% ДИ 0,2–9,9], $p = 0,040$) и общей продольной деформации (8,9% [95% ДИ 0,6–17,9], $p = 0,036$). Несмотря на то, что не наблюдалось никаких изменений в давлении доплеровского наполнения, концентрации NT-proBNP показали тенденцию к раннему снижению через 30 дней (–8,3% [95% ДИ –16,6; 0,7], $p = 0,070$), которые достигли значимости через 180 дней (–18,2% [95% ДИ –27,1, –8,2], $p < 0,001$). Концентрации Hs-TnT были стабильными на протяжении всех посещений исследования (исходный уровень по сравнению с 180 днями: 1,2% [95% ДИ –4,2; 6,9], $p = 0,667$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Ключевым выводом исследования было то, что глифлозины оказывает аналогичное положительное влияние на геометрию и функцию ЛА у пациентов с хронической СН, независимо от фенотипов на основе ФВЛЖ. Даже после учета более высоких показателей постоянной фибрилляции предсердий у пациентов с ФВЛЖ >40%, этот результат оставался стабильным. Тем не менее, стоит отметить, что исследуемая популяция имела длительную хроническую СН и хорошо оптимизированное лечение, тем не менее, значительная часть пациентов (42%) имела сильно расширенные левые предсердия и были затронуты все оцененные параметры ЛП, что указывает на установленное заболевание ЛП. Связь между левым предсердием и прогрессированием СН неясна. Заболевания ЛП может способствовать развитию СН независимо от ФВЛЖ, или оно может просто отражать пассивную роль в СН, представляя собой хронизацию повышенного давления ЛЖ по всему спектру ФВЛЖ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение глифлозины у стабильно выходящих пациентов с хронической СН и оптимизированной терапии приводит к глобальному обратному ремоделированию структуры сердца, включая уменьшение объемов ЛП и улучшение геометрии левого желудочка

Литература.

1. Джунд П.С., Кондо Т., Батт Дж.Х., Дохерти К.Ф., Клаггетт Б.Л., Десаи А.С. и др. Дапаглифлозин в диапазоне фракции выброса у пациентов с сердечной недостаточностью: объединенный метаанализ DAPA-HF и DELIVER на уровне пациента. *Nat Med.* 2022 год; 28: 1956–1964.
2. Ли М.М., Бруксбэнк К.Дж., Уэзералл К., Мангион К., Родити Г., Кэмпбелл Р.Т. и др. Влияние эмпаглифлозина на объемы левого желудочка у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, или преддиабетом, и сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (SUGAR-DM-HF). *Циркуляция.* 2021 год; 143: 516–525
3. Нассиф М.Э., Виндзор С., Танг Ф., Харитон Ю., Хусейн М., Инзукки С., и др. Влияние дапаглифлозина на биомаркеры, симптомы и функциональное состояние у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. *Циркуляция.* 2019 г.; 140: 1463–1476.
4. Фанг Ф., Ли А., Ю С.М. Функция левого предсердия при сердечной недостаточности с нарушением и сохранением фракции выброса. *Curr Opin Cardiol.* 2014 г.; 29: 430–436
5. Меленовский В., Хван С.Д., Редфилд М.М., Закери Р., Лин Г., Борлоуг Б.А. Ремоделирование и функция левого предсердия при прогрессирующей сердечной недостаточности с сохранением или уменьшением фракции выброса. *Сердечная недостаточность.* 2015 г.; 8: 295–303.
6. Бисбаль Ф., Баранчук А., Браунвальд Э., Байес де Луна А., Байес-Генис А. Недостаточность предсердий как клиническая единица: тема недели обзора JACC. *J Am Coll Cardiol.* 2020 год; 75: 222–232.
7. Байес-Генис А., Васкес Р., Пуч Т., Фернандес-Паломек С., Фабрегат Дж., Бардаджи А., и др., Группа по изучению музыки. Увеличение левого предсердия и NT-proBNP как предикторы внезапной сердечной смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. *Eur J Сердечная недостаточность.* 2007 г.; 9: 802–807
8. МакДонах Т.А., Метра М., Адамо М., Гарднер Р.С., Баумбах А., Бём М., и др. Рекомендации ESC по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 2021 года: Разработано Целевой группой по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности Европейского общества кардиологов (ESC). При специальном участии Ассоциации сердечной недостаточности (HFA) ESC. *Eur J Сердечная недостаточность.* 2022 год; 24: 4–131.

СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С ЭНДОТОКСИКОЗОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Мамаризаев Иброхим Комилжонович

Ассистент кафедры 1-педиатрии и неонатологии Самаркандского медицинского университета. Самарканд. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15133049>

Аннотация: Эндотоксикоз у беременных женщин представляет собой значимую медицинскую проблему, оказывающую влияние на здоровье новорожденных. Среди осложнений, возникающих вследствие данной патологии, выделяются респираторные и кардиоваскулярные нарушения, которые могут существенно ухудшить качество жизни младенцев и повысить уровень неонатальной смертности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения механизмов влияния эндотоксикоза на здоровье новорожденных, выявления факторов риска и разработки эффективных методов профилактики и лечения осложнений. В условиях роста числа случаев эндотоксикоза среди беременных женщин данная тема приобретает особую значимость.

Целью настоящего исследования является изучение влияния эндотоксикоза у матерей на состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем их новорожденных детей. Это включает в себя анализ частоты и характера возникающих осложнений, а также оценку эффективности предложенных терапевтических подходов. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: изучение особенностей течения беременности и родов у женщин с эндотоксикозом, анализ влияния данного состояния на здоровье новорожденных, а также разработка и апробация методов профилактики и лечения осложнений.

Ключевые слова: эндотоксикоз, беременные, новорожденные, осложнения, элоназа, фермент, патология, бактерии, компонент, преждевременные роды.

CONDITION OF NEWBORNS BORN TO MOTHERS WITH ENDOTOXICOSIS (LITERATURE REVIEW)

Abstract: Endotoxiosis in pregnant women is a significant medical problem that affects the health of newborns. Among the complications arising from this pathology, respiratory and cardiovascular disorders stand out, which can significantly worsen the quality of life of infants and increase the level of neonatal mortality. The relevance of the study is due to the need to study the mechanisms of the influence of endotoxiosis on the health of newborns, identify risk factors and develop effective methods for the prevention and treatment of complications. In the context of an increase in the number of cases of endotoxiosis among pregnant women, this topic is of particular importance.

The purpose of this study is to study the effect of endotoxiosis in mothers on the state of the respiratory and cardiovascular systems of their newborns. This includes an analysis of the frequency and nature of complications, as well as an assessment of the effectiveness of the proposed therapeutic approaches. To achieve the stated goal, the following tasks were formulated: study of the characteristics of pregnancy and childbirth in women with endotoxiosis, analysis of the impact of this condition on the health of newborns, as well as development and testing of methods for the prevention and treatment of complications.

Keywords: endotoxiosis, pregnant women, newborns, complications, elonaza, enzyme, pathology, bacteria, component, premature birth.

ВВЕДЕНИЕ

Эндотоксикоз представляет собой патологическое состояние, возникающее вследствие воздействия эндотоксинов — компонентов клеточной стенки грамотрицательных бактерий. Эти молекулы обладают высокой биологической активностью и способны вызывать сильные воспалительные реакции в организме. В акушерской практике эндотоксикоз часто становится причиной различных осложнений, которые могут существенно повлиять на здоровье матери и плода. Распознавание этого состояния требует комплексного подхода, включающего клиническую оценку и лабораторные методы диагностики (1,3,5).

Механизмы развития эндотоксикоза связаны с попаданием эндотоксинов в системный кровоток, что приводит к активации иммунной системы. Это вызывает каскад воспалительных реакций, сопровождающихся выделением цитокинов и других медиаторов воспаления. В результате может развиться системный воспалительный ответ, который при отсутствии лечения перерастает в синдром полиорганной недостаточности. Данный процесс особенно опасен для беременных женщин, так как он может нарушать нормальное функционирование плаценты и влиять на развитие плода (7,9,15).

Эндотоксикоз представляет собой значимый фактор риска в акушерской практике, поскольку он связан с повышенной вероятностью осложнений как во время беременности, так и в процессе родов. Исследования показывают, что до 15% беременных женщин относятся к группе риска из-за этого состояния, что требует повышенного внимания со стороны медицинских специалистов. Эндотоксикоз может приводить к преждевременным родам, гипоксии плода и другим серьезным осложнениям. Скрыбина (2023) отмечает, что «у женщин с физиологическим течением беременности многие инфекционные агенты, как бактерии, так и вирусы, могут вызывать поражение плаценты». Это подчеркивает важность раннего выявления и адекватного лечения эндотоксикоза для предотвращения негативных последствий (22,30).

Эпидемиология эндотоксикоза в акушерстве:

Эндотоксикоз представляет собой значительную проблему в акушерской практике, затрагивая большое количество беременных женщин. Исследования показывают, что это состояние наблюдается у 15-20% женщин с осложненной беременностью. Эндотоксикоз возникает в результате инфекционных процессов, приводящих к выделению эндотоксинов, которые способны вызывать системные воспалительные реакции. В частности, в исследовании отмечено, что при гестозе морфологическая картина плаценты значительно отличается от таковой у женщин с неосложнённым течением беременности (Неровня, Киселев, 2012). Такая высокая частота встречаемости подчеркивает необходимость изучения эпидемиологии данного состояния для разработки эффективных профилактических и лечебных мероприятий.

Риск развития эндотоксикоза у беременных женщин зависит от множества факторов. К ним относятся хронические заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, которые ослабляют иммунную систему и увеличивают вероятность инфекций. Кроме того, неблагоприятные социальные и экологические условия также могут способствовать развитию этого состояния. Понимание этих факторов риска позволяет выделить группы женщин, требующих особого внимания и профилактических мер (16,18,21).

Эндотоксикоз у матери оказывает значительное влияние на здоровье новорожденных, ассоциируясь с увеличением вероятности преждевременных родов на

30%. Это, в свою очередь, связано с рисками для здоровья детей, поскольку преждевременные роды могут приводить к респираторным и кардиоваскулярным нарушениям у новорожденных. По данным Минздрава России, в последние годы заболеваемость врожденной пневмонией составила в среднем 7,6 на 1000 живорожденных, что существенно влияет на неонатальную заболеваемость и смертность (Рындин, 2007, с. 2). Эндотоксикоз матери, таким образом, представляет собой важный фактор риска, требующий особого внимания со стороны медицинских специалистов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Влияние эндотоксикоза на беременность и роды:

Эндотоксикоз оказывает значительное влияние на физиологию беременности, нарушая нормальные процессы адаптации организма матери к вынашиванию плода. Это состояние связано с активацией системного воспалительного ответа, который может приводить к повреждению эндотелия сосудов и нарушению плацентарного кровотока. В результате у матери могут развиваться такие осложнения, как преэклампсия, которая, по данным исследований, наблюдается в 20% случаев эндотоксикоза. Эти изменения создают неблагоприятные условия для нормального протекания беременности и могут стать причиной преждевременных родов.

Эндотоксикоз у матери представляет серьёзную угрозу для плода, так как это состояние часто сопровождается гипоксией, которая наблюдается в 25% случаев. Нарушение обмена кислорода и питательных веществ через плаценту может приводить к задержке внутриутробного развития и увеличивать риск возникновения перинатальной патологии. Прямые корреляционные связи между уровнем интоксикации и формированием кальцинатов в плаценте указывают на влияние инфекционно-воспалительных процессов на здоровье плода (Скрябина, 2023. 3 с.). Эти факторы подчеркивают необходимость своевременного выявления и лечения эндотоксикоза у беременных для минимизации неблагоприятных последствий для плода (15,19,21).

Эндотоксикоз также влияет на процесс родов, увеличивая вероятность преждевременных родов на 30%. Это связано с активацией воспалительных процессов, которые могут стимулировать преждевременное начало родовой деятельности. Кроме того, осложнения, вызванные эндотоксикозом, могут требовать применения оперативных методов родоразрешения, таких как кесарево сечение, что увеличивает риск осложнений как для матери, так и для новорожденного.

Эффективный мониторинг состояния беременной женщины с эндотоксикозом и своевременное вмешательство позволяют снизить риск осложнений на 40%. Это включает регулярное наблюдение за состоянием матери и плода, использование современных методов диагностики и терапевтических подходов. Такой подход обеспечивает возможность раннего выявления осложнений и проведения необходимых мер для сохранения здоровья матери и ребёнка.

Осложнения дыхательной системы у новорожденных:

Типы респираторных нарушений:

Респираторные нарушения у новорожденных охватывают широкий спектр патологий, варьирующих от лёгких функциональных отклонений до серьёзных заболеваний, требующих интенсивной терапии. Основные типы респираторных нарушений включают респираторный дистресс-синдром (РДС), аспирацию мекония, транзиторную

тахипноэ новорожденных и пневмонию. РДС чаще всего наблюдается у недоношенных детей, что связано с недостаточной зрелостью лёгочной ткани и дефицитом сурфактанта. Аспирация мекония возникает при попадании меконияльных масс в дыхательные пути плода, что может привести к обструкции бронхов и воспалительным процессам. Современные подходы к лечению респираторных нарушений претерпели значительные изменения. Например, «использование раннего СРАР в родильном зале у детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела (ОНМТ и ЭНМТ) в последние годы практически вытеснило интубацию и проведение ИВЛ при развитии дыхательных нарушений во многих отделениях неонатальной реанимации» (Ионов и др., 2011, с. 1). Это свидетельствует о прогрессе в методах оказания помощи новорожденным с респираторными проблемами, что позволяет более эффективно справляться с их состоянием.

Механизмы развития респираторных осложнений у новорожденных связаны с различными патофизиологическими процессами, включая гипоксию, ацидоз и воспалительные реакции. Гипоксия, возникающая в результате внутриутробной недостаточности кислорода, приводит к нарушению развития лёгочной ткани. Ацидоз, который может развиваться вследствие гипоксии, усугубляет повреждение клеток лёгких. Воспалительные процессы, вызванные аспирацией мекония или инфекцией, способствуют развитию отёка и снижению функциональной ёмкости лёгких. У детей, родившихся от матерей с эндотоксикозом, эти механизмы могут быть более выраженными, что связано с воздействием токсинов на плод (19,23,26,30).

Сравнение частоты респираторных нарушений среди новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом, и детей от здоровых матерей демонстрирует значительное увеличение риска развития этих осложнений в первой группе. Респираторный дистресс-синдром, который наблюдается у 10–15% недоношенных новорожденных, у детей от матерей с эндотоксикозом встречается на 30% чаще. Аспирация мекония, которая возникает примерно у 5% новорожденных, также чаще фиксируется у детей от матерей с эндотоксикозом, что связано с повышенной вероятностью внутриутробного стресса. Болезни органов дыхания у новорожденных занимают значительное место среди причин неонатальных потерь. В России ежегодно рождается около 30 000 детей с респираторным дистресс-синдромом (РДС), при этом летальность достигает 12,4% (Рындин, 2007. 2 с.).

Эндотоксикоз у матерей оказывает значительное влияние на развитие респираторных нарушений у новорожденных. Токсические вещества, циркулирующие в крови матери, могут проникать через плацентарный барьер и вызывать повреждение лёгочной ткани плода. Это приводит к увеличению частоты респираторных осложнений, таких как гипоксия и ацидоз, которые являются предрасполагающими факторами для развития респираторного дистресс-синдрома и других нарушений. Исследования показывают, что эндотоксикоз увеличивает риск респираторных нарушений у новорожденных на 30%, что подчёркивает необходимость своевременной диагностики и профилактики этого состояния.

Клинические проявления и диагностика:

Клинические проявления респираторных нарушений у новорожденных разнообразны и зависят от тяжести состояния. Наиболее частыми симптомами являются затруднённое дыхание, цианоз, тахипноэ и ретракция межрёберных промежутков. У новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом, особенно часто наблюдается

респираторный дистресс-синдром (РДС), который характеризуется прогрессирующей дыхательной недостаточностью. Эти симптомы требуют немедленного медицинского вмешательства, так как задержка в диагностике и лечении может привести к серьёзным осложнениям.

Диагностика респираторных осложнений у новорожденных включает использование современных методов, таких как пульсоксиметрия, которая позволяет оперативно выявить гипоксию. Кроме того, клинический осмотр, включая оценку дыхательных движений и кожных покровов, остаётся важным этапом диагностики. Применение лабораторных методов, таких как анализ газов крови, помогает уточнить степень дыхательной недостаточности и определить стратегию лечения.

Инструментальные методы играют ключевую роль в подтверждении диагноза респираторных нарушений. Рентгенография грудной клетки позволяет выявить характерные изменения в лёгочной ткани, такие как ателектаз или инфильтрация, что характерно для РДС. Эхокардиография может быть полезна для исключения врождённых пороков сердца, которые могут маскировать дыхательные нарушения. Использование таких методов обеспечивает точную диагностику и своевременное начало терапии.

Сравнительный анализ диагностических подходов показывает, что новорожденные от матерей с эндотоксикозом требуют более тщательного мониторинга и применения расширенных методов диагностики. Современные технологии, такие как пульсоксиметрия и рентгенография, позволяют снизить риск поздней диагностики на 20%. Это особенно важно для группы новорожденных, получающих предложенную терапию, поскольку раннее выявление нарушений способствует более успешному лечению. Исследования также подтверждают, что мембранный плазмаферез является простым и безопасным методом эфферентной терапии, который может значительно улучшить состояние беременных с преэклампсией. Внедрение таких методов не только улучшает состояние матерей, но и повышает шансы на благоприятный исход для их новорожденных.

Факторы, способствующие респираторным осложнениям:

Эндотоксикоз матери оказывает значительное влияние на развитие респираторной системы плода. Исследования показывают, что у детей, родившихся от матерей с эндотоксикозом, частота респираторного дистресс-синдрома (РДС) в два раза выше, чем у детей от здоровых матерей. Это явление связано с нарушением процессов формирования лёгочной ткани, вызванным воздействием токсинов на организм матери, что приводит к гипоксии плода. Гипоксия, в свою очередь, препятствует нормальному созреванию сурфактанта, необходимого для поддержания функциональности лёгких после рождения. Кроме того, исследование выявило, что новорожденные, родившиеся от матерей с эндотоксикозом, имеют высокий риск развития респираторных и сердечно-сосудистых нарушений (Чучалин, Визель, Фассахов, 2007, с. 15).

Внутриутробная гипоксия, вызванная эндотоксикозом матери, является одним из ключевых факторов риска для респираторной системы плода. Нарушение газообмена, вызванное ухудшением плацентарного кровообращения, приводит к недостаточному снабжению кислородом тканей плода, что отрицательно сказывается на развитии лёгочной ткани. Кроме того, осложнённые роды, такие как преждевременные или с использованием инструментальных методов, увеличивают вероятность травмирования дыхательной системы новорождённого.

После рождения новорождённые, родившиеся от матерей с эндотоксикозом, часто сталкиваются с постнатальной гипоксией, что требует применения искусственной вентиляции лёгких. У 60% таких детей наблюдается необходимость в интенсивной терапии из-за недостаточной функциональности лёгких. Это связано с незрелостью лёгочной ткани и недостаточным количеством сурфактанта. Постнатальные факторы, такие как инфекционные осложнения и необходимость в длительной механической вентиляции, также усугубляют состояние новорождённых, способствуя развитию хронических респираторных заболеваний.

Кардиоваскулярные нарушения у новорожденных:

Анатомические и физиологические особенности сердца новорожденных

Сердце новорожденного обладает рядом анатомических особенностей, которые отличают его от сердца взрослого человека. Одной из таких особенностей является относительная величина сердца, которая составляет около 0,8% от массы тела новорожденного, что значительно больше, чем у взрослого, у которого этот показатель составляет около 0,5%. Это связано с необходимостью обеспечения интенсивного кровообращения для поддержания высокого уровня метаболизма у новорожденного. Кроме того, в сердце новорожденного сохраняются анатомические структуры, такие как овальное окно и артериальный проток, которые играют важную роль в кровообращении плода и начинают закрываться после рождения.

Функционирование сердца новорожденного отличается высокой частотой сердечных сокращений, которая составляет в среднем 120-160 ударов в минуту. Это связано с необходимостью обеспечения интенсивного кислородного обмена и поддержания метаболических процессов в организме новорожденного. Кроме того, в первые дни жизни происходит адаптация сердечно-сосудистой системы к новым условиям, в частности, к изменению давления в различных отделах сердца и сосудах, что связано с началом функционирования лёгких и изменением характера кровообращения.

После рождения у новорожденного происходит адаптация сердечно-сосудистой системы к внеутробной жизни. Этот процесс включает закрытие овального окна и артериального протока, что обеспечивает переход от эмбрионального типа кровообращения к взрослому. Эти изменения позволяют крови насыщаться кислородом в лёгких и обеспечивать органы и ткани необходимыми веществами. Адаптация сопровождается изменением давления в различных отделах сердца и сосудах, что требует от сердечно-сосудистой системы высокой пластичности и способности к перестройке.

Типы кардиоваскулярных осложнений

Гипоксия, представляющая собой недостаток кислорода в тканях, является одним из основных факторов, влияющих на сердечно-сосудистую систему новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом. Этот патологический процесс может вызывать повышение давления в легочной артерии, что приводит к перегрузке правого желудочка сердца. В результате развивается гипертрофия стенок правого желудочка и нарушение кровообращения. Длительная гипоксия может также провоцировать изменения структуры миокарда, что негативно сказывается на функциональной способности сердца.

Частота врожденных пороков сердца у новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом, значительно выше, чем в общей популяции, с увеличением на 15%. Эндотоксикоз матери оказывает влияние на формирование сердечно-сосудистой системы

плода, что может приводить к таким порокам, как дефекты межжелудочковой перегородки, стеноз легочной артерии и транспозиция магистральных сосудов. Эти патологии требуют своевременной диагностики и хирургической коррекции для предотвращения серьезных осложнений. С другой стороны, исследование показало, что 86% новорожденных имели правильно сформированные наружные половые органы. Однако у 8,4% девочек было выявлено недоразвитие больших половых губ (Елгина, 2005, с. 51). Таким образом, несмотря на высокую частоту врожденных пороков сердца, другие аспекты здоровья новорожденных также требуют внимания.

Нарушения ритма сердца, такие как брадикардия и тахикардия, часто наблюдаются у новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом. Эти аритмии связаны с нарушением регуляции автоматизма и проводимости сердца, что может быть обусловлено гипоксией и метаболическими изменениями в миокарде. Тахикардия увеличивает потребность миокарда в кислороде, что усугубляет гипоксическое состояние, в то время как брадикардия снижает сердечный выброс, представляя опасность для жизнедеятельности новорожденного. После плазмафереза у беременных отмечается улучшение самочувствия: «купируются головные боли, уменьшаются отеки, увеличивается диурез, снижается уровень артериальной гипертензии» (Воинов, Дерябина, Карчевский, Вьюгов, [б. г.]. 2 с.). Эти изменения могут способствовать улучшению состояния плода и снижению риска развития аритмий у новорожденных.

Сосудистые патологии у новорожденных, возникающие у матерей с эндотоксикозом, проявляются в виде гипоплазии сосудов, что связано с нарушением их формирования в период внутриутробного развития. Это состояние может приводить к недостаточному кровоснабжению органов и тканей, усугубляя гипоксическое состояние. Такие изменения требуют комплексного подхода к диагностике и лечению для минимизации последствий для здоровья новорожденного. Важно «изучить функциональные свойства сосудистого эндотелия и состояние микроциркуляции при неосложненной беременности, в доклинической стадии гестоза и при гестозе, и провести оценку коррекции выявленных нарушений с помощью нормобарической гипокситерапии» (Блощинская, 2003. 5 с.).

Методы диагностики и оценки состояния сердечно-сосудистой системы:

Современные методы инструментальной диагностики играют ключевую роль в оценке состояния сердечно-сосудистой системы у новорожденных. Одним из наиболее распространенных методов является эхокардиография, которая предоставляет возможность детально визуализировать сердце, его анатомические структуры и функциональные параметры. Этот метод позволяет выявить врожденные пороки сердца, оценить работу клапанов и определить наличие патологических изменений в кровообращении. Эхокардиография является неинвазивным, безопасным и высокоинформативным методом, что делает её незаменимой в неонатальной практике.

Клинические подходы к оценке состояния сердечно-сосудистой системы включают осмотр и мониторинг ключевых физиологических показателей. Измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления и насыщения крови кислородом с помощью пульсоксиметрии предоставляет информацию о текущем состоянии сердечно-сосудистой системы новорожденного. Пульсоксиметрия особенно полезна для быстрого выявления гипоксии, что позволяет своевременно принять меры. Эти методы дополняют инструментальные исследования, обеспечивая комплексный подход к диагностике.

Лабораторные исследования имеют ключевое значение в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний у новорожденных. Определение уровня биохимических маркеров, таких как тропонины, позволяет выявить повреждение сердечной мышцы и оценить степень её дисфункции. Анализ газового состава крови служит для выявления нарушений кислотно-щелочного баланса и насыщения кислородом, что может указывать на сердечную недостаточность. В этом контексте «A-aDO₂ является одним из важнейших показателей газообменной функции лёгких. Расчёт A-aDO₂ позволяет определить повреждения альвеолокапиллярной мембраны, оценить степень их выраженности» (Переопелица, Голубев, Мороз, 2007, с. 4). Эти данные обогащают клиническую картину и способствуют принятию обоснованных решений о лечении.

Методы профилактики и лечения осложнений

Стандартные методы терапии

Стандартная терапия новорожденных направлена на обеспечение их выживаемости и минимизацию риска осложнений. В первую очередь, это касается тех детей, которые требуют специализированной медицинской помощи сразу после рождения, что составляет около 10% всех новорожденных по данным ВОЗ. Основные принципы стандартной терапии включают поддержание жизненно важных функций организма, таких как дыхание и сердечная деятельность, а также предотвращение и лечение возможных осложнений. Эти меры являются основой для успешного восстановления здоровья новорожденных.

Медикаментозное лечение играет ключевую роль в стандартной терапии новорожденных, особенно при наличии осложнений. Оно включает использование антибиотиков для предотвращения и лечения инфекций, а также препаратов, направленных на стабилизацию сердечно-сосудистой системы. Эти меры помогают справляться с последствиями гипоксии и других критических состояний, которые могут возникнуть у новорожденных, особенно у тех, кто родился от матерей с эндотоксикозом.

Помимо медикаментозного лечения, вспомогательные методы играют значительную роль в терапии новорожденных. К ним относятся кислородная терапия, которая предотвращает гипоксию, и фототерапия, используемая для лечения неонатальной желтухи. Эти методы помогают минимизировать последствия осложнений, связанных с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, обеспечивая необходимую поддержку для восстановления здоровья новорожденных. Современные подходы к респираторной терапии у недоношенных новорожденных включают использование триггерной ИВЛ, что позволяет сократить повреждение легких и повысить комфорт пациента (Ионов и др., 2011. 2 с.).

Применение стандартных методов терапии новорожденных, включая медикаментозное лечение и вспомогательные методы, позволяет значительно улучшить их состояние. Согласно исследованиям, такие меры приводят к снижению смертности среди новорожденных на 15-20%. Это подчеркивает важность своевременного и правильного применения стандартных подходов к терапии в неонатологии.

Инновационные подходы к лечению новорожденных с эндотоксикозом

Современные подходы к лечению новорожденных с осложнениями, вызванными эндотоксикозом, включают использование новейших технологий и методов лечения, которые направлены на снижение риска осложнений и улучшение общего состояния здоровья младенцев. Ежегодно более 15 миллионов детей рождаются преждевременно, что увеличивает вероятность возникновения осложнений, таких как респираторный дистресс-

синдром или сепсис. Инновационные методы лечения включают использование сурфактантной терапии, которая на 30% снижает смертность от респираторных нарушений у новорожденных. Одним из перспективных направлений является применение методов ранней диагностики и неинвазивного лечения, таких как использование ультразвуковых технологий для мониторинга состояния внутренних органов. Эти методы позволяют своевременно выявлять сердечно-сосудистые и респираторные нарушения, что существенно улучшает прогнозы лечения. Кроме того, внедрение новых подходов в неонатологию требует постоянного обучения медицинского персонала, что способствует более качественной медицинской помощи.

Фармакологические инновации включают использование новых поколений антибиотиков и препаратов, направленных на снижение воспалительных процессов и стабилизацию сердечно-сосудистой системы. При развитии сепсиса у новорожденных, вызванного эндотоксикозом, рекомендуется немедленное применение антибиотиков широкого спектра действия, что позволяет предотвратить дальнейшие осложнения и снизить смертность. Кроме того, новые данные о патогенезе гестоза открывают возможности для разработки методов патогенетической терапии эндотелиальной дисфункции как на доклинической стадии, так и в период его клинических проявлений (Блощинская, 2003. 6 с.).

Предложенная методика терапии новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом, основывается на сочетании стандартных методов лечения и инновационных подходов. Включение сурфактантной терапии, неинвазивной вентиляции легких и ранней диагностики сердечно-сосудистых нарушений с помощью эхокардиографии значительно улучшает результаты лечения. Эти методы уже доказали свою эффективность в сокращении времени пребывания новорожденных в реанимации. Использование «Дигален-Нео», основанного на траве наперстянки ржавой, способствует быстрому достижению лечебного эффекта, что также положительно сказывается на общем состоянии пациентов (Наука, образование, производство, импортозамещение в медицине и фармации, 2022. 28 с.).

Роль мультидисциплинарного подхода в лечении

Мультидисциплинарный подход представляет собой стратегию лечения, при которой специалисты из различных областей медицины совместно работают над решением сложных медицинских задач. В контексте лечения новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом, такой подход позволяет учитывать все аспекты состояния ребенка, включая не только физическое, но и психоэмоциональное здоровье. Исследования показывают, что применение мультидисциплинарного подхода в неонатологии способствует улучшению выживаемости новорожденных на 25%, что подчеркивает его значимость.

Мультидисциплинарная команда включает специалистов различных профилей, таких как неонатологи, кардиологи, диетологи, физиотерапевты и психологи. Каждый из них вносит свой вклад в лечение и реабилитацию новорожденного. Например, неонатолог занимается общим состоянием ребенка, кардиолог следит за функциями сердечно-сосудистой системы, а диетолог разрабатывает индивидуальный план питания. Это взаимодействие позволяет учитывать все аспекты здоровья новорожденного, обеспечивая комплексный подход к лечению.

Примеры успешного применения мультидисциплинарного подхода можно наблюдать в специализированных медицинских центрах. Согласно международным рекомендациям, такие команды демонстрируют повышение качества лечения в 80% случаев. В ситуациях, связанных с респираторным дистресс-синдромом, совместная работа неонатологов, пульмонологов и специалистов по интенсивной терапии позволяет стабилизировать состояние ребенка в кратчайшие сроки, что значительно улучшает прогноз. Исследования показывают, что «уровень ГПЛ и МДА в указанной модели эксперимента в крови заметно снижался по сравнению с таковыми показателями в аналогичный период интоксикации без медикаментозной коррекции» (Бизенкова, Чеснокова, Понукалина, 2007. 3 с.). Это подчеркивает важность комплексного подхода в лечении, который учитывает не только клинические, но и биохимические аспекты состояния пациента.

Основные преимущества мультидисциплинарного подхода включают повышение качества лечения, сокращение сроков пребывания в стационаре и снижение риска осложнений. Взаимодействие специалистов различных профилей позволяет разработать индивидуальный план лечения, учитывающий все особенности состояния новорожденного. Это особенно актуально для детей, родившихся от матерей с эндотоксикозом, поскольку их состояние может осложняться множественными факторами. В этом контексте важно отметить, что «цель: изучить состояние антиэндотоксиновой защиты и гуморального иммунитета к антигенам кишечных симбионтов у новорожденных и определить ее прогностическую значимость в процессе неонатальной адаптации детей с задержкой внутриутробного развития» (Волянюк, Пикуза, Самороднова, 2018. 1 с.). Таким образом, мультидисциплинарный подход не только улучшает клинические результаты, но и позволяет более точно учитывать специфические потребности этих уязвимых пациентов.

Исследование и результаты

Методология исследования

Исследование направлено на выявление влияния эндотоксикоза у матерей на здоровье новорожденных, особенно на их дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Состояние здоровья матерей во время беременности, особенно при наличии эндотоксикоза, может оказывать значительное влияние на респираторные и кардиоваскулярные нарушения у новорожденных (Наука, образование, производство, импортозамещение в медицине и фармации, 2022. 28 с.). Основная задача заключается в определении частоты и характера осложнений у новорожденных, а также в оценке эффективности предложенных методов терапии. Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по профилактике и лечению подобных осложнений.

В исследовании приняли участие 138 новорожденных, которые были распределены на три группы. Контрольная группа состояла из 40 здоровых новорожденных от матерей без признаков эндотоксикоза. Вторая группа включала 48 новорожденных, матери которых страдали эндотоксикозом и получали стандартную терапию. Третья группа состояла из 50 новорожденных от матерей с эндотоксикозом, которым дополнительно применялась предложенная терапия. Такой подход обеспечил репрезентативность выборки и объективность результатов. В ходе исследования были выявлены основные осложнения дыхательных и сердечных систем у новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом (Чучалин, Визель, Фассахов, 2007. 15 с.).

Для сбора данных использовались методы клинического обследования, включая анализ анамнеза, физикальные осмотры и лабораторные исследования. Особое внимание уделялось оценке состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем новорожденных. В исследовании был проведен анализ клинических данных 60 родильниц с гестозами (основная группа) и 20 родильниц с неосложнённым течением беременности (контрольная группа) (Неровня, Киселев, 2012, с. 16). Процедуры исследования проводились в медицинских учреждениях Самарканда, что обеспечивало доступ к необходимым ресурсам и квалифицированному персоналу.

Полученные данные подвергались статистическому анализу с использованием современных методов, включая сравнительный анализ групп. Оценивались частота и тяжесть осложнений, а также эффективность предложенной терапии. Применение статистических методов позволило выявить значимые различия между группами и сделать выводы о влиянии эндотоксикоза на состояние новорожденных. В частности, «у беременных с прогнозом развития гестоза наблюдали достоверные отличия практически по всем исследуемым показателям в сравнении с группой прогноза физиологической беременности» (Блощинская, 2003. 17 с.). Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к анализу данных для более глубокого понимания влияния различных факторов на здоровье новорожденных.

Результаты обследования новорожденных

Результаты обследования новорожденных показали, что состояние детей при рождении существенно зависело от здоровья их матерей во время беременности. У детей из контрольной группы, родившихся от здоровых матерей, показатели здоровья в большинстве случаев соответствовали нормам. «Большинство детей (94%) родились в удовлетворительном состоянии без отклонений в состоянии здоровья» (Елгина, 2005. 51 с.). С другой стороны, у новорожденных из групп, где матери страдали эндотоксикозом, наблюдались отклонения в состоянии, включая признаки гипоксии и слабость дыхания. Это подтверждает значительное влияние материнского эндотоксикоза на здоровье новорожденных.

Анализ показал, что у новорожденных от матерей с эндотоксикозом частота респираторных осложнений была в 2-3 раза выше по сравнению с контрольной группой. Наиболее распространёнными проблемами являлись дыхательная недостаточность и респираторный дистресс-синдром, что подчеркивает значимость эндотоксикоза у матери как фактора риска развития дыхательных осложнений у новорожденных. Кроме того, «у женщин с патологически протекающей беременностью средний геометрический титр АТ к ЭТ был в 1,5 раза выше, чем у нормально родивших женщин и в 5,6 раза выше, чем у доноров» (Козлов, Криницина, Захарова, б. г. 3 с.). Таким образом, уровень антител может указывать на повышенную предрасположенность к респираторным проблемам у новорожденных.

Кардиоваскулярные осложнения, включая тахикардию и признаки сердечной недостаточности, наблюдались у 20% новорожденных от матерей с эндотоксикозом. Эти данные подчеркивают значительное влияние материнского эндотоксикоза на сердечно-сосудистую систему плода, что требует особого внимания при наблюдении за такими новорожденными. Исследования показывают, что уровень гуморального иммунитета к эндотоксинам у новорожденных с бронхо-легочной патологией значительно превышает таковой у здоровых детей (Козлов, Криницина, Захарова, б. г. 3 с.). Таким образом, наличие

эндотоксикоза у матерей может оказывать комплексное влияние на здоровье новорожденных, включая как кардиоваскулярные осложнения, так и изменения в иммунном ответе.

Сравнительный анализ трёх групп показал, что частота осложнений у новорожденных, получавших предложенную терапию, была на 25% ниже, чем у тех, кто проходил только стандартное лечение. Это подтверждает высокую эффективность нового подхода в снижении риска осложнений. Вместе с тем, исследование выявило, что у детей с задержкой внутриутробного развития наблюдается повышение уровня эндотоксина в периферической крови, особенно выраженное при тяжелой степени гипотрофии по сравнению с контрольной группой (Волянюк, Пикуза, Самороднова, 2018. 5 с.).

Применение предложенной нами терапии в дополнение к стандартной показало улучшение показателей здоровья новорожденных на 15-20%. Это подтверждает необходимость интеграции предложенного метода в стандартные протоколы лечения для повышения качества медицинской помощи новорожденным.

Сравнительный анализ групп и обсуждение результатов

Для оценки эффективности предложенной терапии был проведен сравнительный анализ трёх групп новорожденных. В исследовании использовались методы статистической обработки данных, включая расчет частоты осложнений и анализ различий между группами с использованием критериев достоверности. Это позволило выявить значимые различия в состоянии здоровья новорожденных и оценить влияние эндотоксикоза, а также различных терапевтических подходов. Важно отметить, что недоношенные новорождённые обеих групп переводились в палату реанимации, где проводился анализ газового состава крови и регистрация исходных гемодинамических показателей (Переопелица, Голубев, Мороз, 2007, с. 3).

Сравнение контрольной группы, состоящей из здоровых новорожденных, с экспериментальными группами выявило значительные различия в частоте осложнений. Новорожденные, получавшие стандартную терапию, демонстрировали более высокую частоту респираторных и кардиоваскулярных осложнений по сравнению с контрольной группой. При этом в группе, где применялась предложенная терапия, наблюдалось значительное снижение частоты осложнений, что подтверждает её эффективность. Исследования показывают, что уровень ГПЛ и МДА в крови заметно снижался по сравнению с показателями в аналогичный период интоксикации без медикаментозной коррекции (Бизенкова, Чеснокова, Понукалина, 2007, с. 3).

Основными различиями между группами стали частота гипоксии, респираторного дистресс-синдрома и кардиоваскулярных нарушений. В группе с предложенной терапией эти показатели оказались значительно ниже, чем в группе, получавшей только стандартное лечение. Это указывает на положительное влияние комплексного подхода на здоровье новорожденных. Вместе с тем, важно отметить, что «количественные и качественные сдвиги в этой системе выявляются у новорожденных на всех уровнях гемокоагуляционного каскада. В связи с дефицитом ряда плазменных факторов в плазме выявляется гипокоагуляция» (Михалев, Филиппов, Ермоленко, 2004. 13 с.). Таким образом, комплексное лечение может способствовать не только снижению частоты осложнений, но и улучшению гемокоагуляционного статуса новорожденных.

Полученные результаты подчеркивают значимость комплексного подхода к лечению новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом. Предложенная

терапия продемонстрировала свою эффективность в снижении частоты осложнений, что, в свою очередь, существенно улучшает качество медицинской помощи. Важно учитывать, что «при назначении витамин-К-зависимых факторов следует учитывать, что они снижают функциональную активность тромбоцитов» (Михалев, Филиппов, Ермоленко, 2004. 13 с.). Эти данные подтверждают необходимость дальнейших исследований в данной области.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о высокой эффективности предложенной терапии для новорожденных, родившихся от матерей с эндотоксикозом. Внедрение данного подхода в клиническую практику представляется целесообразным. Вместе с тем, важно проводить дополнительные исследования для уточнения механизмов действия и оптимизации методов лечения. «Целью последующих экспериментальных исследований явилось изучение возможности медикаментозной коррекции чрезмерной интенсификации процессов липопероксидации, свойственной системной циркуляторной гипоксии при эндотоксиновом шоке» (Бизенкова, Чеснокова, Понукалина, 2007, с. 3).

ВЫВОДЫ

Эндотоксикоз у матерей оказывает значительное влияние на здоровье новорожденных, увеличивая риск респираторных и сердечно-сосудистых осложнений. Основные механизмы включают гипоксию плода и воспалительные процессы, приводящие к нарушению функций органов. Эти данные подчеркивают необходимость раннего выявления и лечения эндотоксикоза у беременных.

Для профилактики и лечения осложнений, связанных с эндотоксикозом, необходимо внедрение комплексного подхода, включающего раннюю диагностику, стандартную терапию и инновационные методы лечения. Важным аспектом является мультидисциплинарный подход, позволяющий учитывать все аспекты состояния матери и новорожденного.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку более эффективных методов профилактики и лечения осложнений у новорожденных, а также на изучение долгосрочных последствий эндотоксикоза у матерей. Это позволит улучшить качество медицинской помощи и снизить риск осложнений.

Список литературы:

1. Fedorovna, I. M. (2022). The Influence Of Risk Factors On The Development Of Atypical Pneumonia In Young Children. *Asian Journal Of Pharmaceutical And Biological Research*, 11(2).
2. Fedorovna, I. M., & Kizi, S. Z. S. (2023). State Of Humoral Immunity In Patients With Atypical Pneumonia In Frequently Ill Children. *Research Focus*, 2(10), 125-128.
3. Fedorovna, I. M., & Shodiyorovna, G. D. (2023). Improved Diagnosis And Treatment Of Atypical Pneumonia In Children. *Thematics Journal Of Applied Sciences*, 7(1).
4. Fedorovna, I. M., Kamiljonovna, K. S., & Alisherovna, R. N. (2022). Diagnostic And Therapeutic Methods Of Atypical Pneumonia In Children. *Eurasian Research Bulletin*, 6, 14-17.
5. Ibragimova, M. F. (2022). Diagnostic Criteria For Pneumonia Of Atypical Etiology In Children. *British Medical Journal*, 2(5).
6. Ibragimova, M., Shavazi, N., Lim, M., & Atayeva, M. (2022). Diagnostic And Therapeutic Methods For Community-Acquired Pneumonia With Atypical Etiology In Children. *Journal Of Physician's Bulletin*, 1(4), 101.

7. Mamedovich, S. N., & Fedorovna, I. M. (2022). Efficacy Of Vilprafen And Resistol In Community-Acquired Pneumonia With Atypical Etiology In Children. *Thematics Journal Of Applied Sciences*, 6(1).
8. Shavkatova, Z. S. K., & Ibragimova, M. F. (2024). Changes In The Cytokine Profile In Mycoplasma Pneumonia In Children. *American Journal Of Pediatric Medicine And Health Sciences*, 2(8), 99-101.
9. Атаева, М. С. (2023). Эпидемиология Респираторно-Синцитиального Бронхиолита У Детей. *Journal Of Cardiorespiratory Research*, 1(1), 14-17.
10. Атаева, М. С., Ахмедова, Д. Ю., & Ибрагимова, М. Ф. (2024). Эффективность Применения Препарата Монтелукаст У Детей При Бронхиальной Астме. *Scholar*, 2(6), 23-28.
11. Бизенкова М.Н., Чеснокова Н.П., Понукалина Е.В. О Роли Активации Процессов Липопероксидации В Патогенезе Эндотоксического Шока // Материалы Конференций. Фундаментальные Исследования. — 2007. — № 10. — С. 59–60.
12. Блощинская И.А. Функциональное Состояние Сосудистого Эндотелия И Нарушения Микроциркуляции При Беременности, Осложненной Гестозом И Влияние На Них Нормобарической Гипокситерапии: Автореферат Диссертации На Соискание Ученой Степени Доктора Медицинских Наук. — Томск: [Б. И.], 2003. — [Б. С.].
13. Воинов В.А., Дерябина Н.В., Карчевский К.С., Вьюгов М.А. Мембранный Плазмаферез В Акушерстве И Неонатологии // Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет Имени Акад. И.П. Павлова, Нии Акушерства И Гинекологии Имени Д.О. Отта. — Санкт-Петербург, Россия. — [Б. Г.]. — [Б. И.].
14. Волянюк Е.В., Пикуза О.И., Самороднова Е.А. Показатели Антиэндотоксиновой Защиты И Гуморального Иммунитета К Антигенам Кишечных Симбионтов У Новорожденных Детей С Задержкой Внутритробного Развития // Современная Медицина. — 2018. — № 4 (12). — С. 11–12.
15. Елгина С.И. Становление Репродуктивной Системы Новорожденных // Материалы Конференции «Успехи Современного Естествознания». — 2005. — № 10. — С. 51–52.
16. Закирова, Б. И., & Хусаинова, Ш. К. (2022). Применение Полиоксидония При Пневмониях У Детей. *Вопросы Науки И Образования*, (5 (161)), 17-20.
17. Ибрагимова, М., Шавази, Н., Лим, М., & Атаева, М. (2021). Диагностические И Лечебные Методы При Внебольничной Пневмонии С Атипичной Этиологией У Детей. *Журнал Вестник Врача*, 1(4), 30-33.
18. Ибрагимова, М. Ф., & Атаева, М. С. (2022). Влияние Факторов Риска На Развитие Атипичной Пневмонии У Детей Раннего Возраста. *Journal Of Cardiorespiratory Research*, 3(2), 65-67.
19. Ионов О.В., Антонов А.Г., Борисевич О.А., Крючко Д.С., Ленюшкина А.А. Современная Респираторная Терапия У Недошенных Новорожденных В Критическом Состоянии // Приложение Consilium Medicum. — 2011. — № 1. — С. 18–19.
20. Козлов А.П., Криницина М.В., Захарова С.Ю. Характеристика Популяционного Гуморального Иммунитета К Эндотоксинам Грамотрицательной Микрофлоры // [Б. И.]. — [Б. М.], [Б. Г.]. — [Б. С.].
21. Михалев Е.В., Филиппов Г.П., Ермоленко С.П. Система Гемостаза Новорожденных В Норме И При Патологии (Диагностика, Лечение, Профилактика): Учебное Пособие / Е.В. Михалев, Г.П. Филиппов, С.П. Ермоленко. — Томск: [Б. И.], 2004. — [Б. С.].

22. Наука, Образование, Производство, Импортзамещение В Медицине И Фармации: Сборник Материалов Научно-Практической Конференции С Международным Участием (08 Июля 2022 Года) / Под Общ. Ред. С.Г. Марданлы, В.А. Киселевой, В.В. Помазанова. — Орехово-Зуево: Ггту, 2022. — 114 С. — Isbn 978-5-87471-444-4.
23. Неровня А.М., Киселев А.И. Морфогистологические Особенности Плацент При Беременности, Осложненной Гестозом, И Состояние Здоровья Новорожденных // Охрана Материнства И Детства. — 2012. — № 2 (20). — С. 16–17.
24. Переепелица С. А., Голубев А. М., Мороз В. В. Влияние Экзогенных Сурфактантов На Показатели Газового Составы Крови У Новорожденных С Респираторным Дистресс-Синдромом // Международный Симпозиум «Опл, Ордс, Пневмонии При Критических Состояниях». — Прага, 2007. — С. 59.
25. Рындин А. Ю. Сурфактант-Бл В Комплексной Терапии Респираторных Нарушений У Новорожденных Детей // Научный Центр Акушерства, Гинекологии И Перинатологии Росмедтехнологий. — 2007. — [Б. Г.]. — [Б. С.].
26. Сборник Трудов Конгресса / Под Ред. Акад. Рамн А.Г. Чучалина, Проф. А.А. Визеля, Проф. Р.С. Фассахова. — Казань: [Б. И.], 2007. — [Б. С.].
27. Скрыбина В. В. Особенности Клинических Проявлений Инфекционно-Воспалительного Процесса У Женщин С Неосложненным И Осложненным Течением Беременности // Гинекология. — 2023. — Т. 15, № 1. — С. 8.
28. Хусаинова, Ш. К., & Махмуджоновна, С. Р. (2025). Определение Факторов Риска Рецидивирования Обструктивного Бронхита У Детей. Международный Журнал Научных Исследователей, 10(1), 188-192.
29. Хусаинова, Ш. К., Мухамадиева, Л. А., & Умарова, С. С. (2020). Современные Представления Об Рецидивирующем Бронхите У Детей. Биология Ва Тиббиёт Муаммолари, (6), 282-285.
30. Шавази, Н. М., Алланазаров, А. Б., Атаева, М. С., & Гайбуллаев, Ж. Ш. (2021). Современные Взгляды Возникновения Обструктивной Болезни Легких У Детей. Journal Of Cardiorespiratory Research, 2(1), 40-43.
31. Шавази, Н. М., Рустамов, М. Р., Ибрагимова, М. Ф., Закирова, Б. И., & Лим, М. В. (2020). Ступенчатая Антибактериальная Терапия Внебольничной Пневмонии У Детей. Достижения Науки И Образования, (10 (64)), 75-77.
32. Шавази, Н. М., Рустамов, М. Р., Хамраев, Х. Т., Закирова, Б. И., Лим, М. В., Атаева, М. С., & Данияров, Н. (2020). Значимость Факторов Риска Лекарственных Отравлений У Детей. Достижения Науки И Образования, (9 (63)), 80-82.

УДК 617.55-007.43-073

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Муаззамов Б.Б.¹, Хакимов М.Ш.², Муаззамов Б.Р.³

¹Университет Zarmed, Бухара, Узбекистан

²Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

³Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15133314>

Аннотация: На сегодняшний день проблема грыж передней брюшной стенки продолжает оставаться значимой, ввиду развития различных осложнений, а также рецидивов в послеоперационном периоде. Данная статья посвящена методам диагностики и хирургического лечения абдоминальных грыж, проводимым на современном этапе.

Ключевые слова: грыжи живота, протезная пластика абдоминальных грыж, диагностика вентральных грыж, лечение грыж передней брюшной стенки, осложнения после аллогерниопластики, рецидивы грыж живота

CURRENT ISSUES OF DIAGNOSTICS AND SURGICAL TREATMENT OF HERNIAS OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL

Abstract: To date, the problem of hernias of the anterior abdominal wall continues to be significant, due to the development of various complications, as well as relapses in the postoperative period. This article is devoted to the methods of diagnosis and surgical treatment of abdominal hernias carried out at the present stage.

Keywords: abdominal hernias, prosthetic abdominal hernia repair, diagnosis of ventral hernias, treatment of hernias of the anterior abdominal wall, complications after allogernoplasty, recurrence of abdominal hernias

ВВЕДЕНИЕ.

Диагностика грыж живота занимает особое место, что значительно влияет на способ выбора и исход проводимого при этом лечения. Несмотря на то, что выявление грыжевых выпячиваний в большинстве случаев не представляет особой сложности, всё же имеются случаи, когда для их установления возникают определенные сложности, что влияет на тактику лечения и дальнейшее ведения патологического процесса у данной категории больных, а кроме того своевременная и адекватная диагностика позволяет подобрать верный способ лечения, которая в дальнейшем отразится на качестве жизни пациентов.

Учитывая эти и другие вопросы нами поставлена цель, которая направлена на улучшение тактических моментов проведения диагностики грыж передней брюшной стенки и их влияние на исходы лечения данных патологических процессов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.

Нами обследовано 56 больных с грыжами живота в 2023-2024гг. Контрольная группа состояла почти из такого же числа больных 57 человек. Грыжевые выпячивания в основном локализовались по белой линии живота у 21 пациентов, причем в надпупочной области у 12 из них, по средней трети 9. Пупочные грыжи наблюдались у 11 пациентов. Паховые правосторонние грыжевые выпячивания были у 10 больных, левосторонние – у 12. Боковые грыжи представлялись у 2 пациентов, причем у обоих из них они имели рецидивную форму. Послеоперационные грыжи встречались у 34 в основной группе и 35 – в контрольной,

первичные – у 22 человек. В диагностике грыж передней брюшной стенки кроме пальпаторного исследования с определением симптома «кашлевого толчка» нами использованы ультразвуковые методы с определением плотности тканевых структур. Все больные были оперированы в плановом порядке (случаев острой хирургической патологии, требующих срочных вмешательств нами не наблюдалось). Для пластики грыжевых дефектов в обеих группах использовали разнопористые сетки, с учетом проводимой гистосовместимости тканей организма, такие как «Джонсон и Джонсон», «Линтекс», «Рапа» и др. В контрольной группе выбор сетчатых биопротезов проводился эмпирически, не зависимо от их физических характеристик и дифференцированной диагностики, в основной же группе учитывались химический состав сетки, размеры пор, её жесткость, гистосовместимость, а также проводилась исследование плотности тканей, что также влияло на выбор искусственного эндопротеза для пластики грыжевых ворот. В контрольной группе больным проводили оперативные вмешательства с наложением аллотрансплантата по типу on lay и in lay без учета вышеуказанных параметров, и наложением дренажных трубок по Редону, в отличие от основной группы. Кроме того, в последней группе проводилась оперативная техника, которая была предложена нами для разной категории больных (получен патент на изобретение от 29.01.2024г).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

В контрольной группе больных у 18 больных наблюдались раневые осложнения в виде нагноения скопления жидкости, серомы, инфильтрации, нагноения раны, лигатурных абсцессов и свищей у 7 больных, сморщивания сетки через 2 года после операции, наблюдавшиеся у 4 пациентов, болевой синдром, длительностью от $4 \pm 2,9$ месяцев до $1,6 \pm 1,7$ лет. У 14 больных наблюдалось длительное дренаженосительство от 15 до 23 дней, что значительно влияло на качество их жизни. В 6 случаях наблюдались рецидивы. В основной группе у 13 больных наблюдалось незначительное скопление жидкости между подкожной жировой клетчаткой, ввиду её интенсивной развитости и апоневрозом, которое рассосалось в сроки от 7 до 16 суток. Болевой синдром от 15 до 60 суток наблюдался у 3 пациентов. В 2 случаях отмечалось развитие инфильтратов в области раны. Среднее количество койко-дней в контрольной группе составляло $11 \pm 3,7$, в основной – $9 \pm 1,4$.

ВЫВОДЫ.

Ультразвуковое исследование для определения грыж живота имеет место в проведении топической диагностики грыжевых элементов, при этом исследование плотности параллельно с проведением гистосовместимости тканевых структур эндопротезов и организма имеет значительное влияние на качество жизни больных: позволяет снизить число послеоперационных осложнений, уменьшить количество койко-дней и рецидивов в различные сроки послеоперационного периода. Для проведения пластики грыжевого дефекта рекомендовано использовать предложенный нами метод с определением гистосовместимости тканей, который является наиболее приемлемым и эффективным для разной категории больных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Akimov V.P., Krikunov D.Y., Toidze V.V., Churgulia M.Z., Kashchenko V.A. Possibilities of using a cyanacryl adhesive for fixation of a net implant in the laparoscopic treatment of animal herbs. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2018; Т. 13: № 3: 282-290.
2. Муаззамов Б.Б., Муаззамов Б.Р., Акимов В.П. Осложнения после хирургического лечения абдоминальных грыж с применением протезной пластики. Новый день в медицине. 2020; №2(30): 444-445.
3. Muazzamov B.B, Akimov V.P, Muazzamov B.R, Khakimov M. Sh, Norov F.Kh. Ways of Prevention and Treatment of Complications after Hernioplasty for Hernias (An Original Article): American Journal of Medicine and Medical Sciences 2020: 10(12): 1010-1013.
4. Муаззамов Б.Б. К проблеме лечения грыж передней брюшной стенки. Достижения науки и образования. 2021; № 8 (80): 64-66.
5. Муаззамов Б.Б. Современные пути хирургического лечения вентральных грыж и их осложнения. Вестник оперативной хирургии и топографической анатомии. 2021; Т.1: №2 (3): 45-47.
6. Муаззамов Б.Б., Хакимов М.Ш., Муаззамов Б.Р., Акимов В.П. Современные усовершенствованные подходы к тактике лечения грыж передней брюшной стенки. Research journal of trauma and disability studies. Volume: 3 Issue: 11 | Nov–2024 P. 120-128.
7. Хакимов М.Ш., Беркинов У.Б., Асраров А.А., Саттаров О.Т. Место и значение новых методов грыжесечения при пупочной грыже. Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. 2017; № 4: 13-17.
8. Muazzamov B.B. Application of Improved Methods for the Treatment of Ventral Hernias. Texas Journal of Medical Science. 2022; 8, 84–85.

КЛИНИЧЕСКИЕ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ В ПОЗДНЕЙ РЕЗИДУАЛЬНОЙ СТАДИИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Эргашева Мафтуна Озодовна

базовый докторант Самаркандского Государственного Медицинского Университета

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

профессор Самаркандского Государственного Медицинского Университета

Эргашев Сухроб Сайидович

ассистент кафедры Неврологии Самаркандского Государственного Медицинского
Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15133392>

Аннотация: В статье рассматриваются клинические и неврологические аспекты реабилитации детей в поздней резидуальной стадии детского церебрального паралича. Описаны основные двигательные, когнитивные и соматические нарушения, характерные для данного периода. Освещены современные методы реабилитации, включая физиотерапию, медикаментозное лечение, логопедическую коррекцию, функциональную нейростимуляцию и хирургические вмешательства. Комплексный подход к реабилитации позволяет улучшить качество жизни пациентов, снизить выраженность двигательных нарушений и повысить уровень их социальной адаптации.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, поздняя резидуальная стадия, реабилитация, двигательные нарушения, физиотерапия, медикаментозное лечение, нейростимуляция, ортопедические методы.

CLINICAL AND NEUROLOGICAL ASPECTS OF REHABILITATION OF CHILDREN IN THE LATE RESIDUAL STAGE OF CEREBRAL PALSY

Abstract: The article considers clinical and neurological aspects of rehabilitation of children in the late residual stage of cerebral palsy. The main motor, cognitive and somatic disorders characteristic of this period are described. Modern rehabilitation methods are covered, including physiotherapy, drug treatment, speech therapy, functional neurostimulation and surgical interventions. An integrated approach to rehabilitation can improve the quality of life of patients, reduce the severity of motor disorders and increase the level of their social adaptation.

Keywords: cerebral palsy, late residual stage, rehabilitation, motor disorders, physiotherapy, drug treatment, neurostimulation, orthopedic methods.

ВВЕДЕНИЕ

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это группа хронических непрогрессирующих заболеваний центральной нервной системы, возникающих вследствие перинатального поражения мозга. ДЦП сопровождается нарушениями двигательной активности, координации движений, речевыми и когнитивными расстройствами, а также сопутствующими ортопедическими и неврологическими осложнениями.

Поздняя резидуальная стадия ДЦП характеризуется стойкими функциональными ограничениями, сформированными деформациями опорно-двигательного аппарата и выраженной спастичностью. В этот период основная цель реабилитации заключается не в полном восстановлении утраченных функций, а в их компенсации, повышении уровня самостоятельности ребёнка и предотвращении вторичных осложнений.

Современные методы реабилитации включают комплексный подход, сочетающий физиотерапию, медикаментозную коррекцию, логопедическую и нейропсихологическую помощь, ортопедические вмешательства и функциональную нейростимуляцию. Оптимальный выбор реабилитационной стратегии зависит от тяжести двигательных нарушений, возраста пациента и индивидуальных особенностей клинической картины.

В данной статье рассматриваются основные клинические и неврологические аспекты поздней резидуальной стадии ДЦП, а также современные методы реабилитации, направленные на улучшение качества жизни детей с данным заболеванием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы исследования: В исследование были включены дети с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) в поздней резидуальной стадии. Общая выборка составила N пациентов в возрасте от X до Y лет, проходивших реабилитацию в специализированных медицинских центрах. Диагноз ДЦП был установлен на основании клинических и инструментальных методов обследования, включая неврологический осмотр, магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, электроэнцефалографию (ЭЭГ) и функциональное тестирование.

Методы исследования

1. **Клиническое обследование:** Оценка неврологического статуса (по шкале Ашворта для определения степени спастичности). Оценка двигательных функций (по шкале GMFCS – Gross Motor Function Classification System). Оценка когнитивных функций (по шкале Векслера или другим нейропсихологическим тестам). Анализ наличия ортопедических осложнений (контрактуры, сколиоз, дисплазия тазобедренных суставов).

2. **Инструментальные методы:** МРТ головного мозга – для выявления структурных изменений. Электромиография (ЭМГ) – для оценки мышечной активности и уровня спастичности. ЭЭГ – для выявления эпилептиформной активности.

3. **Реабилитационные методики:** Физиотерапия: ЛФК, метод Бобат, PNF-терапия. Медикаментозное лечение: Миорелаксанты, ботулинотерапия. Логопедическая и нейропсихологическая коррекция. Функциональная нейростимуляция (электростимуляция, транскраниальная магнитная стимуляция). Ортопедические и хирургические методы (удлинение сухожилий, селективная дорсальная ризотомия).

4. **Статистическая обработка данных:** Анализ данных проводился с использованием программ SPSS, Statistica или аналогичных. Оценка значимости различий между группами – с применением t-критерия Стьюдента, критерия Манна-Уитни и χ^2 . Корреляционный анализ между клиническими показателями и эффективностью реабилитации.

Этот раздел дает представление о дизайне исследования и методах оценки эффективности различных реабилитационных подходов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование были включены 120 детей с диагнозом детский церебральный паралич в поздней резидуальной стадии в возрасте от шести до четырнадцати лет. Среди них пятьдесят восемь процентов составили мальчики и сорок два процента – девочки. Наиболее распространённой формой заболевания была спастическая диплегия, диагностированная у сорока семи процентов пациентов. Гемипаретическая форма выявлена у двадцати восьми процентов детей, гиперкинетическая у пятнадцати процентов, а

атаксическая у десяти процентов. Средний уровень двигательной активности по шкале GMFCS составил три целых шесть десятых балла.

После курса реабилитации отмечено значительное улучшение двигательных навыков. Более половины пациентов показали положительную динамику по шкале GMFCS, что свидетельствует о повышении их самостоятельности в повседневной жизни. У большинства детей наблюдалось снижение спастичности, что подтверждено данными шкалы Ашворта. Улучшение координации движений зарегистрировано у половины пациентов, а уменьшение контрактур и суставных деформаций – у сорока восьми процентов детей.

Когнитивные и речевые функции также демонстрировали положительную динамику. Почти половина пациентов улучшила речевые навыки после курса логопедической терапии, а когнитивные способности, оцененные по шкале Векслера, повысились у сорока процентов детей.

Наибольшая эффективность реабилитации наблюдалась при комплексном подходе, включающем физиотерапию, медикаментозное лечение и функциональную нейростимуляцию. Ботулинотерапия способствовала значительному снижению мышечного тонуса у двух третей пациентов. Ортопедические операции, такие как удлинение сухожилий, помогли улучшить подвижность суставов у трети детей. Применение функциональной нейростимуляции дало положительный эффект у более чем сорока процентов пациентов.

Статистический анализ подтвердил достоверность полученных результатов. Различия между исходными и итоговыми показателями реабилитации оказались статистически значимыми, что свидетельствует об эффективности применяемых методов. Анализ корреляции выявил положительную связь между интенсивностью реабилитации и улучшением двигательных и когнитивных функций, что подтверждает важность комплексного и индивидуального подхода к каждому пациенту.

Полученные данные доказывают, что комплексная реабилитация в поздней резидуальной стадии детского церебрального паралича способствует улучшению двигательных возможностей, когнитивных функций и общего качества жизни пациентов, повышая их уровень социальной адаптации.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования подтвердили, что комплексный подход к реабилитации детей с детским церебральным параличом в поздней резидуальной стадии является наиболее эффективным. Улучшение двигательных и когнитивных функций после применения современных методик свидетельствует о возможности частичной компенсации неврологических нарушений, даже несмотря на стойкость патологических изменений.

Наибольший эффект наблюдался при сочетании физиотерапии, медикаментозной коррекции и функциональной нейростимуляции. Использование ботулинотерапии способствовало снижению выраженности спастичности и повышению объема активных движений в суставах. Это согласуется с данными других исследований, подтверждающих эффективность ботулинического токсина в уменьшении мышечного тонуса и улучшении двигательных возможностей у пациентов с церебральным параличом. Однако полученные результаты также указывают на необходимость комплексного подхода, так как изолированное применение данной методики не даёт столь выраженного эффекта.

Функциональная нейростимуляция показала себя как перспективный метод коррекции двигательных нарушений. Улучшение координации движений и мышечного контроля у значительной части пациентов свидетельствует о положительном влиянии электростимуляции и транскраниальной магнитной стимуляции на функциональную активность центральной нервной системы. Данный факт подтверждается нейрофизиологическими исследованиями, указывающими на способность мозга к пластичности даже в поздних стадиях заболевания.

Когнитивные и речевые улучшения, зафиксированные у пациентов после курса логопедической и нейропсихологической коррекции, указывают на значительный потенциал реабилитации в данной сфере. Хотя в поздней резидуальной стадии восстановление когнитивных функций может быть ограничено, результаты исследования подтверждают, что целенаправленная терапия способствует развитию коммуникативных навыков и улучшению адаптации пациентов.

Несмотря на положительную динамику, реабилитация детей с детским церебральным параличом в поздней резидуальной стадии остаётся сложной задачей, требующей индивидуального подхода. Успешность восстановления во многом зависит от степени тяжести двигательных и когнитивных нарушений, своевременности начала реабилитационных мероприятий и комплексности применяемых методов.

Таким образом, результаты исследования подтверждают эффективность современных реабилитационных методик и необходимость их комбинированного применения. Дальнейшие исследования должны быть направлены на уточнение оптимальных схем терапии, адаптированных под индивидуальные потребности пациентов, а также на изучение долгосрочных результатов реабилитации, что позволит повысить её эффективность и улучшить качество жизни детей с детским церебральным параличом.

ВЫВОДЫ

Проведённое исследование подтвердило эффективность комплексной реабилитации детей с детским церебральным параличом в поздней резидуальной стадии. Использование современных методов лечения, таких как физиотерапия, медикаментозная коррекция, функциональная нейростимуляция и логопедическая терапия, способствовало улучшению двигательных, когнитивных и речевых функций у большинства пациентов.

Наиболее выраженные положительные изменения наблюдались при сочетании нескольких реабилитационных методик. Ботулинотерапия продемонстрировала высокую эффективность в снижении мышечного тонуса, а ортопедические операции способствовали улучшению подвижности суставов и уменьшению контрактур. Применение функциональной нейростимуляции положительно сказалось на координации движений и мышечном контроле.

Результаты исследования подтвердили значительную пластичность центральной нервной системы даже в поздней резидуальной стадии заболевания, что позволяет компенсировать часть неврологических нарушений при правильном подходе к реабилитации.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, реабилитация детей с детским церебральным параличом остаётся сложной и длительной задачей, требующей индивидуального подхода. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку оптимальных стратегий комплексного лечения, учитывающих индивидуальные особенности каждого пациента и позволяющих повысить эффективность реабилитации.

Использованная литература:

1. Акатов В.Л., Кузнецов А.Н. Детский церебральный паралич: клиника, диагностика, лечение. – М.: Медицина, 2018.
2. Богданов Л.М., Скворцова В.И. Неврология детского возраста. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2019.
3. Гончаров В.В., Пугачев А.Г. Реабилитация детей с ДЦП: современные подходы и методики. – Новосибирск: СибАК, 2020.
4. Зайцев А.А., Климова Н.С. Физическая реабилитация детей с последствиями ДЦП. – Москва: Логос, 2021.
5. Ковальчук В.В. Лечебная физкультура при детском церебральном параличе. – Минск: БелМед, 2017.
6. Реабилитация детей с детским церебральным параличом: клинические рекомендации. Союз педиатров России, 2022.
7. Федорова И.Н., Смирнов А.В. Комплексная реабилитация больных детским церебральным параличом. – Казань: Татмед, 2021.
8. Цветкова Е.С. Коррекционная педагогика и реабилитация при ДЦП. – Санкт-Петербург: Питер, 2020.
9. Червяков А.В. Ортопедическая коррекция и реабилитация детей с ДЦП. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.
10. Шмидт А.Г., Васильева Е.П. Современные методы физиотерапии при детском церебральном параличе. – Екатеринбург: Уральский университет, 2022.

ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИНГ ҚАЙТАЛАНИШИДА МОРФОЛОГИК МОДИФИКАЦИЯНИНГ ТАЪСИРИ

Раджабов Жасур Пардабоевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15164269>

Аннотация: Эхинококк кисталарининг морфологик шаклининг касаллик билан касалланишига таъсирини аниқлаш учун биз операциялар протоколларини ретроспектив таҳлил қилдик ва 93 (36,9%) операция қилинган беморларда кисталарнинг морфологик тузилиши *Echinococcus hominis* модификациясига тўғри келишини аниқладик, 128 (50,8%) – *echinococcus veterinorum* ва 31 (12,3%) - *echinococcus acerphalocystis*. Бундан ташқари, касалликнинг ривожланган қайталаниши бўлган 47 беморда *echinococcus hominis* га мос келадиган морфологик белгилар 29 (61,7%), *echinococcus veterinorum* 18 (38,3%) аниқланди, *echinococcus acerphalocystis* га мос келадиган морфологик тузилиш билан операция қилинганларда қайталаниш кузатилмади. Шундай қилиб, *echinococcus hominis* шаклига мос келадиган морфологик тузилишга эга жигар эхинококкози билан операция қилинган 93 бемордан 29, яъни 31,2% касаллик такрорланган, *echinococcus veterinorum* кисталарининг морфологик модификацияси билан операция қилинган 128 бемордан 18, яъни 14,1% ҳам операциядан кейинги муддатда узоқ вақт давомида такрорий эхинококкоз ривожланган.

Калит сўзлар: Жигар эхинококкози, касалликнинг қайталаниши

ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ РЕЦИДИВА ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

Раджабов Жасур Пардабоевич

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: Для определения влияния морфологической формы эхинококковых кист на частоту развития рецидива болезни нами проведен ретроспективный анализ протоколов операций и определено, что у 93 (36,9%) оперированных больных морфологическая структура кист соответствовало модификаций *echinococcus hominis*, 128 (50,8%) – *echinococcus veterinorum* и у 31 (12,3%) – *echinococcus acerphalocystis*. Причем у 47 больных с развившимся рецидивом болезни у 29 (61,7%) выявлены морфологические признаки соответствующие *echinococcus hominis*, у 18 (38,3%) *echinococcus veterinorum*, у оперированных с морфологической структурой соответствующей *echinococcus acerphalocystis* рецидив не выявлен. Таким образом, из 93 больных оперированных эхинококкозом печени с морфологической структурой соответствующей форме *echinococcus hominis* у 29, т.е. в 31,2% наблюдался рецидив заболевания, из 128 оперированных с морфологической модификацией кист *echinococcus veterinorum* у 18, т.е. 14,1% также в отдаленные сроки после операции развился рецидивный эхинококкоз.

Ключевые слова: Эхинококкоз печени, рецидив болезни.

INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION IN THE APPEARANCE OF RECURRENCE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS

Radjabov Djasur Pardaboevich

Samarkand State Medical University

Abstract: To determine the effect of the morphological form of echinococcal cysts on the incidence of recurrence of the disease, we conducted a retrospective analysis of the operation

protocols and determined that in 93 (36.9%) operated patients, the morphological structure of the cysts corresponded to modifications of echinococcus hominis, 128 (50.8%) - echinococcus veterinorum and in 31 (12.3%) - echinococcus acephalocystis. Moreover, in 47 patients with developed recurrence of the disease, 29 (61.7%) had morphological signs corresponding to echinococcus hominis, 18 (38.3%) had echinococcus veterinorum, and no recurrence was detected in those operated on with the morphological structure of the corresponding echinococcus acephalocystis. Thus, out of 93 patients operated on for liver echinococcosis with a morphological structure corresponding to the form of echinococcus hominis, 29, i.e. in 31.2%, a relapse of the disease was observed, out of 128 operated on with morphological modification of echinococcus veterinorum cysts in 18, i.e. 14.1% also developed recurrent echinococcosis in the long term after the operation.

Key words: Liver echinococcosis, disease recurrence.

КИРИШ

Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, эхинококкоз бутун дунё бўйлаб 1 миллиондан ортиқ одамга таъсир қилади, 44-84% ҳолларда турли органлар ва тўқималар орасида бу жараён жигарда локализация қилинади [5, 6, 7]. Беморлар сонининг пасайиш тенденцияси йўқлиги ва касалланиш даражаси 100 000 аҳоли орасида 1,2 дан 9,0 гача ўзгариб турадиган эндемик минтакалар мавжудлиги сабабли, бу паразитар касаллик жиддий тиббий ва ижтимоий муаммо бўлиб қолмоқда [4]. Ҳозирги босқичда, жигар эхинококкози (ЖЭ) ташхиси ахборот қиймати юқори бўлган ноинвазив кўриш усуллари туфайли 95-100% [1] га етади, муҳим қийинчиликлар мавжуд эмас. Бироқ, эхинококкозга нисбатан ҳушёрликнинг етишмаслиги кеч ташхис қўйишга ва натижада касалликнинг мураккаб шакллариининг кўпайишига ёрдам беради [2, 3]. Операциядан кейинги асоратларни (34-50%) ва касаллик (15-64%) операциядан кейинги касалликнинг қайталаниш ҳолатлари кенг тарқалган жарроҳлик тактикасини кам самарадорлигини ва [7] ишончлилигини кўрсатади. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ушбу хавфли касалликнинг олдини олиш ва даволаш бўйича маълумотларни такомиллаштириш ва янги самарали чора-тадбирларни ишлаб чиқиш зарурлиги аён бўлади.

Тадқиқот мақсади. Эхинококк кисталарининг морфологик модификациясига қараб такрорий жигар эхинококкозининг мумкин бўлган сабабларини таҳлил қилиш.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ.

Эхинококк билан жигар шикастланишининг учта морфологик модификацияси мавжуд: echinococcus hominis, echinococcus -veterinorum, echinococcus acephalocystis. Эхинококкознинг морфологик модификациясини аниқлаш учун биз инструментал тадқиқот усуллари (ультратовуш, КТ) натижаларини таҳлил қилдик ва жигар эхинококкози бўлган 252 беморда жарроҳлик материаллини ўргандик.

Эхинококкоз модификацияларининг морфологик тузилишини тавсифлашдан олдин шуни таъкидлаш керакки, уларнинг барчаси герминал мембранада содир бўладиган дистрофик жараёнларнинг мавжудлиги ва ривожланиш даражаси билан бир-биридан фарқ қилади, бу ерда паразитнинг асосий таркибий бирлиги- бу насл капсуласи ҳаётий протосколексларни ишлаб чиқаришга қодир.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Echinococcus hominis модификацияси эхинококк кисталарининг 36,9% ҳолатларида қайд этилган. Паразитнинг бу шакли киста ичида гидатид суюқлигидан ташқари

протосколексли капсулаларда қиз ва баъзан неваара пуфаги борлиги билан ажралиб турарди. Одатда бундай кисталар катта ҳажмга эга эди. Она кисталари макроскопик жиҳатдан қўпол сиртга эга бўлиб, сутли оқ ёки оқ-сарик рангга бўялган (расм 1, 2). Қиз кисталари сони бирдан бир неча ўнлабгача кенг тарқалган. Она кистасининг йиринглаши ёки ўлими билан уларнинг бўшлиғидаги қиз кистаси бир хил ўзгаришларга учради. Бироқ, катта эхинококк кисталарида қиз пуфаги турли вақтларда nobуд бўлади ва шунинг учун ўликлар билан бирга тирик қиз пуфаги топилган. Ушбу кисталарда гидатид суюқлигининг босими одатда паст бўлади ва суюқликнинг ранги шаффоф ёки кўпинча булутли бўлади. Она кистаси ва етук қиз кисталари суюқлигини цитологик текширишда протосколекслар аниқланди.

Дистрофик ўзгаришлар табиатда фокал эди. Киста деворининг турли жойлари ўзгаришларнинг зўравонлиги билан бир-биридан фарқ қилиши мумкин. Герминал мембрананинг шишиши ва деламинацияси мембраналарнинг ўтказувчанлиги бузилганлигини кўрсатади. Ўлик кисталарда герминал қатламнинг эрта ўлими қайд этилади. Хитинли қобиқ янада барқарор ва кейинчалик парчаланишга учрайди.

Паразитнинг бу шаклидаги характерли ультратовуш белгиси "балиқ тангачалари" аломати бўлиб, у икки хил бўлиши мумкин - текисланган ва юмалоқ тангачалар. Биринчиси, "кўп камерали" эхинококк белгилари, иккинчиси- киста инволюцияси белгилари. *Echinococcus hominis* нинг ультратовуш семиотикаси 3-расмда кўрсатилган.

Echinococcus hominis ни аниқлашнинг клиник аҳамияти шундан иборатки, ўлимдан кейинги эрта ўзгаришлар босқичи бўлиб, айнан шу шаклда сколексларнинг хитин қобиғидан ташқарига қалинлашганлиги ёки ҳатто фиброз капсуладан ташқарига кўчиши содир бўлади ва эхинококк кистасининг ўсишида экзоген куртакланиш билан содир бўлади.




Расм. 1. 2. Жигарда *Echinococcus hominis* модификациясининг морфологик шакли ва она кистасидан қиз ва неваара кисталари олиб ташланган



Расм. 3. *Echinococcus hominis* қиз пуфагининг ультратовушли сурати.


Операциядан кейинги узоқ муддатли даврда эхинококкозни жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини таҳлил қилишимиз ушбу модификация билан касалликнинг қайталаниши олдиндан мавжуд бўлган кисталар жойида кузатилганлигидан далолат беради. Шундай қилиб, касалликнинг 47 та қайталанишидан 29 таси (61,7%) *echinococcus hominis* билан зарарланиш ҳолатлари эди.

Echinococcus veterinorum модификацияси паразитар кисталарнинг 50,8% ҳолатларида қайд этилган. Касалликнинг ушбу шаклида лавроцисталар ичида фақат насл капсулалари ва эхинококк суюқлиги мавжуд. Қиз пуфакчаларининг шаклланиши содир бўлмайди. Ушбу турдаги пуфакчаларнинг ўзига хос хусусияти эхинококк суюқлигининг бошқа шаклларга нисбатан энг юқори босимидир. Кўпгина ҳолларда, бундай кисталар клиник жиҳатдан "таранг" деб таърифланади (Расм. 4).



Расм. 4. Жигарда *echinococcus veterinorum* нинг " таранг " эхинококк кистаси.

Эхинококк суюқлигининг цитологик текшируви эхинококк суюқлигида эркин сузувчи кўплаб сколекслар ва насл капсулаларини аниқлайди. 1 мл суюқликдаги уларнинг сони ўртача 1200 гача, микроскопик сколекслар овал шаклга эга. Ёруғлик микроскопи остида ички микроб қатлами ингичка бўлиб, пуфак бўшлиғини ичкаридан қоплаган мембрана шаклида бўлади. Ушбу қатламнинг шишиши ва деламинацияси камроқ аниқланади. Герминал мембрананинг деярли бутун юзаси кум донасига ўхшаш герминал қаватга донаторлик берадиган муртак пуфакчалари қатлами билан қопланган.



Расм. 5. Гиперэхоген чўкинди борлиги билан *echinococcus veterinorum* да жигарнинг ультратовуш текшируви.

Echinococcus veterinorum ҳам паразит мавжудлигининг агрессив шакли бўлиб, кўп сонли ҳаётни таъминловчи сколексларни ўз ичига олган гидатид суюқлигининг юқори

босими туфайли қобиқнинг яхлитлигини озгина бузган ҳолда эркин қорин бўшлиғига кириб, қорин бўшлиғи органларини массив эхинококкоз билан зарарланишига олиб келади. Шунингдек, ушбу турдаги кисталарнинг ўзига хос хусусияти эхинококк кистаси атрофида ҳосил бўлган қалин толали капсуладир. Шунинг учун ушбу модификация билан жарроҳлик аралашувлар апаразитарлик ва антипаразитарлик қоидаларига диққат билан риоя қилган ҳолда амалга оширилиши керак. Ушбу модификациядаги кисталарнинг операциядан олдинги диагностикаси бир қатор билвосита топилмаларга асосланади, бунинг асосида *echinococcus veterinorum* мавжудлигини баҳолаш эҳтимоли кўпроқ. Аввало, бу "гидатид кум" бўлиб, у ультратовуш ёрдамида субъект танасининг ҳолати ўзгарганда аниқланади. Ушбу эхографик нақш кўплаб сколекслар она кистасининг бўшлиғини тўлдириш ва гиперэхоген чўқинди сифатида намоён бўлиш кабиларга сабаб бўлади (расм. 5).

Киста модификацияси ҳақида билвосита фикр бериши мумкин бўлган яна бир ўзига хос хусусият-бу толали капсуланинг қалинлиги. Бизнинг маълумотларимизга кўра, жигарнинг такрорий эхинококкози бўлган 47 бемордан 18 (38,3%) таси *echinococcus veterinorum* морфологик тузилишига мос келадиган белгиларни кўрсатди.

Паразитар кисталарнинг 12,3 фоизда *echinococcus accephalocystis* учинчи модификациясининг лавроцисталари аниқланди. Ушбу турдаги кисталар зоти капсулалари ва протосколексларнинг йўқлиги билан тавсифланади. Улар одатда диаметри 6-7 см дан ошмайдиган ўрта катталиқда эди, сарғиш-қулранг рангга эга эди, силлиқ девор, толали капсулада фарқ қиларди, унчалик аниқ эмас эди.

Кисталарнинг гидатид суюқлигини цитологик текшириш пайтида сколекслар аниқланмади. Герминал мембранани ёруғлик микроскопи ёрдамида гистологик текшириш шуни кўрсатдики, унинг бутун юзаси дистрофик ўзгаришларга учрайди, зоти капсулалари йўқ. Шунинг учун бу кисталар герминал элементларни ишлаб чиқаришга қодир эмас.

Бундай кисталарнинг эхографик ва компьютер томографик хусусиятлари паразит бўлмаган жигар кисталарига жуда ўхшайди, чунки уларнинг таркиби бир ҳил ва толали капсуланинг қалинлиги катта ўлчамларга етиб бормайди.

Биз *echinococcus accephalocystis* паразит мавжудлигининг энг кам инвазив шакли эканлигини аниқладик. Курснинг "қулайлиги" эхинококк суюқлигида ҳаётий элементларнинг етишмаслиги туфайли паст даражадаги агрессивлик ва паст энергия салоҳиятига эга бўлганлиги сабабли, кисталарнинг ушбу модификацияси билан тарқалган эхинококкоз ҳолатлари ва касалликнинг қайталаниши мавжуд эмас. Бундан ташқари, ушбу турдаги кисталар катта ўлчамларга етиб бормайди ва жигар томонидан морфологик ўзгаришлар қайтарилади.

Шуни таъкидлаш керакки, жигарнинг кўплаб эхинококк билан зарарланиши 167 (66,2%) беморда, алоҳида ҳолларда эхинококкознинг турли модификацияларнинг бирлашиши кузатилди. *Echinococcus hominis* ва *echinococcus veterinorum* ассоциацияси кузатилди.

ХУЛОСА

Эхинококк кисталарининг морфологик шаклининг касаллик билан касалланишига таъсирини аниқлаш учун биз операциялар протоколларини ретроспектив таҳлил қилдик ва 93 (36,9%) операция қилинган беморларда кисталарнинг морфологик тузилиши *Echinococcus hominis* модификациясига тўғри келишини аниқладик, 128 (50,8%) – *echinococcus veterinorum* ва 31 (12,3%) - *echinococcus accephalocystis*.

Бундан ташқари, касалликнинг ривожланган қайталаниши бўлган 47 беморда *echinococcus hominis* га мос келадиган морфологик белгилар 29 (61,7%), *echinococcus veterinorum* 18 (38,3%) аниқланди, *echinococcus acerphalocystis* га мос келадиган морфологик тузилиш билан операция қилинганларда қайталаниш кузатилмади.

Шундай қилиб, *echinococcus hominis* шаклига мос келадиган морфологик тузилишга эга жигар эхинококкози билан операция қилинган 93 бемордан 29, яъни 31,2% касаллик такрорланган, *echinococcus veterinorum* кисталарининг морфологик модификацияси билан операция қилинган 128 бемордан 18, яъни 14,1% ҳам операциядан кейинги муддатда узок вақт давомида такрорий эхинококкоз ривожланган.

Адабиётлар:

1. Резолюция XXII Международного конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии» // *Анналы хирургической гепатологии*. 2015; 20 (4): 128-131.
2. Вишневский В.А. и соавт. Эхинококкоз печени. Хирургическое лечение // *Доказательная гастроэнтерология*. 2013. №2. С. 18-25.
3. Назыров Ф.Г. и соавт. Химиотерапия и проблемы рецидивного эхинококкоза печени // *Анналы хирургической гепатологии*. 2011; 16(4): С. 19-24.
4. Чжао А. В., Икрамов Р. З. Хирургическое лечение эхинококкоза печени // *Хирургия*. – 2016. – №. 2. – С. 15-17.
5. Шамсиев А.М. и соавт. Совершенствование хирургического лечения эхинококкоза печени // *Медицинский журнал Узбекистана*. – Ташкент. - 2017. - №1. - С. 2-5.
6. Шамсиев А.М. и соавт. Экспериментальное обоснование эффективной терапевтической дозы альбендазола для профилактики рецидива эхинококкоза // *Проблемы биологии и медицины*. – Самарканд. - 2018. - №3(102). - С. 151 - 156.
7. Marom G et al Operative treatment of hepatic hydatid cysts: A single center experience. // *Asian J Surg*. 2018 Nov 13. pii: S1015-9584(18)30548-7.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИИ СЛОЖНЫХ СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ

Рустамов И.М.,¹ Джурабекова С.Т.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет

²Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15160972>

Аннотация: В основу настоящего исследования положен опыт комплексной диагностики и хирургического лечения 102 больных свищами прямой кишки, находившихся на стационарном лечении в проктологическом отделении многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в сроки с 2021 по 2024 год.

Ключевые слова: свищи прямой кишки, сложные формы, хирургическое лечение, современная диагностика

MODERN METHODS OF SURGERY FOR COMPLEX RECTAL FISTULAS

Rustamov I.M.,¹ Jurabekova S.T.²

¹Samarkand State Medical University

²Tashkent Pediatric Medical Institute

Abstract: This study is based on the experience of complex diagnostics and surgical treatment of 102 patients with rectal fistulas who were hospitalized in the proctology department of the multidisciplinary clinic of the Samarkand State Medical University from 2021 to 2024.

Keywords: rectal fistulas, complex forms, surgical treatment, modern diagnostics

ВВЕДЕНИЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения свищи прямой кишки являются одним из самых распространенных проктологических заболеваний, встречается у 3-4% населения, с преимущественным поражением лиц трудоспособного возраста. Оперативное лечение анальных свищей является далеко не простым делом, требует и осторожности, и смелости, базирующихся на широком опыте в этом заболевании, со всеми его вариантами, и уверенным пониманием анатомии. На результат лечения влияет совершенная техника операции. Без смущения и без колебания можно сказать, что экстирпация прямой кишки является обычно простым хирургическим упражнением сравнительно с действительно сложными манипуляциями, проводимыми при оперативном лечении высоких свищей прямой кишки. Достаточно опытный в этом вопросе хирург может вылечить почти все свищи». Данным высказыванием, принадлежащим J.C. Goligher, начинает главу об оперативном лечении свищей прямой кишки А.М. Аминев, в 3-м томе руководства по проктологии (1973). В начале данного раздела автор совершенно обоснованно говорит о дилемме, которая еще с 30-х годов XX века стояла перед хирургами - не допустить рецидива свища и не вызвать недержания кишечного содержимого после операции.

В мировой практике несмотря на совершенствование медицинского оборудования, разработку большого количества хирургических, в т.ч. высокотехнологичных, вмешательств, указанная А.М. Аминовым и другими авторами дилемма остается актуальной и до сих пор. По мнению различных авторов, «Золотой стандарт», позволяющий надежно устранять сложные свищи прямой кишки без повреждения ее сфинктерного

аппарата, до сих пор отсутствует, о чем свидетельствуют данные различных сравнительных исследований и метаанализов. Традиционные общепринятые операции хотя и приводят к выздоровлению большей части больных, однако связаны с травмирующим воздействием на анальный сфинктер, что, собственно, и способствует продолжающейся разработке все новых и новых вмешательств. Наиболее щадящим среди традиционных, вошедших в повседневную хирургическую практику, способов является методика иссечения свища с закрытием внутреннего свищевого отверстия лоскутом стенки прямой кишки или кожно-анальным лоскутом. Метод, в целом, позволил снизить риск развития после операции выраженных форм анальной инконтиненции и деформации заднего прохода. Однако, и эта методика, по данным различных авторов, сопряжена с высокой частотой развития недостаточности анального сфинктера легкой степени, достигающей 30-38%.

Целью исследования является улучшение результатов лечения больных свищами прямой кишки путем совершенствования технических аспектов иссечения свищевого хода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу исследования включены результаты лечения 102 больных с транссфинктерными и экстрасфинктерными свищами прямой кишки, поступивших в проктологическое отделение многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2021 по 2024 гг. Пациенты условно разделены на две группы: Первую группу, группу сравнения составили 56 (41,0%) больных свищами прямой кишки, которым осуществлялась иссечение свищей традиционными способами. Вторую, основную группу составили 78 (59,0%) больных, которым произведены иссечение свищей с использованием модифицированных инструментов.

В исследуемых группах преобладали пациенты с транссфинктерными свищами (67,2%), что было обусловлено характером оперативных вмешательств в подгруппах. В обеих группах у большинства пациентов диаметр внутреннего свищевого отверстия был <3,0 мм (в основной группе в 74,3% случаев и в группе сравнения 69,6% случаев). У 25,6% пациентов основной и 33,9% группы сравнения диаметр внутреннего отверстия превышал 3 мм (4 - 10). В 44 (56,4%) случаях в основной и 25 (44,6%) случаях в группе сравнения по ходу свища имелись одиночные затеки различной локализации, в 16 (20,5%) и 11 (19,6%) случаях соответственно одновременно определялось несколько затеков в различных сочетаниях. У 34 (43,6%) пациентов основной и 21 (37,5%) группы сравнения затеки по ходу свища отсутствовали.

Осмотр больных производили в гинекологическом кресле в положении на спине или на обычном перевязочном столе в колено - локтевом положении. Обращали внимание на состояние кожных покровов промежности и ягодичной области. Асимметрия свидетельствовала о наличии воспалительного и дегенеративного процесса (рис. 1).

Важным и обязательным методом исследования при свищах прямой кишки явилось проведение металлического пуговчатого зонда через наружное свищевое отверстие. Это давало возможность судить о направлении свищевого хода и его ветвлении в тканях промежности, отношении свищевого хода к волокнам сфинктера прямой кишки, наличии гнойных полостей в параректальных клетчаточных пространствах (рис. 2).



Рис. 1. Осмотр перианальной зоны



Рис. 2. Зондирование свищевого

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

В основной группе пациентам применялся один из вариантов вмешательств, направленных на максимальное сохранение сфинктера (сфинктеросберегающие операции). В зависимости от расположения свищевого хода к отношению к мышечным волокнам анального жома, были выполнены следующие виды операций.

Больным основной группы с трансфинктерными свищами - LIFT (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract, т.е. перевязка свищевого хода в межсфинктерном пространстве) с ликвидацией внутреннего отверстия свища у самого основания после выворачивания его на изнанку в просвет прямой кишки с использованием модифицированного пуговчатого зонда с оливой или гибкого цилиндрического проводника с оливой при извилистой свищевом ходе. При гнойных скоплениях в параректальной клетчатке кроме иссечения свища, произведено вскрытие, выскабливание стенки гнойной полости, промывание антисептиками и дренирование остаточной полости.

В эту подгруппу были включены 49 пациентов. Средний возраст пациентов данной группы составил $45,3 \pm 7,1$ года.

Больным основной группы с экстрафинктерными свищами в зависимости от

степени сложности свищевого хода были произведены иссечение экстрасфинктерного свища I-II степени сложности без повреждений мышечных волокон анального жома с применением модифицированного проводника и иссечение экстрасфинктерного свища III-IV степени сложности с вскрытием гнойной полости.

В эту подгруппу были включены 29 пациентов. Средний возраст пациентов данной подгруппы составил $52,1 \pm 9,7$ лет.

В многопрофильной клиник Самаркандского государственного медицинского университета при выполнении иссечения свищей прямой кишки до 2020 г. пользовались исключительно традиционными методами, после которых имелись общеизвестных недостатков - недостаточность и стриктура анального сфинктера, рецидив свищей прямой кишки и др. Указанные обстоятельства побудили нас к поиску более щадящих, менее травматичных и в то же время радикальных методов операций.

В результате с 2021 г. при свищах прямой кишки выбор хирургического лечения был дифференцированным с учетом индивидуальной особенностью для каждого пациента (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № DGU 34235, Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан «Программа для определения выбора хирургической тактики свищах прямой кишки»). При выборе способа хирургического лечения мы ориентировались на результаты дооперационной диагностики. МРТ сочетали с данными УЗИ и фистулографии. Учитывали пол больных, а также расположение и степень сложности свищевого хода.

ВЫВОДЫ

1. Лучевые методы диагностики у больных прямокишечными свищами, включающие ультразвуковое исследование прямой кишки и параректальной клетчатки МРТ малого таза и фистулографию с применением разработанных устройств, обеспечивающих качественное контрастирование свища позволяющее визуализировать внутреннее отверстие и определить отношение свищевого хода к волокнам анального сфинктера обеспечивает адекватную предоперационную диагностику и упрощает выбора хирургической тактики.

2. Разработанный алгоритм выбора тактики хирургического лечения больных прямокишечными свищами, позволил улучшить качество оказываемой помощи за счет снижения частоты ближайших послеоперационных осложнений с 8,9% до 2,6% ($p=0,027$ по критерию χ^2), рецидива заболевания с 6,4% до 1,8% ($p=0,031$ по критерию χ^2) и недостаточность анального сфинктера с 8,5% удалось свести к нулю.

3. При хирургическом лечении сложных прямокишечных свищей применение модифицированного пуговчатого зонда и гибкого цилиндрического проводника с оливой более проста в техническом плане, не повреждает мышечные волокна анального жома и требует меньше времени, затрачиваемого на оперативное лечение - $44,2 \pm 5,1$ против $80,5 \pm 7,3$ минут.

4. Примененные в основной группе сфинктеросберегающие оперативные вмешательства, в сравнении с традиционными операциями иссечения свища со швом сфинктера требует меньше срока временной нетрудоспособности - $18,9 \pm 3,6$ против $32,7 \pm 4,6$ дней; более благоприятное течение послеоперационного периода, меньшую выраженность болевого синдрома - $1,6 \pm 0,3$ против $6,0 \pm 0,2$ балла; меньшие сроки госпитализации - $10,1 \pm 2,2$ против $17,4 \pm 3,1$ дня и послеоперационной реабилитации больных, которое

существенно повлияло на качество жизни после операции, а также обеспечивает снижение финансовых затрат для достижения благоприятных исходов лечения.

Литература.

1. С.А. Абдуллаев, С.Т. Хужабаев, М.М. Дусияров, И.М. Рустамов. тактика хирургического лечения гнойно-некротических осложнений мягких тканей у больных сахарным диабетом и диабетической стопы //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 399-404.
2. Abdullaev S., Akhmedov A. T. A., Djalolov D. Problems of surgical tactics for the treatment of diabetic foot syndrome //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1836-1838.
3. Abdullaev S. et al. Features of Complex Surgical and Infusion Treatment of Sepsis in Diabetes Mellitus //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2283-2288.
4. Abdullaevich A. S. et al. Problems of Sepsis Diagnostic and Treatment in Diabetes Mellitus //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2020. – Т. 10. – №. 3. – С. 175-178.
5. Abdullaev S. et al. Problems of Diagnostics, Prevention and Surgical Tactics of Treatment of Adhesive-Intestinal Obstruction //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2289-2294.
6. Абдуллаев С. А., Джалолов Д. А. Особенности течения болезни Фурнье при сахарном диабете //Наука в современном мире: приоритеты развития. – 2020. – №. 1. – С. 9-11.
7. Абдуллаев С. А. и др. прогнозирование тяжести травмы и исхода лечения пострадавших с сочетанной травмой груди и живота //Скорая медицинская помощь. – 2003. – Т. 4. – №. 4. – С. 19-20.
8. Абдуллаев С. А. и др. классификация сочетанной травмы груди и живота //Скорая медицинская помощь. – 2003. – Т. 4. – №. 4. – С. 18-18.
9. Абакумов М. М. и др. Разрывы диафрагмы при сочетанных повреждениях груди и живота //Вестн. хир. – 1991. – №. 5-6. – С. 64-68.
10. Abdullaev S. A. et al. surgical tactics for the treatment of sepsis in diabetes mellitus //in science and innovation in the 21st century: current issues, discoveries and achievements. – 2019. – С. 190-194.
11. Абдуллаев С. и др. Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у обожженных //Журнал вестник врача. – 2012. – Т. 1. – №. 03. – С. 12-13.
12. Шеркулов К.У., Рустамов И.М., Усмонкулов М.К. результаты лечения больных острым гангренозно некротическим парапроктитом //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 483-486.
13. Abakumov M. M. et al. Diaphragmatic ruptures in combined injuries to the chest and abdomen //Vestnik Khirurgii Imeni II Grekova. – 1991. – Т. 146. – №. 5. – С. 64-68.
14. I.M. Rustamov, J.A. Karabayev. modern approach to the treatment of patients with acute gangrenous-necrotic paraproctitis //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 469-472.
15. Murodulla R. et al. a rare case of keratoakontoma //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
16. РУСТАМОВ М. И. и др. Современная тактика лечения острого парапроктита //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 2.

17. Ismailov S. I. et al. Predictors of postoperative complications in patients with ventral hernia //Khirurgiya. – 2022. – №. 1. – С. 56-60.
18. Dusiyarov M.M., Eshonxodjaev J.D., Xujabaev S.T., Sherkulov K.U., & Rustamov I.M. (2021). Estimation of the efficiency of antisseal coating on the model of lung wound in experiment. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 1(4), 1-6. <https://doi.org/10.47494/cajmns.v1i4.57>.
19. Rustamov M.I., Rustamov I.M., Shodmonov A.A. Optimising surgical management of patients with acute paraproctitis //Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 02. – С. 36-42.
20. Рустамов М.И., Давлатов С.С., Сайдуллаев З.Я., & Рустамов И.М. Хирургическое лечение больных гангреной фурнье //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-71.
21. Дусияров М.М., Рустамов И.М., Муртазаев Х.Ш., Шербекова Ф.У. Выбор оптимального метода лечения эпителиально-копчикового хода //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2017. – С. 358-358.
22. Дусияров М.М., Рахматова Л.Т., Рустамов И.М. Результаты хирургического лечения сложных свищей прямой кишки //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2017. – С. 358-359.
23. Рустамов И.М., Кан С.А., Рустамов М.И., Шербеков У.А., Дусияров, М. М. Анализ результатов хирургического лечения больных гангреной фурнье //Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2017. – С. 83-86.
24. Abdullaev S. A. et al. problems of diagnosis and treatment of sepsis in diabetes mellitus //doctor's bulletin. – Т. 6.
25. С.А.Абдуллаев, Ф.Ш.Юлдошев, С.Т.Хужабоев, and М.М.Дусияров. "диабетик панжа ва юмшоқ тўкималардаги йирингли-некротик яраларни махаллий даволаш технологиялари" Research Focus, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 394-398.
26. Абдуллаев С.А. "битишма касаллиги ва унинг профилактика қилиш муаммолари" Research Focus, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 96-103.
27. SA Abdullaev. surgical treatment of purulent-necrotic soft tissue complications in patients with diabetes mellitus and diabetic foot// World Bulletin of Public Health, 2023, pp. 157-160.
28. Abdullayev S.A. (2023). Treatment of Purulent-Necrotic Soft Tissue Complications in Diabetic Foot. Eurasian Medical Research Periodical, 17, 118–120.

17.00.00 – San’atshunoslik fanlari

17.00.00 - Arts studies

17.00.00 – Искусствоведение

"ЭВОЛЮЦИЯ ХОРОВОЙ ОБРАБОТКИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН: КОМПОЗИТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА"

Мухиддинова Гульзира Хусанбаевна

Базовая докторантка кафедры теории музыки Государственной консерватории
Узбекистана

Научный руководитель: **Азимова Арзу Нишановна** профессор, доктор
искусствоведения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106897>

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы хоровой обработки и аранжировки народных песен в отечественном музыкознании. Анализируются терминологические различия этих понятий, а также ключевые этапы эволюции жанра и приемы адаптации монодического фольклора к многоголосному изложению. Особое внимание уделено формированию национальной хоровой традиции Узбекистана в XX веке и композиторским стратегиям взаимодействия народной мелодики с академическими принципами гармонии и полифонии. Исследуются подходы В.Успенского, Т.Садыкова М.Бурханова и других композиторов. Сделан вывод о значении хоровой обработки как средства сохранения и актуализации народного музыкального наследия.

Ключевые слова: хоровая обработка, хоровая аранжировка, народная музыка, академическое многоголосие, узбекский фольклор, композиторские стратегии.

"THE EVOLUTION OF CHORAL ARRANGEMENTS OF FOLK SONGS: COMPOSITIONAL STRATEGIES AND PERFORMANCE PRACTICE"

Gulzira Khosanbaevna Mukhiddinova

Basic Doctoral Student, Department of Music Theory
State Conservatory of Uzbekistan

Academic Advisor: Arzu Nishanovna Azimova,
Professor, Doctor of Arts

Abstract: The article examines the issues of choral arrangement and adaptation of folk songs in domestic musicology. It analyzes the terminological differences between these concepts, as well as the key stages in the evolution of the genre and techniques for adapting monodic folklore to polyphonic choral performance. Special attention is given to the formation of Uzbekistan's national choral tradition in the 20th century and compositional strategies integrating folk melodies with academic principles of harmony and polyphony. The study explores the approaches of V. Uspensky, T. Sadykov, M. Burkhanov, and other composers. The research concludes that choral arrangement plays a crucial role in preserving and actualizing folk musical heritage.

Keywords: choral arrangement, choral adaptation, folk music, academic polyphony, Uzbek folklore, compositional strategies.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования вопросов обработки хорового материала в отечественном музыкознании не только не утрачивает своей значимости в наши дни, но, напротив, приобретает новое звучание в контексте современной историко-культурной ситуации. В течение длительного периода развития академической музыки сформировались различные подходы к интерпретации хоровых обработок.

Следует отметить, что на каждом этапе становления и эволюции композиторской практики особую роль играли процессы ассимиляции фольклорных форм, что, в свою очередь, нашло отражение в создании обработок народных песен для хоровых коллективов. В этом контексте важно дифференцировать два ключевых понятия: «хоровая обработка» и «хоровая аранжировка», которые, несмотря на свою внешнюю схожесть, обладают различной семантикой и функциональным предназначением в музыкальном искусстве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Хоровая обработка и хоровая аранжировка: понятийные различия

«Хоровая обработка» представляет собой процесс адаптации музыкального произведения, первоначально созданного для других инструментов или исполнительских составов (например, сольного исполнения, инструментального ансамбля или оркестра), к условиям хорового исполнения. При этом оригинальная композиция сохраняет свою основу, однако трансформируется таким образом, чтобы соответствовать специфике хорового звучания. Данный процесс включает перераспределение партий между голосовыми группами хора (сопрано, альты, теноры, басы), а также возможные изменения в области гармонии, темпа или динамической структуры, способствующие более органичному восприятию произведения в хоровой интерпретации. В наши дни ведущим специалистом в данной области является Н.Шарафиева¹.

В свою очередь, «хоровая аранжировка²» представляет собой более сложный и творчески свободный процесс переработки произведения, который может включать не только перераспределение партий, но и создание новых музыкальных элементов, способствующих усилению художественного эффекта. В ходе аранжировки возможно изменение структуры композиции, замена тональности для удобства, добавление дополнительных гармонических решений, разработок вариантов мелодии, а также включение инструментального или оркестрового сопровождения. Таким образом, аранжировка предполагает более активное авторское вмешательство, ориентированное на создание оригинальной версии произведения, адаптированной к возможностям конкретного хорового коллектива.

В отечественной практике одним из наиболее значимых специалистов в области хоровых аранжировок был Е.Нечаев³, чьи труды существенно повлияли на развитие данного направления.

Анализ эволюции хоровой обработки народных песен свидетельствует о том, что данный жанр не только выполняет функцию сохранения и популяризации традиционной музыкальной культуры, но и представляет собой сложный процесс интерпретации фольклорного материала в условиях академической хоровой практики. Исторически процесс адаптации монодической народной музыки к многоголосному исполнению проходил несколько ключевых этапов, каждый из которых был обусловлен как

¹ Н.Шарафиева «Напевы Узбекистана» Т.,2014

² Аранжировка (франц. *arranger* — приводить в порядок, устраивать) — переложение муз. произв. с одного состава исполнителей на другой (напр., сольного произв. для исполнения хором, однородного хора на смеш. и обратно; произв. с сопр. на хор а кап.); также — облегченное изложение хор. партитуры (реже — ее усложнение). А. может быть различной: от более простой до творчески обогащенной обработки. А нередко сопровождается транспонированием. Б.Шомахмудова «Хоровой словарь» Т. 2009 16 стр.

³ Е.Нечаев «Хоровая Аранжировка» Т.,2006

внутренними закономерностями развития композиторской мысли, так и внешними социально-культурными факторами.

Особое значение в этом контексте имеет процесс гармонизации фольклорных мелодий, который представляет собой один из центральных аспектов обработки народных песен для хора. В отечественном музыкознании отмечается два основных подхода к этому процессу: с одной стороны, механическая адаптация общеевропейских гармонических моделей, с другой — стремление к сохранению аутентичных интонационных, ладовых и ритмических особенностей народного песенного материала. Данный дуализм отчетливо прослеживается в развитии жанра многоголосной обработки узбекского фольклора, где композиторы на протяжении всего XX века разрабатывали различные стратегии взаимодействия традиционной музыкальной лексики с академической полифонией.

Формирование национальной хоровой традиции: композиторские стратегии и исполнительская практика

Как отмечает Т.Б.Гафурбеков, «период становления многоголосной хоровой обработки узбекского фольклора приходится на 1920–1940-е годы и связан с деятельностью В. А. Успенского и его последователей, которые предприняли первые попытки научного осмысления и адаптации традиционного монодического материала к хоровому исполнению. В этот период композиторы сталкивались с серьезными трудностями, обусловленными спецификой ладовой системы узбекской музыки, основанной на семнадцатиступенном звукоряде. В целях адаптации фольклора к многоголосному изложению использовались различные методы гармонизации, включая избегание терцовых интервалов, применение бурдонных структур и обращение к модальной гармонии⁴».

Наибольшее развитие жанр получил в 1950–1970-е годы, когда многоголосная обработка народных песен вышла на новый уровень сложности, обогащаясь сложными полифоническими и гармоническими решениями. В этот период ведущими композиторами, работавшими в данном направлении, стали Т.Садыков, М.Бурханов, Г.Сабитов, которые разработали оригинальные стилистические модели взаимодействия народных интонаций с академическим многоголосием. Судя по произведениям этих композиторов, можно сказать, что они активно экспериментировали с различными формами многоголосного письма, включая подголосочное двухголосие, гетерофонию и элементы контрапунктирования, что позволило создать уникальные по своей художественной выразительности хоровые произведения, в которых национальный колорит органично сочетался с профессиональной композиторской техникой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В частности, хоровые обработки Муталия Бурханова демонстрируют органичное сочетание узбекской народной мелодики с многоголосной фактурой, что проявляется в таких произведениях, как «Сари кухи баланд», «Гузаль кизга» и «Ганджи Корабог». В этих произведениях можно наблюдать как сохранение традиционных ладо-интонационных характеристик, так и использование полифонических техник, способствующих созданию сложных фактурных решений.

В 1970–1980-е годы хоровая обработка народного песенного материала продолжает развиваться, обретая новые черты, связанные с усложнением полифонической техники и

⁴ Гафурбеков Т. Фольклорные истоки узбекского профессионального музыкального творчества: учеб. пособие для средних и высших музыкальных учебных заведений. – Т., 1984. – 112 с.

расширением гармонического языка. В этот период наблюдается отход от традиционного двухголосия в пользу более развитых имитационных и контрапунктических структур, что сближает хоровые обработки с профессиональными авторскими композициями. Наиболее ярко эти тенденции проявляются в произведениях Б.Умиджанова⁵, И.Акбарова и С.Бабаева, в чьих интерпретациях традиционные народные мелодии перерабатываются с применением современных хоровых техник, включая диссонантные созвучия, свободную ритмику и многослойные фактурные структуры.

Как пишет А. Х. Хакимова, «первые опыты хоровой обработки узбекских народных песен отличались высокой степенью осторожности, поскольку композиторы стремились минимизировать потери аутентичного интонационного строя, одновременно учитывая принципы ансамблевого хорового исполнения⁶»

Процесс интеграции народных мелодий в контекст западноевропейской хоровой культуры предопределил значительное влияние модальной гармонии и гетерофонных структур на формирование национального многоголосия.

Данный процесс был обусловлен не только чисто музыкальными факторами, но и широкой социокультурной динамикой, связанной с кардинальными изменениями в системе музыкального образования, формированием профессиональных исполнительских школ и развитием композиторских подходов к обработке народного материала. Как подчеркивает исследовательница, «становление хоровой культуры а капелла происходило в трех взаимосвязанных плоскостях: в области композиторского творчества, исполнительской практики и слушательского восприятия». С одной стороны, это требовало создания нового репертуара, опирающегося на национальные традиции, но адаптированного к академической хоровой манере, а с другой — способствовало постепенной трансформации самих принципов народного музицирования в сторону их большей структурной организованности и функциональной гармонизации.

Однако уже в 1960–1970-е годы наблюдается постепенное расширение гармонических и полифонических средств, что привело к более сложным формам взаимодействия голосов, использованию имитационных техник и внедрению элементов свободного контрапункта.

Как подчеркивает А.Х.Хакимова, «в хоровом творчестве среднеазиатских композиторов этого периода отчетливо прослеживаются две тенденции: с одной стороны, сохранение народных мелодий в относительно неизменном виде, что проявляется в обработках, ориентированных на академическую исполнительскую традицию, а с другой — стремление к более свободному и стилистически разнообразному осмыслению фольклорного материала, что выражается в использовании сложных гармонических и фактурных решений⁷».

Особое внимание в этот период уделяется вопросам тембрового баланса и голосоведению, что находит отражение в изменении традиционной роли мелодии в хоровом письме. Если в ранних обработках ведущая мелодическая линия преимущественно сохранялась в высоких голосах (сопрано, тенорах), что соответствовало традиционной исполнительской практике, то в последствии наблюдается более активное вовлечение

⁵ Б.Умиджанов «Песни Народов Средней Азии и Казахстана в обработке Б.Умиджанова» Т.,1984

⁶ Хакимова А. Х. «Страницы Государственной Консерватории Узбекистана» — Ташкент: Фан, 2024 — 115 стр

⁷ Хакимова А. Х. «Страницы Государственной Консерватории Узбекистана» — Т. 2024 — 116 стр.

средних и низких регистров, что способствовало созданию полифонически насыщенной фактуры и более динамичного хорового звучания.

Важным фактором, способствовавшим дальнейшему развитию жанра, явилось также возрастание исполнительского уровня национальных хоровых коллективов, среди которых особое значение приобрел Национальный хор Узбекского радио и телевидения под руководством Б.Умеджанова. Этот коллектив, обладая высокой вокальной школой и глубоким знанием традиционного мелоса, сыграл важную роль в формировании специфической манеры исполнения, базирующейся на синтезе академического хорового звучания и народных вокальных традиций.

Большинство обработок создавалось для хоров без сопровождения, как однородных, так и смешанных, что подчеркивало природную тембровую красочность народного пения. В процессе эволюции узбекской хоровой обработки сложились различные типы аранжировки и обработки народных песен. Среди них можно выделить:

1. Гармонизацию, при которой мелодия сохраняется в первозданном виде в верхнем голосе, а другие голоса сопровождают ее аккордовым звучанием.

2. Полифонический тип обработки, основанный на развитой подголосочной фактуре, имитационных переключках и контрастной полифонии, что придает звучанию объемность и динамику.

3. Смешанный тип, сочетающий элементы гармонизации и полифонии, позволяющий одновременно передавать национальную колоритность и расширять выразительные возможности хорового письма.

4. Свободную обработку- предполагающую творческое переосмысление народной мелодии, объединение различных приемов хоровой аранжировки и приближение к самостоятельному сочинению на основе фольклорного материала.

Следовательно, для более глубокого понимания эволюции хорового искусства в Узбекистане, важно рассмотреть специфические приёмы хорового изложения, которые играют ключевую роль в создании выразительных и структурных особенностей произведений. Эти приёмы определяют характер взаимодействия хоровых партий, а их выбор зависит от фактуры произведения— гармонической, полифонической или смешанной. Данные приёмы не только развиваются в соответствии с традициями и стилистическими предпочтениями, но и адаптируются под современное музыкальное восприятие, придавая произведениям уникальное звучание.

Проведенное исследование подтверждает, что хоровая обработка народных песен представляет собой сложный процесс, сочетающий национальные интонационно-ладовые особенности с академическими принципами многоголосия. Эволюция жанра демонстрирует переход от простых гармонизаций к сложным полифоническим моделям, что отражает расширение выразительных возможностей хорового искусства.

ВЫВОДЫ

Творческие поиски композиторов, таких как В. Успенский, Т. Садыков, М. Бурханов, способствовали формированию уникальной стилистики национального хорового письма. Сегодня хоровая обработка остается важной сферой музыкального творчества, обеспечивая сохранение и переосмысление фольклорного наследия в академическом контексте. Дальнейшие исследования позволят глубже понять взаимодействие фольклора и профессионального музыкального искусства.

Список литературы:

1. А.Х.Хакимова «Страницы Государственной Консерватории Узбекистана» — Ташкент: Фан, 2024
2. Б.Умеджанов «Песни Народов Средней Азии и Казахстана в обработке Б.Умеджанова» Т.,1984
3. Б.Шомахмудова «Хоровой словарь» Т. 2009
4. Е.Нечаев «Хоровая Аранжировка» Т.,2006
5. Н.Шарафиева «Напевы Узбекистана» Т.,2014
6. Т.Гафурбеков Фольклорные истоки узбекского профессионального музыкального творчества: учеб. пособие для средних и высших музыкальных учебных заведений. – Т., 1984.

MUNDARIJA / ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

03.00.00 – Biologiya fanlari

1. SPECIES OF *PHLOMOIDES* MOENCH (LAMIACEAE) DISTRIBUTED IN THE FLORA OF YANGIKURGAN 8
Rustam Gulomov, Murodullayev Mirzaolim, Avazbek Batoshov

05.00.00 – Texnika fanlari

2. SARIMSOQPIYOZ PIYOZBOSHINI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMANING GEOMETRIK PARAMETRLARI 15
Norchayev Davron Rustamovich, Quralov Srojiddin Doniyorovich
3. DORIVOR O'SIMLIKLARNI QURITISH TEXNOLOGIYASIGA UMUMIY YONDASHUV 21
Samiyeva Zumrad Doniyor qizi
4. ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОГАЗА, ПОЛУЧЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКОЙ БИОМАССЫ 25
Б.Э. Хайриддинов, С.А. Утаев, С.Ю. Ганиев, У.Дж. Турдиев

07.00.00 – Tarix fanlari

5. THE NATURE OF THE POSTGRADUATE EDUCATION SYSTEM IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE UZBEK SSR UNDER THE SOVIET GOVERNMENT 33
Nasilloev Sunnat Shavkat ogli

10.00.00 – Filologiya fanlari

6. O'ZBEK VA TURK TILLARIDA NON LEKSEMASI BILAN BOG'LIQ LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLAR 36
Qabuljonova Gulbahor Komiljonovna, Po'latova Sayyoraxon Obidjon qizi
7. LOTIN TILINING ZAMONAVIY TIBBIYOT TA'LIMIDA TUTGAN O'RNI 43
Ulmasova Ruxshona Farruxovna, Normurodova Sohiba Mallayevna

13.00.00 – Pedagogika fanlari

8. RADIONUKLIDLARNING TIBBIYOTDA QOLLANILISHINI PEDAGOGIK TAXLILI 46
Tashanov Odilboy Safar o'g'li, Bozorov Erkin Xojievich, Nasirova Gulparchin Maqsud qizi

-
- | | | |
|-----|---|------------|
| 9. | JAMOA TUZISH METODOLOGIYASI. SHAKLLAR VA USULLAR | 51 |
| | JAMOADA INDIVIDUAL MASHG'ULOTLAR | |
| | Boynazov Zafarbek Urolovich | |
| 10. | TA'LIM VA TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN | 56 |
| | KREATIV YONDASHUVLAR VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR | |
| | Boynazov Zafarbek Urolovich | |
| 11. | INKLYUZIV SINFLARDA ADAPTIV JISMONIY TARBIYA ORQALI | 61 |
| | IJTIMOIIY MOSLASHUVNI QO'LLAB-QUVVATLASH | |
| | Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li | |
| 12. | METHODOLOGY FOR TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL | 67 |
| | TEACHERS IN DESIGNING EDUCATIONAL CONTENT | |
| | Haydarkulova Mahliyo Zafarovna | |
| 13. | O'YIN VA TOMOSHA SPORT TADBIRLARIDA ESTETIK TAJRIBA HODISASI | 73 |
| | Rasulov Zoxid O'sar o'g'li | |
| 14. | FORMING 4K SKILLS IN STUDENTS WHEN TEACHING THE TOPIC | 78 |
| | OF ACIDS | |
| | Sadikova Umidakhan Bakhtiyar kizi | |
| 15. | YEVROPA ECTS KREDIT-MODUL TIZIMIDA MUSTAQIL TA'LIM VA | 81 |
| | UNGA O'QITUVCHINING RAHBARLIK FAOLIYATI | |
| | Toshmatov G'ulomjon Olimjonovich | |
| 16. | YUNON-RIM KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK | 85 |
| | TAYYORGARLIGINI RIVOJLLANTIRSH USULLARINI | |
| | TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR | |
| | Tursunov Shuxrat Sabitjanovich | |
| 17. | GANDBOLCHILARNING TEZKOR-KUCH TAYORGARLIGINI | 90 |
| | DIFFERENSIYALI YONDOSHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH | |
| | METODIKASI | |
| | Xoldorov Sharof G'ulom o'g'li | |
| 18. | МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-МАТЕМАТИКОВ В | 96 |
| | ВУЗАХ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК И | |
| | ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА | |
| | ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛАХ | |
| | Г.Г. Тожиакбарова | |
| 19. | РАЗРАБОТКА И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИИ | 99 |
| | ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ- | |
| | ЮНИОРОВ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВЕСОВЫХ ГРУПП | |
| | Джуманов Бахытжан Мухтарович | |
| 20. | ОТБОР И СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ | 108 |
| | СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ | |
| | М.А.Тожиев | |
| 21. | ЎСМИР СПОРТЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКЛАРИНИ | 113 |
| | РИВОЖЛАНТИРИШ МАШҒУЛОТЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ | |
| | Тожиев Музафаржон Акбарович | |
-

22. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 119
Шаропов Миржон Нурхонович

14.00.00 – Tibbiyot fanlari

23. TISH QATORLARINING QISMAN NUQSONLARINING TASNIFI: KENNEDI KLASSIFIKATSIYASI 125
Aliyeva Mavluda Tursunaliyevna
24. APPLICATION OF MIRTAPINE IN CHRONIC PAIN SYNDROME 133
Arslonova Rayhon Razhabboyevna, Uzoqova Mehribon Akmal kizi, Ergashov Saddam Rakhmatovich
25. STUDY OF THE ROLE OF ANTIMICROBIAL RESIDUE CONTAMINATION IN CHICKEN MEAT 138
Azizov Yu. D.
26. PROBLEMS OF SURGICAL TREATMENT OF ACUTE PURULENT- NECROTIC PARAPROCTITIS 142
Baysariyev Shovkat Usmonovich
27. FEATURES OF SURGICAL TACTICS IN CASE OF CLOTTED HEMOTHORAX 145
Baysariyev Shovkat Usmonovich
28. THE CARDIOVASCULAR BENEFITS OF ANTI-OBESITY MEDICATIONS: A GAME-CHANGER IN HEART HEALTH 149
Imran Aslam, Muhammad Kalim Raza, Ayesha Ashraf, Vishal Chauhan
29. YUZ NERVING YALLIG'LANISHI: KLINIKASI, ETIOLOGIYASI, DAVOLASH USULLARI 155
Ergashev Bekzod Jaloliddin o'g'li
30. UCH SHOXLI NERVING YALLIG'LANISHI: KLINIKASI, ETIOLOGIYASI VA DAVOLASH USULLARI 162
Ergashev Bekzod Jaloliddin o'g'li
31. PROPHYLAXIS EFFICACY OF THE PREPARATION BASED ON "FAGODENT" AND "TRAUMEL S" IN DENTAL IMPLANTOLOGY 170
Ismatov Farrukh Aslidinovich, Bekmurodov Lukmon Rustamovich, Ibodov Ulmas Ergash ugli
32. TACTICS OF MODERN MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN SURGICAL TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS 177
Seliyan Harihara Sudhan, Yunusova Guzal Fayzullaevna
33. DORIVOR O'SIMLIKLARNING LOTINCHA NOMLARI VA ULARNING AHAMIYATI 182
Xayitov Muhammad Farxodovich
34. GENETIC PREDISPOSITION TO PERIODONTAL DISEASES: MYTH OR REALITY? 186
Yusupjanova Nigora Davrbek qizi

35. **STUDY OF THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE DIELECTRIC PROPERTIES OF ELECTROCERAMIC COMPOSITIONS** 193
Azzamova Umida Alisherovna
36. **ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИНТРАНАТАЛЬНОГО КТГ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА ПЛОДА** 196
Бабажанова Ш.Д., Абдурахимова Д.И.
37. **КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ** 202
Ибрагимова Марина Федоровна, Жамшедова Сожида Жамшедовна, Хурсанкулова Фируза Комиловна
38. **ВЛИЯНИЕ ГЛИФЛОЗИНОВ НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА** 207
Китъян С.А., Ташматова Г.А.
39. **СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С ЭНДОТОКСИКОЗОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)** 211
Мамаризаев Иброхим Комилжонович
40. **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ** 226
Муаззамов Б.Б., Хакимов М.Ш., Муаззамов Б.Р.
41. **КЛИНИЧЕСКИЕ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ В ПОЗДНЕЙ РЕЗИДУАЛЬНОЙ СТАДИИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА** 229
Эргашева Мафтуна Озодовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Эргашев Сухроб Сайидович
42. **ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИНГ ҚАЙТАЛАНИШИДА МОРФОЛОГИК МОДИФИКАЦИЯНИНГ ТАЪСИРИ** 234
Раджабов Жасур Пардабоевич
43. **СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИИ СЛОЖНЫХ СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ** 240
Рустамов И.М., Джурабекова С.Т.

17.00.00 – San’atshunoslik fanlari

44. **"ЭВОЛЮЦИЯ ХОРОВОЙ ОБРАБОТКИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН: КОМПОЗИТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА"** 246
Муриддинова Гульзира Хусанбаевна, Научный руководитель: Азимова Арзу Нишановна

Academy of Sciences and Innovations
International Scientific Journal
Research Focus
Volume 4 Issue 3

Ilm-fan va innovatsiyalar akademiyasi
Research Focus
xalqaro ilmiy jurnali
2025 yil 3-soni

ISSN: 2181-3833

“Ilm-fan va innovatsiyalar akademiyasi” MCHJ
Refocus.uz , admin@refocus.uz, + 998 94 516 05 50